

2019-7087
2020-07-14

BLAZE PRO RÉSIDUEL INSECTICIDE POUR LES PUNAISES DES LITS

Ce produit doit être utilisé pour éliminer les punaises des lits à l'intérieur des bâtiments

NOUVELLE BOV Can RÉVOLUTIONNAIRE UTILISE LA PUISSANCE DE L'AIR
LA PROCHAINE GÉNÉRATION EN TECHNOLOGIE DE PULVÉRISATION AMBIANCE
LONGUE DURÉE ACTION INSECTICIDE

PULVÉRISATEUR À PRESSION D'AIR
FONCTIONNE DANS TOUS LES SENS, MÊME À L'ENVERS
SOLUTION À BASE D'EAU QUI N'EST PAS GRAISSEUSE, NI MOUSSEUSE
AUCUN AGENT DE PROPULSION

NON INFLAMMABLE

FAIBLE ODEUR

ACTION RAPIDE
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR
À BASE D'EAU

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF :

Perméthrine.....0,25%

Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,0193% à titre d'agent de conservation

No. D'HOM. 30993 LPA

CONTENU NET : ___ grammes

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Novella Brands Inc.
120 Midair Court
Brampton ON L6T 5V1
1-905-790-0636

2019-7087

2020-07-14

MODE D'EMPLOI :

Renseignements généraux : La perméthrine est une pyréthrine synthétique. Il est établi depuis longtemps que les pyréthrines fournissent une action de choc rapide contre les insectes. Bien que la perméthrine soit plus stable que les pyréthrines sur lesquelles elle est basée, la perméthrine se dégrade quand même sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil. Par conséquent, sa rémanence est relativement courte en présence de lumière du soleil. Quand elle est protégée du soleil, la perméthrine a un effet rémanent/de longue durée sur les organismes ciblés.

Comment appliquer : Le contenant peut être tenu dans n'importe quelles directions lors de l'utilisation, même l'extrémité du haut vers le bas. **NE PAS APPLIQUER SOUS FORME DE PULVÉRISATION D'AMBIANCE NI DANS LE CADRE D'UN TRAITEMENT GÉNÉRALISÉ.** Appliquer dans le cadre d'un traitement des fissures et des crevasses ou d'un traitement. Un traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie de moins de 0,2 m². Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher. La surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie totale d'une pièce. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites ouvertures qui s'observent à la surface d'une structure. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures.

Instructions concernant l'application à l'intérieur des bâtiments:

POUR ÉLIMINER PUNAISES DES LITS : NE PAS appliquer sur les matelas, les têtes et pieds de lit ou les meubles. Appliquer sur les surfaces internes des bâtiments, y compris dans les fissures et les crevasses des murs, des planchers et des plafonds ; le long des plinthes et des moulures et en arrière de celles-ci; et sur des parties localisées des murs et des planchers en arrière des meubles (p. ex. lits, tables de chevet). Pour accroître l'efficacité du produit, l'appliquer directement sur les punaises des lits dans la mesure du possible. Le traitement peut être répété après 7 jours uniquement si l'infestation persiste ou réapparaît.

RESTRICTIONS : NE PAS UTILISER sur les humains ou les animaux. NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer ce produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage sont présents. NE PAS permettre aux personnes, aux animaux domestiques, ni aux animaux d'élevage de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées. NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité. Sauf indication contraire sur cette étiquette, NE PAS appliquer sur les meubles (sauf les bibliothèques et les meubles de rangement), les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés (p. ex. greniers, vides sanitaires). Aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou encore en utilisant des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l'air.

2019-7087

2020-07-14

L'utilisation de ce produit sur du vinyle ou de l'aluminium (en particulier s'il est de couleur pâle, à partir de l'âge, a été exposé longtemps aux intempéries ou est endommagé de toute autre façon) peut causer des taches, des blanchissements ou de la décoloration. Certains facteurs, comme la chaleur extrême et l'exposition directe au soleil peuvent promouvoir la dégradation et les dommages. Avant de pulvériser, traiter une petite surface et attendre 30 minutes avant d'évaluer s'il y a un potentiel de tacher. Peu importe les résultats du test, ne pas appliquer sur du vinyle ou de l'aluminium lorsque la surface est directement exposée au soleil ou lors de la chaleur du jour. Ne pas appliquer sur des tapisseries, du papier peint ou du matériel similaire qui peut être coloré. Pour toutes autres surfaces à traiter, effectuer un test avec le produit sur une petite surface pour vérifier s'il y a un effet sur la couleur avant d'appliquer le produit en grande quantité.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer près des sources d'eau chaude, de radiateurs, de fourneaux et d'autres sources de chaleur ou entreposer le contenu à une température supérieure à 50°C. Couvrir les aquariums avant les applications de surface.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Quand le contenant est vide, appuyer sur la buse pour éliminer la pression. Ne pas percer ou incinérer. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.