

2019-4943
2019-10-10

CUEVA® PAE AVEC APPLICATEUR PULL'N SPRAY®

FONGICIDE AU CUIVRE

DOMESTIQUE

SOLUTION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF : Cuivre, présent sous forme d'octanoate de cuivre et les composés
de cuivre liés.....0,0178 %

N° D'HOM. : 31830 LOI SUR LES P.A.

CONTENU NET : 1 L à 6 L

W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3,
31860 Emmerthal, Allemagne

Agent canadien :

Neudorff North America
PO Box 178
Brentwood Bay, C.-B. V8M 1R3
250-652-5888

PMRA Approved Label
2015-3946
2015-08-24

Fongicide au cuivre liquide pour la période de dormance et la saison de croissance. Supprime plusieurs maladies des plantes à raison de faibles concentrations de cuivre. Biodégradable : se décompose en une forme utile aux plantes et aux microbes. Ne pas appliquer la journée précédant la récolte.

MODE D'EMPLOI

NE PAS appliquer ce produit de manière qu'il entre en contact avec des adultes, des enfants ou des animaux de compagnie, directement ou par dérive.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.

NE PAS épandre sur les plans d'eau. Éviter d'appliquer ce produit quand les vents soufflent en rafales.

AVEC PULVÉRISATEUR SOUS PRESSION

[Text for inside Arrow]

Applicateur Pull'N Spray®

[ILLUSTRATION #1]

- Enlever le pulvérisateur du porteur auxiliaire et dérouler le tuyau complètement.
- Insérer la prise à l'extrémité du tuyau dans la buse du capuchon jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Basculer la buse vers le haut.

[ILLUSTRATION #2]

- Pointer le pulvérisateur vers l'avant.
- Prendre le pulvérisateur par la poignée.
- Tirer LENTEMENT sur la bague au bas de la poignée du pulvérisateur jusqu'à ce qu'elle s'arrête pour préparer le pulvérisateur.

[ILLUSTRATION #3]

- Tourner la buse à l'extrémité du pulvérisateur pour obtenir le type de jet souhaité.

[ILLUSTRATION #4]

- Appuyer sur le bouton du pulvérisateur pour commencer la pulvérisation et le maintenir vers le bas pour une pulvérisation continue.
- Tirer sur la bague au bas du pulvérisateur de nouveau au besoin pour des pulvérisations supplémentaires.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RAVAGEURS/SITES ET L'APPLICATION

USAGE GÉNÉRAL : S'utilise uniquement à l'extérieur et dans les serres. À moins d'indications contraires ci-après, la dose d'application standard pour les espèces mentionnées est de 1 L de CUEVA® PAE **AVEC APPLICATEUR PULL'N SPRAY®** par 10 m². Bien pulvériser toutes les surfaces des plantes; au besoin, répéter les épandages aux 7 à 10 jours, à moins d'indications contraires ci-après. Pour une suppression optimale, débiter le traitement 2 semaines avant l'apparition normale de la maladie ou lorsque les prévisions météorologiques font état de longues périodes de temps humide. Ou encore, débiter le traitement dès l'apparition de la maladie et répéter à intervalles de 7 à 10 jours, à moins d'indications contraires ci-après. Pour les fleurs et plantes ornementales d'extérieur, ne pas faire plus de 10 applications par année. Dans la mesure du possible, planifier les applications de telle sorte qu'elles précèdent 12 heures de temps sec.

CUEVA® PAE **AVEC APPLICATEUR PULL'N SPRAY®** peut causer divers degrés de toxicité au cuivre chez certaines espèces de plantes. Lorsque le temps est très humide et froid, des taches peuvent apparaître sur les feuilles des cultures sensibles au cuivre. Dans le doute quant à la sensibilité des plantes, appliquer sur des plantes individuelles ou sur de petites parcelles de plantes et attendre de voir si la plante subit des dommages avant de procéder au traitement de plus grandes surfaces.

GAZON		
Plante	Taux d'application et notes	Maladies supprimées
Gazon (pelouses)	<p>Appliquer 1L par 10 m² .</p> <p>Appliquer CUEVA® PAE AVEC APPLICATEUR PULL'N SPRAY® dès l'apparition de la maladie et répéter à intervalles de 7 à 10 jours, pour un maximum de 15 applications. Dans les zones sujettes à la maladie, émonder les arbres et arbustes voisins pour réduire l'ombrage sur le gazon et améliorer la circulation de l'air.</p>	Blanc (<i>Erysiphe graminis</i>)

PLANTES ORNEMENTALES (D'EXTÉRIEUR ET DE SERRE)		
Plante	Taux d'application et notes	Maladies supprimées ou réprimées
<p>Arbustes ornementaux et plantes à fleurs de serre et d'extérieur (tels que rosier, rose trémière, hydrangée, lilas des Indes)</p> <p>Rosier</p> <p>Lilas des Indes</p>	<p>Appliquer 1L par 10 m² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.</p> <p>CUEVA® PAE AVEC APPLICATEUR PULL'N SPRAY® peut causer une toxicité au cuivre chez certaines variétés de rosiers. La toxicité au cuivre prend la forme de taches violettes.</p> <p>Par temps frais et humide (moins de 18°C), l'utilisation de CUEVA® PAE AVEC APPLICATEUR PULL'N SPRAY® présente un risque de phytotoxicité.</p>	<p>Tache des feuilles (<i>Corynespora asiicola</i>) – Répression Blanc (<i>Erysiphe</i> spp.), Rouille (<i>Puccinia malvacearum</i>) Brûlure bactérienne (<i>Pseudomonas syringae</i>) Feu bactérien (<i>Erwinia amylovora</i>) Brûlure corynéenne (<i>Thyrostroma carpophilum</i>)</p> <p>Tache noire (<i>Diplocarpon rosae</i>) Blanc (<i>Podosphaera pannosa</i> var. <i>rosae</i>) Rouille (<i>Phragmidium mucronatum</i>)</p> <p>Cercosporiose (<i>Cercospora lythracearum</i>) – Répression</p>

LÉGUMES, FRUITS, NOIX ET BAIES

Plante	Taux d'application et notes	Maladies supprimées ou réprimées
Légumes-racines et légumes-tubercules (betterave potagère, céleri-rave, pomme de terre, betterave à sucre)	Appliquer 1L par 10 m ² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.	Alternariose (<i>Alternaria solani</i>) de la pomme de terre Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) de la pomme de terre Tache septorienne (<i>Septoria lycopersici</i>) de la pomme de terre Brûlure septorienne (<i>Septoria apiicola</i>) du céleri-rave Cercosporiose (<i>Cercospora beticola</i>) de la betterave et de la betterave à sucre
Légumes-bulbes (ciboulette, ail, poireau, oignon, échalote)	Appliquer 1L par 10 m ² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.	Mildiou (<i>Peronospora destructor</i>) Brûlure des feuilles (<i>Botrytis squamosa</i>) Pourriture molle (<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)
Céleri	Appliquer 1L par 10 m ² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.	Brûlure cercosporéenne (<i>Cercospora apiicola</i>) Brûlure septorienne (<i>Septoria apiicola</i>)
Légumes-feuilles et légumes-fleurs du genre Brassica (chou chinois, brocoli, chou de Bruxelles, chou, chou-fleur, chou frisé, chou-rave, moutarde, pak-choï)	Appliquer 1L par 10 m ² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours. Pour le chou de Bruxelles, ne pas faire plus de 10 applications par année.	Pourriture noire (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>) - Répression
Légumineuses (haricot, pois, soja)	Appliquer 1L par 10 m ² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.	Ascochytose (<i>Ascochyta pisi</i>) Maladies bactériennes communes (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>) Brûlure bactérienne (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>) Tache brune (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>) Blanc (<i>Erysiphe</i> spp.) Rouille (<i>Uromyces appendiculatus</i>)
Légumes-fruits (aubergine, piment, tomate)	Appliquer 1L par 10 m ² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.	Alternariose (<i>Alternaria solani</i>) Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) Tache septorienne des feuilles (<i>Septoria lycopersici</i>) Moucheture bactérienne

		<p>(<i>Pseudomonas syringae</i>) Gale bactérienne (<i>Xanthomonas campestris</i> pv <i>vesicatoria</i>) Chancre bactérien (<i>Clavibacter michiganensis</i> pv. <i>michiganensis</i>)</p>
Cucurbitacées (concombre, cantaloup, melon, courge, citrouille, courgette)	<p>Appliquer 1L par 10 m² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.</p>	<p>Blanc (<i>Podosphaera xanthii</i>; <i>Erysiphe cichoracearum</i>) Mildiou (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Alternariose (<i>Alternaria cucumerina</i>) Anthracnose (<i>Colletotrichum orbiculare</i>) Tache angulaire (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>orbiculare</i>) Flétrissure bactérienne (<i>Erwinia tracheiphila</i>) Tache septorienne (<i>Septoria cucurbitacearum</i>)</p>
Arbres fruitiers à pépins (pomme, poire, coing)	<p>Appliquer 1L par 10 m² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours. Ne pas faire plus de 10 applications par année.</p> <p>Pour supprimer la brûlure bactérienne, appliquer CUEVA® PAE AVEC APPLICATEUR PULL'N SPRAY® durant la période de dormance, durant la floraison ou lors des épandages de couverture durant la saison.</p> <p>Ne pas appliquer sur les pommes à peau claire après la formation des fruits parce qu'un roussissement peut se produire.</p>	<p>Brûlure bactérienne (<i>Erwinia amylovora</i>) Tavelure (<i>Venturia Inaequalis</i> V, <i>pirina</i>)</p>
Arbres fruitiers à noyau (abricot, cerise, nectarine, pêche, prune, nectaprupe)	<p>Appliquer 1L par 10 m² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours. Pour les pêches, ne pas faire plus de 5 applications par année.</p> <p>Pour les nectarines, Ne pas faire plus de 10 applications par année.</p> <p>Pour le chancre bactérien, appliquer comme traitement de dormance lorsque les boutons commencent à gonfler et répéter le traitement au</p>	<p>Cloque du pêcher (<i>Taphrina deformans</i>) Tache bactérienne des feuilles (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i>) Criblure (<i>Thyrostroma carpophilum</i>) Chancre bactérien (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae, morsprunum</i>) Pourriture brune (<i>Monilinia fructicola</i>) Tache sur les feuilles et sur</p>

	<p>débourrement, puis chaque semaine par la suite, au besoin, jusqu'à un maximum de six épandages. À l'automne, faire un nouveau traitement lorsque 10 % des feuilles sont tombées, puis lorsque 80 % des feuilles sont tombées. Pour la pourriture brune, faire une pulvérisation intégrale aux stades fins de dormance (gonflement des boutons), préfloraison, pleine floraison et post-floraison. Par temps humide, des pulvérisations additionnelles peuvent être nécessaires.</p> <p>Pour l'antracnose (taches sur les feuilles et les fruits), la criblure et la cloque du pêcher, appliquer comme traitement de dormance à la fin de l'automne, durant une période de temps sec.</p>	<p>les fruits (<i>Blumeriella jaapii</i>)</p>
<p>Petits fruits (mûre, bleuet, gabelle et cassis, groseille à maquereau, raisin, framboise, fraise)</p>	<p>Appliquer 1L par 10 m².</p> <p>Appliquer au début de la floraison et poursuivre aux 7 à 10 jours. Ne pas appliquer dans la journée précédant la récolte.</p> <p>Pour les fraises, pulvériser 1 mois après la plantation (ou avant la floraison des plants établis), puis encore deux fois à intervalles de 7 jours.</p> <p>Pour les raisins, ne pas mélanger CUEVA® PAE AVEC APPLICATEUR PULL'N SPRAY® avec de la chaux. Certaines variétés Vinifera et hybrides françaises peuvent être sensibles au cuivre, ce qui se traduit par une brûlure des feuilles. Faire des essais à petite échelle avant de pulvériser ces variétés.</p>	<p>Oïdium de la vigne (<i>Erysiphe necator</i>) du raisin Blanc (<i>Podosphaera aphanis</i>) de la fraise Mildiou de la vigne (<i>Plasmopara viticola</i>) du raisin Rouille (<i>Cronartium ribicola</i>) de la gabelle et cassis et de la groseille à maquereau Brûlure bactérienne (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i>) de la framboise, de mûre et du bleuet</p>
<p>Aveline, noisette</p>	<p>Appliquer 1L par 10 m². Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.</p>	<p>Brûlure bactérienne (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>corylina</i>) Brûlure orientale du noisetier (<i>Anisogramma anomala</i>)</p>
<p>Noix de Grenoble</p>	<p>Appliquer 1L par 10 m². Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.</p>	<p>Brûlure bactérienne (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>juglandis</i>)</p>
<p>Persil</p>	<p>Appliquer 1L par 10 m².</p>	<p>Septoriose du persil</p>

	Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.	(<i>Septoria petroselini</i>)
--	---	---------------------------------

CULTURES VIVRIÈRES EN SERRE		
Culture ou plante	Taux d'application et notes	Maladies supprimées ou réprimées
Céleri	Appliquer 1L par 10 m ² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.	Brûlure cercosporéenne (<i>Cercospora apiicola</i>) Brûlure septorienne (<i>Septoria apiicola</i>)
Légumineuses (haricot, pois, soja)	Appliquer 1L par 10 m ² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.	Ascochytose (<i>Ascochyta pisi</i>) Maladies bactériennes communes (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>) Brûlure bactérienne (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>) Tache brune (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>) Blanc (<i>Erysiphe</i> spp.) Rouille (<i>Uromyces appendiculatus</i>)
Légumes-fruits (aubergine, piment, tomate)	Appliquer 1L par 10 m ² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.	Alternariose (<i>Alternaria solani</i>) Mildiou (<i>Phytophthora infestans</i>) Tache septorienne des feuilles (<i>Septoria lycopersici</i>) Moucheture bactérienne (<i>Pseudomonas syringae</i>) Gale bactérienne (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>) Chancre bactérien (<i>Clavibacter michiganensis</i> pv. <i>michiganensis</i>)
Cucurbitacées (concombre, cantaloup, melon, courge, citrouille, courgette)	Appliquer 1L par 10 m ² . Appliquer de nouveau à intervalles de 5 à 10 jours.	Blanc (<i>Podosphaera xanthii</i> ; <i>Erysiphe cichoracearum</i>) Mildiou (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Alternariose (<i>Alternaria cucumerina</i>) Anthracnose (<i>Colletotrichum orbiculare</i>) Tache angulaire (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>orbiculare</i>) Flétrissure bactérienne (<i>Erwinia tracheiphila</i>) Tache septorienne (<i>Septoria cucurbitacearum</i>)

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés. À titre de bonne pratique d'hygiène, porter des gants pour manipuler ce produit.

PMRA Approved Label
2015-3946
2015-08-24

Se laver les mains avant de manger, de boire, de prendre de la gomme à mâcher, de fumer ou de se rendre aux toilettes.

NE PAS laisser les adultes, les enfants ou les animaux de compagnie retourner dans la zone traitée avant que le produit pulvérisé n'ait séché.

Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à : www.croplife.ca.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

TOXIQUE pour les oiseaux, les petits mammifères sauvages et les organismes . Afin de réduire le risque de contamination des habitats aquatiques par le ruissellement en provenance des zones traitées, éviter d'appliquer ce produit sur des pentes modérées ou abruptes et sur des sols compactés ou argileux. Éviter d'appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues. Le risque de contamination des milieux aquatiques par le ruissellement peut être réduit par l'aménagement d'une bande de végétation entre la zone traitée et le plan d'eau.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

ENTREPOSAGE :

Entreposer dans le contenant d'origine dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Pour éviter toute contamination, ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Protéger du gel.

ÉLIMINATION/DÉCONTAMINATION

Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.



PMRA Approved Label
2015-3946
2015-08-24

Cueva® est une marque déposée de W. Neudorff GmbH KG

- Pull'N Spray® est une marque déposée d'OMS Investments, Inc., utilisée sous licence par Scotts Canada Ltée.
- LE MODE D'APPLICATION LE PLUS FACILE!
- 1 ACTION = 40 JETS DE GÂCHETTE [FLASH]