

2018-1867
2018-11-22

Poulin's Pest Control - L'Insecticide létal de Poulin

Tue les organismes nuisibles domestiques communs

DOMESTIQUE

Insecticide

Solution

N° D'HOM. 31979 LOI PA

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

PRINCIPE ACTIF:

Tétraméthrine.....0,20%

Perméthrine.....0,20%

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION POISON

ATTENTION IRRITANT OCULAIRE

CONTENU NET : 0,295 – 3,789 L

753146 AB LTD o/a Ultrasol Industries

10755-69 Ave

Edmonton, Alberta T6H 2C9

Canada

(780) 432-6535

www.doktordoom.com

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant l'emploi. Tenir le contenant vertical. A utiliser dans et autour de la maison. Utiliser uniquement pour des traitements localisés, ceux le long d'un périmètre ou ceux dans les fissures et les interstices.

Ne pas utiliser ce produit dans les endroits où l'on manipule, entrepose ou prépare des aliments, lorsque des aliments sont présents.

POUR UN TRAITEMENT LOCALISÉ :

Pour tuer les fourmis, les anthrènes des tapis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les lépismes argentés, les cloportes communs et les araignées : pulvériser les endroits où les parasites se trouvent ou peuvent se cacher, y compris les coins sombres des pièces et des armoires, les fissures et les crevasses dans les murs, le long des plinthes et des cadres de fenêtres et de portes, derrière et sous les éviers, les cuisinières, les réfrigérateurs et les armoires et autour des poubelles, de la plomberie et autres installations de services publics. Il faut pulvériser directement les parasites qui s'échappent des cachettes. Pour les fourmis, appliquer sur les traînées de fourmis, autour des portes et des fenêtres et à tout endroit où ces parasites peuvent pénétrer.

Pour tuer les puces et les tiques sanguines : appliquer comme traitement localisé aux endroits infestés tels que les lits d'animaux et les endroits de repos, les fentes et les crevasses, le long et derrière les plinthes, les cadres de fenêtres et de portes et les endroits précis sur le plancher et les revêtements de plancher où ces parasites peuvent être présents. Il faut retirer la vieille litière et la remplacer avec de la litière propre et fraîche après le traitement. **NE PAS PULVÉRISER LES ANIMAUX DOMESTIQUES AVEC CE PRODUIT.** Pour une suppression efficace des puces et des tiques, il faudrait combiner le traitement de l'animal à la désinfection et au nettoyage de tout endroit utilisé par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles, etc. (jeter le sac de l'aspirateur après l'avoir utilisé), et laver la litière de l'animal, les endroits où il demeure et les environs.

Mouches et moustiques : N'utiliser qu'à l'extérieur comme aide afin de réduire la nuisance qu'occasionnent ces insectes. Pulvériser les surfaces extérieures des cadres de portes et de fenêtres de même que d'autres endroits où ces parasites peuvent pénétrer dans la maison. Pulvériser aussi les coins sombres et les endroits de repos localisés (tels que sous les gouttières) ou les vérandas, patios et garages où ces insectes se rassemblent. Les mouches et les moustiques venant se reposer sur les surfaces traitées seront tués.

Note : Un traitement localisé est effectué sur la surface d'une aire ne mesurant pas plus de 0,2 mètre². Les traitements localisés ne peuvent être adjacents les uns aux autres et la superficie totale traitée de tous les traitements localisés dans un même site ne doit pas dépasser 10 % de la surface entière à traiter (c'est-à-dire celle constituée des planchers, des murs et des plafonds). Un traitement dans les fissures et les interstices est fait dans une ouverture étroite sur les surfaces de la structure. De telles ouvertures apparaissent communément aux joints d'expansion, aux

points d'entrée des services publics et entre différents éléments de construction (par exemple, les plinthes et les moulures).

Un traitement le long d'un périmètre extérieur ou par bande à l'aide d'un produit antiparasitaire est fait sous forme d'une bande continue d'une largeur plus petite que 1 mètre.

LES FENTES ET LES CREVASSES :

Pour tuer les fourmis, les tiques sanguines, les anthrènes des tapis, les blattes, les grillons, les perce-oreilles, les puces, les lépismes argenté, les cloportes communs et les araignées : pulvériser directement en petites quantités dans les fentes et les crevasses. Le réglage de repérage de la pompe doit servir pour les points entre différents éléments de construction, entre l'équipement et les planchers, les ouvertures menant à des vides et des espaces creux dans les murs, les pieds et les bases d'équipement où les insectes mentionnés précédemment se cachent.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Dangereux si avalé. Peut provoquer une irritation des yeux ou de la peau. Ne respirer pas les vapeurs. Bien se laver après la manipulation et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver les vêtements contaminés avec de l'eau chaude et du savon avant de les réutiliser. Ne porter pas de chaussures contaminés.

Sortir les animaux au moins 1 heure avant de pulvériser le produit dans la pièce. Après le traitement, aérer toutes les pièces, attendre au moins 15 minutes avant d'y entrer et ne pas y retourner tant que l'aération soit terminée. Éviter tout contact avec les surfaces traitées tant qu'elles ne sont pas sèches.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendrenote du nom du produit et le numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT : Ce produit est toxique pour les organismes aquatiques. Ne pas appliquer directement à l'eau. Ne contaminer pas l'eau pendant le nettoyage de l'équipement ou l'élimination des déchets. Toxique pour les abeilles. Ne pas pulvériser sur les abeilles.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser les contenants vides. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

ENTREPOSAGE : Ranger seulement dans le contenant original dans un endroit frais et sec inaccessible pour les enfants, les animaux domestiques et de compagnie. Ranger à plus de 0°C – ne pas laisser geler.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.