

2022-0231
2022-01-31

Advantage™ II Kitten
Insert (French)

<Elanco Logo>

Advantage^{MC} II chaton

Adulticide/larvicide/ovicide contre les puces

Pour chats de 8 semaines et plus et de 2,3 kg et moins

Traitement topique mensuel contre les puces

Liquide

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

POUR USAGE SUR LES CHATS SEULEMENT

Ne pas traiter d'autres animaux avec ce produit

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



AVERTISSEMENT

POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF : imidaclopride à 9,1 % et pyriproxifène à 0,46 %

N° D'HOM. 31517 L. P. A.

Contient un à six tubes de 0,23 mL

Elanco Canada Limited
150 Research Lane, Suite 120
Guelph, Ontario N1G 4T2
1-800-265-5475

42 **Avantage II chaton tue, en deçà d'une journée du traitement, de 98 à 100 % des puces**
43 **ayant infesté les animaux de compagnie. Le produit peut protéger l'animal contre une**
44 **réinfestation pour une période allant jusqu'à quatre semaines. Un traitement mensuel**
45 **est nécessaire si l'animal est continuellement réinfesté ou si une action préventive**
46 **contre les puces est désirée. Les puces, les œufs et les larves sont tués après contact**
47 **avec les débris cutanés d'un animal traité avec Avantage II chaton.**

48 **Avantage II chaton offre une protection contre les multiples stades de vie des puces en**
49 **interrompant efficacement tous les stades de vie des puces afin de décimer rapidement**
50 **et pendant longtemps les populations d'insectes.**

51 **Ne pas faire de shampooing ou immerger l'animal dans l'eau immédiatement après le**
52 **traitement. L'animal peut recevoir un shampooing, être immergé dans l'eau ou être**
53 **exposé à la pluie trois jours après le traitement. Avantage II chaton conserve ses**
54 **propriétés ovicides et larvicides jusqu'à quatre semaines après un shampooing, une**
55 **baignade ou une exposition à la pluie. L'effet adulticide peut être réduit par de multiples**
56 **shampooings, immersions dans l'eau ou expositions à la pluie. Une application**
57 **supplémentaire pourrait s'avérer nécessaire à la suite de telles activités. L'activité**
58 **alimentaire répétitive des puces infestant les animaux de compagnie peut provoquer**
59 **chez ces derniers un trouble d'hypersensibilité de l'épiderme : la dermatite allergique**
60 **aux piqûres de puces (DAPP). Le traitement avec Avantage II chaton tue rapidement**
61 **les puces et diminue l'incidence de cette dermatite.**

62 **Pour une élimination efficace des puces, le traitement de l'animal devrait être**
63 **accompagné du nettoyage de tous les endroits fréquentés par celui-ci. Passer**
64 **l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac après usage) et laver**
65 **les endroits où l'animal se couche et vit ou qu'il fréquente. Si le problème persiste, il**
66 **sera peut-être nécessaire d'effectuer un traitement insecticide des lieux. Consulter le**
67 **vétérinaire si l'infestation persiste.**

68
69 **MISES EN GARDE :**

70
71 **ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré.**
72 **Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la**
73 **peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au moment de l'application du**
74 **produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute**
75 **autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du**
76 **savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec.**

77
78 **ANIMAUX DE COMPAGNIE : Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de 8**
79 **semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent se trouver à**
80 **proximité de l'animal traité. L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie**
81 **peut produire une sensibilité. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir**
82 **des effets indésirables. Surveiller de près. Si les signes persistent ou s'aggravent,**
83 **consulter immédiatement un médecin vétérinaire.**

84
85

Effets secondaires : Surveillez votre chat après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro-intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou communiquez avec Elanco en composant le 1-800-265-5475.

86

87 PREMIERS SOINS :

88

89 **ÊTRES HUMAINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX**, garder les paupières
90 écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le
91 cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer
92 l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
93 traitement

94 **EN CAS D'INGESTION**, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement
95 pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées
96 si la personne est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu le
97 conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une
98 personne inconsciente.

99 **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS**, enlever tous les
100 vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20
101 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
102 traitement.

103

104 **ANIMAUX DE COMPAGNIE** : Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner
105 l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les
106 signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un médecin vétérinaire.
107 Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
108 d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale ou vétérinaire.

109

110 **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** : Traiter le patient selon les symptômes.

111

112 **ENTREPOSAGE** : Entreposer le contenant à la température de la pièce.

113

114 **ÉLIMINATION**: Envelopper le tube vide et le bouchon dans du papier journal et jeter
115 avec les ordures ménagères.

116

117 **MODE D'EMPLOI** :

118 Ce produit contient imidaclopride et pyriproxifène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres
119 produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui
120 contiennent imidaclopride et pyriproxifène après avoir utilisé Advantage II chaton.

121

122 NE PAS administrer par voie orale.

123

124 Seulement pour les chats de 8 semaines et plus pesant de 2,3 kg et moins. Ne pas
125 utiliser chez les chats âgés de moins de 8 semaines.

126

127 Ce produit se présente sous forme d'un tube applicateur à dose unique. Cet emballage
128 contient une à six doses mensuelles de 0,23 mL. N'appliquer qu'une seule dose de 0,23
129 mL à la fois. Traiter le chat une fois par mois selon la façon décrite ci-dessous.

130

131 1. Utiliser seulement pour les chatons et chats de 8 semaines et plus et de 2,3 kg et
132 moins. Ne pas utiliser chez les chats âgés de moins de 8 semaines. Ne pas
133 utiliser sur d'autres animaux.

134 2. Retirer un applicateur de l'emballage.

135 3. Tenir le tube en position verticale avec l'ouverture vers le haut. Retirer le
136 bouchon du tube.

137 4. Retourner le bouchon et le placer en position inversée au bout du tube.

138 5. Tourner le bouchon afin de briser le sceau du tube, puis retirer le bouchon du
139 tube.

140 6. Écarter le pelage dans la région du cou, à la base du crâne, jusqu'à ce que la
141 peau soit visible. Placer la pointe du tube sur la peau et presser le tube de façon
142 à le vider complètement et directement sur la peau exposée. Éviter tout contact
143 de ce produit avec les yeux ou la gueule de l'animal. Le produit a un goût amer;
144 par conséquent, si le chat le lèche immédiatement après le traitement, il est
145 possible qu'il salive durant un court moment. L'application du produit à la base
146 du crâne réduira les risques de léchage.

147 7. Jeter le tube vide de la manière décrite à la section ÉLIMINATION.

148

149 Consulter un vétérinaire avant d'utiliser chez un animal malade, âgé, en gestation, qui
150 allaite des petits ou reçoit un traitement médical ou pesticide. Un vétérinaire devrait être
151 consulté si l'infestation de l'animal par les puces persiste.

152

153 Répéter tous les mois pour un contrôle antiparasitaire continu si l'animal est
154 continuellement réinfesté.

155

156 Tenir l'animal éloigné des meubles et des planchers de bois francs jusqu'à ce
157 qu'Advantage II chaton soit sec.

158

159 Garder le feuillet d'emballage pour référence future.

160

161 Advantage, Elanco et la barre diagonale sont des marques de commerce d'Elanco ou
162 de ses sociétés affiliées.

2022-0231
2022-01-31

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

<Elanco Logo>

Advantage™ II Kitten
Carton (French)

Advantage^{MC} II chaton

Adulticide/larvicide/ovicide contre les puces

Pour chats de 8 semaines et plus et de 2,3 kg et moins

Traitement topique mensuel contre les puces

Liquide

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

POUR USAGE SUR LES CHATS SEULEMENT

Ne pas traiter d'autres animaux avec ce produit

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



AVERTISSEMENT POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF : imidaclopride à 9,1 % et pyriproxifène à 0,46 %

N° D'HOM. 31517 L. P. A.

Contient un à six tubes de 0,23 mL

Elanco Canada Limited
150 Research Lane, Suite 120
Guelph, Ontario N1G 4T2
1-800-265-5475

204
205 **Avantage II chaton tue, en deçà d'une journée du traitement, de 98 à 100 % des puces**
206 **ayant infesté les animaux de compagnie. Le produit peut protéger l'animal contre une**
207 **réinfestation pour une période allant jusqu'à quatre semaines.**
208 **Un traitement mensuel est nécessaire si l'animal est continuellement réinfesté ou si une**
209 **action préventive contre les puces est désirée. Les puces, les œufs et les larves sont**
210 **tués après contact avec les débris cutanés d'un animal traité avec Avantage II chaton.**
211 **Avantage II chaton offre une protection contre les multiples stades de vie des puces**
212 **en interrompant efficacement tous les stades de vie des puces afin de décimer**
213 **rapidement et pendant longtemps les populations d'insectes.**
214 **Ne pas faire de shampooing ou immerger l'animal dans l'eau immédiatement après le**
215 **traitement. L'animal peut recevoir un shampooing, être immergé dans l'eau ou être**
216 **exposé à la pluie trois jours après le traitement. Avantage II chaton conserve ses**
217 **propriétés ovicides et larvicides jusqu'à quatre semaines après un shampooing, une**
218 **baignade ou une exposition à la pluie. L'effet adulticide peut être réduit par de multiples**
219 **shampooings, immersions dans l'eau ou expositions à la pluie. Une application**
220 **supplémentaire pourrait s'avérer nécessaire à la suite de telles activités.**

221
222 **MISES EN GARDE :**
223 **ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré.**
224 **Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la**
225 **peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au moment de l'application du**
226 **produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute**
227 **autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du**
228 **savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Ne pas**
229 **contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en**
230 **entreposant ou en mettant au rebut le produit.**
231 **ANIMAUX DE COMPAGNIE : Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de 8**
232 **semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent se trouver à**
233 **proximité de l'animal traité. L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie**
234 **peut produire une sensibilité. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir**
235 **des effets indésirables. Surveiller de près. Si les signes persistent ou s'aggravent,**
236 **consulter immédiatement un médecin vétérinaire.**

237

Effets secondaires : Surveillez votre chat après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou communiquez avec Elanco en composant le 1-800-265-5475.

238
239

240 PREMIERS SOINS :

241 ÊTRES HUMAINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières

242 écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le

243 cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer

244 l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le

245 traitement.

246 EN CAS D'INGESTION, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement

247 pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées

248 si la personne est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu le

249 conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une

250 personne inconsciente.

251 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les

252 vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20

253 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le

254 traitement.

255 ANIMAUX DE COMPAGNIE : Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner

256 l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les

257 signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un médecin vétérinaire.

258 Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro

259 d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale ou vétérinaire.

260

261 RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter le patient selon les symptômes.

262

263 ENTREPOSAGE : Entreposer le contenant à la température de la pièce.

264

265 ÉLIMINATION : Envelopper le tube vide et le bouchon dans du papier journal et jeter

266 avec les ordures ménagères.

267

2022-0231
2022-01-31

268
269
270 <Elanco Logo>

Advantage™ II Kitten
Tube (French)

Advantage^{MC} II chaton

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI



AVERTISSEMENT

POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

DOMESTIQUE

USAGE EXTERNE SEULEMENT

PRINCIPE ACTIF : imidaclopride 9,1 % et pyriproxifène 0,46 %

N° D'HOM. 31517 L. P. A.

Elanco Canada Limited
150 Research Lane, Suite 120
Guelph, Ontario N1G 4T2

0,23 mL