

2018-6260  
2018-12-17

Bug Out! Insectifuge crème  
30 % DEET

PRINCIPE ACTIF: DEET plus toluamides actifs apparentés 30 %  
Ce produit contient du benzoate de sodium à 0,10 % comme agent de conservation.

POUR USAGE DOMESTIQUE

ATTENTION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

VOIR PRÉCAUTIONS AU VERSO DU CONTENANT

No D'HOM.: 33302 LOI P.A.

CONTENU NET : 5-240mL

9272-9771 Québec Inc.  
326 Principale  
Courcelles, QC G0M 1C0  
CANADA  
Téléphone : 418-483-5943  
[www.aerokure.com](http://www.aerokure.com)

FABRIQUÉ AU CANADA U.P.C 0 55971

**MODE D'EMPLOI :** Appliquer en petite quantité, ne pas appliquer sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 6 heures si nécessaire. Repousse les moustiques (maringouins) pendant 6 heures. Repousse également les mouches noires (simulies), les brûlots les mouches à chevreuil (chrysopes, taons), les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats (rougets).

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche. Ne pas utiliser sur des enfants âgés de moins de 12 ans.

**PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire des petites gorgées d'eau si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir, sauf sur avis contraire d'un centre antipoison ou d'un médecin. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau, de 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes après 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou le nom du produit et le numéro d'homologation du produit antiparasitaire avec vous lorsque vous consultez un médecin.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter selon les symptômes.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.