

[FRONT PANEL]

Sergeant's Guardian contre les puces, les tiques et les moustiques sur les chiens (15 à 30 kg)



NE PAS UTILISER SUR LES CHATS

Toxique pour les chats. Les chats qui font leur toilette ou qui se trouvent physiquement proche de chiens récemment traités sont exposés à un risque d'effets nocifs, incluant la mort.



**ATTENTION
DOMESTIQUE
SOLUTION**

POISON

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS [entre 15 et 30 kg]

- Avec Nylar® régulateur de croissance des insectes
- Lutte contre les puces, les tiques et les moustiques pendant 3 semaines.
- Inhibe le développement des œufs de puces pendant 2 mois.
- Les puces qui réinfestent l'animal sont tuées en moins d'une heure.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N° D'HOMOL. 32546 LPA

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GARANTIE : Permethrine 45,0 % Nylar® Pyriproxifène 1,9 %

CONTENU NET : 1 -6 applicateurs de 3,0 mL

Rolf C. Hagen Inc.
20500 Autoroute transcanadienne
Baie d'Urfé, Qc, H9X 0A2
CANADA
Téléphone: 800-554-2436

Sergeant's Guardian contre les puces, les tiques et les moustiques sur les chiens (15 à 30 kg) est un produit efficace et facile à utiliser. Il inhibe le développement des œufs de puces, pondus sur les chiens traités, en adultes piqueurs pour une durée de 2 mois et il lutte contre les puces, les moustiques, les tiques sanguines, les tiques à pattes noires et les tiques américaines du chien pendant jusqu'à 3 semaines. Les tiques sur l'animal au moment du traitement peuvent mettre plusieurs jours avant de mourir. Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait s'avérer nécessaire.

MODE D'EMPLOI : Utiliser UNIQUEMENT sur les chiens âgés de plus de 3 mois et pesant entre 15 et 30 kg. NE PAS UTILISER SUR LES CHATS OU AUTRES ANIMAUX. Éviter le contact du produit avec les yeux du chien. NE PAS administrer par la gueule. Ne pas effectuer un traitement plus d'une fois toutes les 3 à 4 semaines. Répéter tous les mois pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation d'organismes nuisibles. L'efficacité du produit peut être affectée lorsque l'animal est lavé. SI SEULS LES TIQUES OU LES MOUSTIQUES SONT UN PROBLÈME, IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'UTILISER UN PRODUIT QUI CONTIENT DU PYRIPROXYFÈNE.

COMMENT APPLIQUER LE PRODUIT : Appliquer le contenu d'un tube (3,0 mL) de solution Sergeant's Guardian contre les puces, les tiques et les moustiques sur les chiens (15 à 30 kg) sur un seul chien. Détacher l'emballage suivant le pointillé et retirer le tube. Tenir le tube loin du visage et du corps, bout encoché vers le haut; couper le bout encoché du tube. Inverser le tube, puis séparer le poil sur le dos du chien au moyen du bout étroit du tube. En effectuant une pression ferme sur le tube, appliquer la solution au complet sur la peau du dos du chien, entre les omoplates. Envelopper et jeter le tube vide avec les ordures ménagères.

Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

Consulter un vétérinaire avant d'utiliser le produit sur les animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LES PERSONNES : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec l'animal de compagnie tant que le produit n'est pas sec. Ne pas utiliser sur les humains. Nocif en cas d'ingestion ou en cas d'absorption par la peau. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Peut irriter les yeux. Porter des gants de caoutchouc lors de l'application du produit. Après la manipulation du produit, se laver les mains à fond avec de l'eau et du savon. Utiliser uniquement dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur. Peut être nocif en cas d'inhalation. Éviter de respirer les vapeurs.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE : Pour usage externe uniquement sur les chiens. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser le produit sur les animaux gravides, malades, ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide. Ne pas utiliser sur les animaux qui allaitent ou sur les animaux âgés de

moins de 3 mois. Si l'on observe des effets secondaires, cesser le traitement. Si la condition ne s'améliore pas, consulter votre vétérinaire.

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS ou autres animaux que les chiens. Toxique pour les chats. Les chats qui font leur toilette ou qui se trouvent physiquement proche de chiens récemment traités sont exposés à un risque d'effets nocifs, incluant la mort. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Porter une attention particulière.

PREMIERS SOINS POUR LES PERSONNES : En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

PREMIERS SOINS POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE : S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal dans l'eau à laquelle a été ajouté un savon doux, puis rincer l'animal avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Lors de la consultation d'un médecin ou d'un vétérinaire, apporter le contenant ou l'étiquette, ou noter préalablement le nom du produit et le numéro d'homologation LPA.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes. Les réactions chez les chiens peuvent inclure une sensibilisation de la peau. Les chiens peuvent présenter des signes suivants : léthargie, augmentation du prurit (démangeaison), érythème (rougeur), éruption cutanée et décoloration du poil ou chute de poils sur les régions où le produit a été appliqué.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Entreposer dans un endroit frais et sec. Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

®Nylar est une marque de commerce de McLaughlin Gormley King Company.

[TUBE LABEL]

Sergeant's Guardian contre les puces, les tiques et les moustiques sur les chiens (15 à 30 kg)

3,0 mL

DOMESTIQUE
SOLUTION

GARANTIE :
PERMÉTHRINE 45,0 %
PYRIPROXYFÈNE 1,9 %
N° D'HOMOL. 32546 LPA

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



ATTENTION
Toxique pour les chats

POISON

LIRE L'EMBALLAGE AVANT L'UTILISATION

Rolf C. Hagen Inc.