

2019-4943  
2019-10-10

**NEU1173H RTU  
AVEC APPLICATEUR PULL'N SPRAY®**

[À REMPLISSAGES MULTIPLES]

Solution  
DOMESTIQUE  
PRÊT À L'UTILISATION  
HERBICIDE SÉLECTIF

PRINCIPE ACTIF : Fer (présent sous la forme de FeHEDTA) 0,25 %

Contient du 5-chloro-2-méthyle-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0007571 % et  
du 2-méthyle-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0002479 % à titre d'agents de conservation

N° D'HOM. : 29531 L.P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'USAGE  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
SENSIBILISANT POSSIBLE POUR LA PEAU

CRAINT LE GEL

CONTENU NET : 1 L à 6 L

W. Neudorff GmbH KG, An der Muhle 3,  
31860 Emmerthal, Allemagne

Agent canadien: Neudorff North America  
PO Box 178  
Brentwood Bay, C.-B. V8M 1R3  
250-652-5888

Pour usage sur parterre de pelouse composé d'un ou plusieurs incluant pâturin des prés, ray-grass vivace et fétuque (fétuque élevée, fétuque rouge gazonnante et/ou fétuque rampante) pour supprimer ou réprimer les mauvaises herbes à feuilles larges.

### **PARASITES/SITES :**

Supprime les mauvaises herbes de pelouse suivantes: pissenlit, pâquerette, agoséride glauque, trèfle rampant, luzerne lupuline, chardon vulgaire, chardon des champs (<15 cm de hauteur), mouron des oiseaux, renoncule rampante, véronique élancée, plantain lancéolé, plantain à grandes feuilles (répression seulement), géranium à feuilles molles, géranium sauvage, sparganium de pelouse, mousse et algue.

### **Avec pulvérisateur sous pression.**

*[Texte à placer à l'intérieur de la flèche.]*

Applicateur Pull'N Spray®

#### *[ILLUSTRATION #1]*

- Enlever le pulvérisateur du porteur auxiliaire et dérouler le tuyau complètement.
- Insérer la prise à l'extrémité du tuyau dans [la buse/le bec/le bouton/l'ouverture] du capuchon jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- [Basculer la buse vers le haut. /Lever le bec./Soulever le bec./Soulever le bec entièrement à la verticale./Tourner le [bec/bouton] à la position « ON »./Tirer le bec vers le haut.]

#### *[ILLUSTRATION #2]*

- Pointer le pulvérisateur à l'écart du corps.
- Prendre le pulvérisateur par la poignée.
- Tirer LENTEMENT sur la bague au bas de la poignée du pulvérisateur jusqu'à ce qu'elle s'arrête pour préparer le pulvérisateur.

#### *[ILLUSTRATION #3]*

- Tourner la buse à l'extrémité du pulvérisateur pour ajuster la répartition de la pulvérisation.

#### *[ILLUSTRATION #4]*

- Appuyer sur le bouton du pulvérisateur pour commencer la pulvérisation et le maintenir vers le bas pour une pulvérisation continue.
- Tirer sur la bague au bas du pulvérisateur de nouveau au besoin pour des pulvérisations supplémentaires.

Vider complètement le pulvérisateur avant d'entreposer. Tourner la buse du pulvérisateur à la position OFF. [Fermer le bec sur le bouchon./Rabaisser le bec sur le bouchon./Rabattre le bec complètement à plat pour fermer./Tourner le [bec/bouton] à la position « OFF »./Pousser le bec vers le bas.] **IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE DÉBRANCHER LE TUYAU DU PULVÉRISATEUR DU BOUCHON.** Remettre le pulvérisateur dans sa boîte sur le côté de la bouteille, la buse vers le bas.

## **MODE D'EMPLOI :**

**BIEN SECOUER AVANT L'USAGE.** Ne pas diluer. Suivre les illustrations et les directives pour préparer le pulvérisateur. Tourner la buse à l'extrémité du pulvérisateur pour ouvrir et ajuster la répartition de la pulvérisation. Tenir le pulvérisateur à l'écart du corps et appuyer sur le bouton du pulvérisateur pour commencer la pulvérisation. Tirer la bague à la base du pulvérisateur au besoin pour continuer la pulvérisation. Maintenir vers le bas pour une pulvérisation continue. Pulvériser les mauvaises herbes jusqu'à ce que le feuillage soit complètement détrempé, jusqu'au point de l'écoulement (200 - 400 mL/m<sup>2</sup>). Répéter le traitement toutes les 3 ou 4 semaines au besoin, jusqu'à 4 applications par endroit et par an. Des signes visibles de la suppression peuvent apparaître quelques heures après l'application. Les mauvaises herbes sensibles, les mousses ou les algues traitées deviendront brunes ou noires. De temps en temps, les brins d'herbe de pelouse peuvent s'assombrir après le traitement, cependant, l'herbe récupérera après quelques jours ou quelques semaines. Le traitement risque de tacher le feutrage racinaire ( herbe morte sous la pelouse), ceci n'affectera pas la santé de l'herbe.

**Précautions d'utilisation :** Ne pas appliquer sur de l'herbe desséchée. S'assurer que la pelouse est adéquatement arrosée avant l'application. Ne pas appliquer pendant la journée, lorsque la température dépasse 30 °C. Ne pas appliquer sur des gazons d'agrostis scabre. Si l'on est pas certain de la sensibilité de l'herbe, faire un essai de pulvérisation sur une petite partie de la pelouse. Ne pas appliquer sur les zones nouvellement ensemencées avant au moins quatre semaines suivant l'apparition des premières pousses de gazon. Éviter de pulvériser les plantes désirables. Si des plantes ou des endroits désirables sont accidentellement pulvérisés, les rincer tout de suite à l'eau. Pour éviter toutes taches, attendre que l'endroit traité sèche avant de pénétrer. Ne pas appliquer si la pluie est censée tomber dans les 3 heures suivant l'application. Ne pas arroser dans les 3 heures suivant l'application. NE PAS contaminer les réserves d'eau d'irrigation ou d'eau potable ou les habitats aquatiques en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets.

[optional text in brackets]

## **[DIRECTIVES POUR RÉUTILISATION ET RECHARGEMENT :**

Recharger uniquement avec NEU1173H RTU RECHARGE, PA# 31065.

Pour recharger, enlever tout le mécanisme de pompage et verser soigneusement et directement dans le contenant vide. Afin de minimiser le risque d'éclaboussures et les déversements, l'utilisation d'un entonnoir est recommandée lors du transfert de solution d'un récipient à un autre.]

**PRÉCAUTIONS :** ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Cause une légère irritation des yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Se laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon après la manutention et avant de manger, de boire et de mâcher de la gomme ou du tabac. ÉVITER TOUT contact avec les yeux. Éviter tout contact de la main à la bouche. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Ne pas pénétrer ou permettre à quelqu'un de pénétrer dans les endroits traités avant que le produit ait séché. Le contact prolongé ou fréquemment répété avec la peau peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

**PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :**

Traiter symptomatiquement.

**ENTREPOSAGE :**

Ranger ce produit dans son contenant original et conserver dans un endroit sécurisé, hors de l'atteinte des enfants et des animaux domestiques. Conserver tout matériel non utilisé hermétiquement fermé, dans le contenant original seulement, à l'écart de toute flamme nue. Craint le gel. Pour éviter la contamination conserver ce produit à l'écart de la nourriture pour les humains ou les animaux.

**ÉLIMINATION :**

Envelopper le contenant vide et le jeter dans les ordures ménagères. [Utiliser uniquement pour recharger le contenant vide avec NEU1173H RTU RECHARGE, PA# 31065.] Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins ou recharger avec n'importe quel autre produit. Les produits inutilisés ou partiellement utilisés doivent être jetés dans des endroits provinciaux ou municipaux conçus pour l'élimination des déchets dangereux.

**AVIS À L'UTILISATEUR :**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

Pull'n Spray® est une marque de commerce déposée de OMS Investments, Inc., utilisée sous licence par Scotts Canada Ltd

**HERBICIDE SÉLECTIF POUR MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES**

Fabriqué avec du fer

2019-4943  
2019-10-10

Les personnes et les animaux domestiques peuvent pénétrer dans l'endroit traité après séchage de la pulvérisation.

Aucune odeur désagréable

Éviter la pluie pendant 3 heures

Résultats visibles en quelques heures

LE MODE D'APPLICATION LE PLUS FACILE!

1 ACTION = 40 JETS DE GÂCHETTE [FLASH]

DÉTRUIT LES MAUVAISES HERBES, PAS LA PELOUSE