

2017-2005
2018-11-09

Étiquette du contenant

GROUPE	1B	INSECTICIDE
--------	----	-------------

PYRINEX^{MD} 450 LV EC

Insecticide

CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE

AGRICOLE

Contient du chlorpyrifos

Il est interdit d'utiliser ce produit dans les habitations ou autres aires résidentielles, telles que les parcs, les terrains d'écoles et les terrains de jeux, ni autour de celles-ci. Il est interdit aux particuliers ou autres utilisateurs non accrédités d'utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT



POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE CI-JOINTE AVANT L'UTILISATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF : Chlorpyrifos 450 g/L

Avertissement, contient l'allergène soya

N° D'HOMOLOGATION 33113 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ADAMA Agricultural Solutions Canada, Ltd.
300 – 191 Lombard Avenue
Winnipeg MB R3B 0X1
855-264-6262

CONTENU NET : 2- 1050 litres

DÉTACHER LE MODE D'EMPLOI EN SUIVANT LE POINTILLÉ. CETTE PARTIE-CI DOIT RESTER ATTACHÉE AU CONTENANT.

MISES EN GARDE

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Toxique ou mortel en cas d'ingestion. Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec les yeux. Ne manipuler le produit que lorsque la ventilation est adéquate. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit et avant de manger ou de fumer. Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les laver séparément des autres vêtements avant de les réutiliser. Détruire les articles en cuir contaminés, y compris les chaussures. Ne pas appliquer ce produit de manière à exposer directement les travailleurs ou autres personnes.

L'application est limitée aux cultures agricoles, seulement lorsque le risque de dérive est faible vers les zones d'habitation ou vers des zones d'activité humaine telles des résidences, chalets, écoles et superficies récréatives. Prendre en considération la vitesse et la direction du vent, les inversions de température, la calibration de l'équipement d'application et du pulvérisateur.

MISES EN GARDE À L'INTENTION DES PRÉPOSÉS AU MÉLANGE OU AU CHARGEMENT Pour les formulations emballées dans des récipients de plus de 10 L

Les préposés au mélange ou au chargement doivent employer un système de chargement fermé à transfert mécanique. Ils doivent également porter :

- une combinaison par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long
- des gants résistant aux produits chimiques
- des lunettes de protection
- un respirateur à adduction d'air filtré muni d'un filtre de série -R ou -P
- des chaussettes et des chaussures

Pour les formulations emballées dans des récipients de 10 L ou moins

Les préposés au mélange ou au chargement doivent porter :

- une combinaison résistant aux produits chimiques par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long
- des gants résistant aux produits chimiques
- des lunettes de protection
- des chaussures résistant aux produits chimiques et des chaussettes
- un respirateur à adduction d'air filtré muni d'un filtre de série -R ou -P

MISES EN GARDE À L'INTENTION DES OPÉRATEURS ANTIPARASITAIRES

Ne pas appliquer à l'aide d'un équipement de nettoyage manuel à haute pression.

Les opérateurs antiparasitaires se servant d'un appareil d'épandage au sol à cabine fermée doivent porter :

- une chemise à manches longues et un pantalon long
- des gants résistant aux produits chimiques lorsqu'ils quittent la cabine pour effectuer un nettoyage ou des réparations (il faut enlever les gants avant de pénétrer dans la cabine de nouveau)
- des chaussettes et des chaussures

Les opérateurs antiparasitaires se servant d'un appareil d'épandage au sol à cabine ouverte doivent porter :

- une combinaison par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long
- des gants résistant aux produits chimiques
- des lunettes de protection
- des chaussettes et des chaussures

Les opérateurs antiparasitaires se servant d'un équipement d'épandage aérien doivent utiliser une cabine fermée et porter :

- une chemise à manches longues et un pantalon long
- des chaussettes et des chaussures

Les opérateurs antiparasitaires se servant d'un équipement manuel doivent porter :

- une chemise à manches longues et un pantalon long

- une combinaison résistant aux produits chimiques et un casque protecteur (si la pulvérisation est dirigée vers le haut)
- des chaussures résistant aux produits chimiques et des chaussettes
- des gants résistant aux produits chimiques
- des lunettes de protection
- un respirateur à adduction d'air filtré muni d'un filtre de série -R ou -P

MISES EN GARDE PENDANT LE NETTOYAGE ET LES RÉPARATIONS

Porter :

- une combinaison par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long
- des gants résistant aux produits chimiques
- des chaussures résistant aux produits chimiques et des chaussettes
- des lunettes de protection
- un respirateur à adduction d'air filtré muni d'un filtre de série -R ou -P

Délai de sécurité

Culture	Activité	Délai de sécurité (DS)
Chou-fleur	Toute	10 jours
Avelines	Dépistage	4 jours
Toutes les autres cultures	Toute	1 jour

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

DANGERS

Ce produit contient une matière active et des distillats de pétrole aromatiques qui sont toxiques pour les organismes aquatiques. NE PAS contaminer l'approvisionnement en eau d'irrigation, en eau potable ou les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets. Puisque ce produit n'est pas homologué pour la suppression des ravageurs dans les systèmes aquatiques, NE PAS l'utiliser pour supprimer les ravageurs aquatiques.

Il ne faut pas récolter pour la consommation humaine ou animale les céréales plantées comme culture de couverture et traitées à l'insecticide PYRINEX 450 LV EC si le traitement a été effectué dans les 60 jours avant la récolte. Récupérer la matière renversée à l'aide d'une matière absorbante et l'éliminer selon une manière approuvée.

TOXIQUE pour les oiseaux. TOXIQUE pour les mammifères sauvages. Ce produit est TOXIQUE pour les abeilles exposées directement au produit pendant le traitement, à la dérive ou aux résidus présents sur les plantes en fleurs. Ne pas utiliser sur les cultures ou les mauvaises herbes en fleurs. TOXIQUE pour certains insectes bénéfiques. Minimiser la dérive de pulvérisation en vue de réduire les effets nocifs sur les insectes bénéfiques dans les habitats situés près de la zone de traitement telle que les haies et les forêts-parcs.

NE PAS traiter de plantes ou de mauvaises herbes en fleurs avec ce produit ni permettre qu'il dérive en direction de celles-ci si des abeilles butinent dans le secteur traité. Les opérateurs antiparasitaires doivent informer les apiculteurs de la région avant le traitement si des ruches se trouvent dans les champs adjacents. Minimiser la dérive de pulvérisation en vue de réduire les effets nocifs sur les abeilles dans les habitats situés près de la zone de traitement.

Afin d'éviter la contamination des habitats aquatiques par le ruissellement en provenance des zones traitées, il convient d'examiner les conditions et les caractéristiques du site avant de procéder au traitement. Parmi les conditions et caractéristiques pouvant favoriser le ruissellement figurent notamment les épisodes de fortes précipitations, un sol en pente modérée à abrupte, un sol nu et un sol mal drainé (p. ex., sol compacté ou sol à texture fine, tel que l'argile).

Éviter d'appliquer ce produit lorsqu'une pluie abondante est prévue.

Le potentiel de contamination des milieux aquatiques par le ruissellement peut être réduit grâce à l'aménagement d'une bande de végétation (zone tampon) entre la zone traitée et la rive du plan d'eau.

PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Le chlorpyrifos, un composé organophosphoré, est un inhibiteur de la cholinestérase. Parmi les symptômes typiques d'une surexposition aux inhibiteurs de la cholinestérase, on compte les maux de tête, les nausées, l'étourdissement, les sueurs, la salivation, l'écoulement nasal et le larmolement. Dans les cas d'intoxication plus grave, les symptômes peuvent aller jusqu'à des secousses musculaires, une faiblesse, des tremblements, un manque de coordination, des vomissements, des crampes abdominales et de la diarrhée. L'intoxication peut être mortelle en cas d'évanouissement, d'incontinence, de convulsions et de dépression respiratoire avec composante cardiovasculaire secondaire. Traiter selon les symptômes. Après une exposition, des tests de cholinestérase du plasma et des globules rouges peuvent indiquer le degré d'exposition (les données de référence sont utiles). L'atropine, administrée uniquement par injection, est le meilleur antidote. Les oximes, comme le chlorure de pralidoxime, peuvent avoir un effet thérapeutique s'ils sont administrés à un stade précoce; or, ils doivent être utilisés uniquement avec l'atropine. En cas d'intoxication aiguë grave, administrer les antidotes immédiatement après avoir ouvert les voies respiratoires et rétabli la respiration. En cas d'exposition par voie orale, la décision de provoquer ou non le vomissement doit être prise par le médecin traitant.

REMARQUE : Le produit contient un solvant à base de distillat de pétrole.

Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition. Si un lavage est administré, suggérer un examen endotrachéal et/ou œsophagien. Le danger dû à l'aspiration doit être évalué en fonction de la toxicité lorsqu'on considère un lavage gastrique. En cas de brûlure, traiter comme une brûlure thermique, après la décontamination.

DANGERS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

COMBUSTIBLE. Ne pas entreposer ni utiliser près d'une source de chaleur ou d'une flamme nue.

ÉLIMINATION

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché.

Avant d'aller y porter le contenant point de collecte le plus rapproché

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

Brochure détachable

GROUPE

1B

INSECTICIDE

PYRINEX^{MD} 485 LV EC

Insecticide

CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE

AGRICOLE

Contient du chlorpyrifos

Il est interdit d'utiliser ce produit dans les habitations ou autres aires résidentielles, telles que les parcs, les terrains d'écoles et les terrains de jeux, ni autour de celles-ci. Il est interdit aux particuliers ou autres utilisateurs non accrédités d'utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT



POISON

IRRITANT POUR LES YEUX

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE CI-JOINTE AVANT L'UTILISATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF : Chlorpyrifos 450 g/L

Avertissement, contient l'allergène soya

N° D'HOMOLOGATION 33113 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ADAMA Agricultural Solutions Canada, Ltd.

300 – 191 Lombard Avenue

Winnipeg MB R3B 0X1

855-264-6262

CONTENU NET : 2- 1050 litres

MISES EN GARDE

Toxique ou mortel en cas d'ingestion. Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec les yeux. Ne manipuler le produit que lorsque la ventilation est adéquate. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit et avant de manger ou de fumer. Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les laver séparément des autres vêtements avant de les réutiliser. Détruire les articles en cuir contaminés, y compris les chaussures. Ne pas appliquer ce produit de manière à exposer directement les travailleurs ou autres personnes.

L'application est limitée aux cultures agricoles, seulement lorsque le risque de dérive est faible vers les zones d'habitation ou vers des zones d'activité humaine telles des résidences, chalets, écoles et superficies récréatives. Prendre en considération la vitesse et la direction du vent, les inversions de température, la calibration de l'équipement d'application et du pulvérisateur.

MISES EN GARDE À L'INTENTION DES PRÉPOSÉS AU MÉLANGE OU AU CHARGEMENT Pour les formulations emballées dans des récipients de plus de 10 L

Les préposés au mélange ou au chargement doivent employer un système de chargement fermé à transfert mécanique. Ils doivent également porter :

- une combinaison par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long
- des gants résistant aux produits chimiques
- des lunettes de protection
- un respirateur à adduction d'air filtré muni d'un filtre de série -R ou -P
- des chaussettes et des chaussures

Pour les formulations emballées dans des récipients de 10 L ou moins

Les préposés au mélange ou au chargement doivent porter :

- une combinaison résistant aux produits chimiques par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long
- des gants résistant aux produits chimiques
- des lunettes de protection
- des chaussures résistant aux produits chimiques et des chaussettes
- un respirateur à adduction d'air filtré muni d'un filtre de série -R ou -P

MISES EN GARDE À L'INTENTION DES OPÉRATEURS ANTIPARASITAIRES

Ne pas appliquer à l'aide d'un équipement de nettoyage manuel à haute pression.

Les opérateurs antiparasitaires se servant d'un appareil d'épandage au sol à cabine fermée doivent porter :

- une chemise à manches longues et un pantalon long
- des gants résistant aux produits chimiques lorsqu'ils quittent la cabine pour effectuer un nettoyage ou des réparations (il faut enlever les gants avant de pénétrer dans la cabine de nouveau)
- des chaussettes et des chaussures

Les opérateurs antiparasitaires se servant d'un appareil d'épandage au sol à cabine ouverte doivent porter :

- une combinaison par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long
- des gants résistant aux produits chimiques
- des lunettes de protection
- des chaussettes et des chaussures

Les opérateurs antiparasitaires se servant d'un équipement d'épandage aérien doivent utiliser une cabine fermée et porter :

- une chemise à manches longues et un pantalon long
- des chaussettes et des chaussures

Les opérateurs antiparasitaires se servant d'un équipement manuel doivent porter :

- une chemise à manches longues et un pantalon long
- une combinaison résistant aux produits chimiques et un casque protecteur (si la pulvérisation est dirigée vers le haut)

- des chaussures résistant aux produits chimiques et des chaussettes
- des gants résistant aux produits chimiques
- des lunettes de protection
- un respirateur à adduction d'air filtré muni d'un filtre de série -R ou -P

MISES EN GARDE PENDANT LE NETTOYAGE ET LES RÉPARATIONS

Porter :

- une combinaison par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long
- des gants résistant aux produits chimiques
- des chaussures résistant aux produits chimiques et des chaussettes
- des lunettes de protection
- un respirateur à adduction d'air filtré muni d'un filtre de série -R ou -P

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

DANGERS

Ce produit contient une matière active et des distillats de pétrole aromatiques qui sont toxiques pour les organismes aquatiques. **NE PAS** contaminer l'approvisionnement en eau d'irrigation, en eau potable ou les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets. Puisque ce produit n'est pas homologué pour la suppression des ravageurs dans les systèmes aquatiques, **NE PAS** l'utiliser pour supprimer les ravageurs aquatiques. Il ne faut pas récolter pour la consommation humaine ou animale les céréales plantées comme culture de couverture et traitées à l'insecticide PYRINEX 450 LV EC si le traitement a été effectué dans les 60 jours avant la récolte. Récupérer la matière renversée à l'aide d'une matière absorbante et l'éliminer selon une manière approuvée.

TOXIQUE pour les oiseaux. **TOXIQUE** pour les mammifères sauvages. Ce produit est **TOXIQUE** pour les abeilles exposées directement au produit pendant le traitement, à la dérive ou aux résidus présents sur les plantes en fleurs. Ne pas utiliser sur les cultures ou les mauvaises herbes en fleurs. **TOXIQUE** pour certains insectes bénéfiques. Minimiser la dérive de pulvérisation en vue de réduire les effets nocifs sur les insectes bénéfiques dans les habitats situés près de la zone de traitement telle que les haies et les forêts-parcs.

NE PAS traiter de plantes ou de mauvaises herbes en fleurs avec ce produit ni permettre qu'il dérive en direction de celles-ci si des abeilles butinent dans le secteur traité. Les opérateurs antiparasitaires doivent informer les apiculteurs de la région avant le traitement si des ruches se trouvent dans les champs adjacents. Minimiser la dérive de pulvérisation en vue de réduire les effets nocifs sur les abeilles dans les habitats situés près de la zone de traitement.

Afin d'éviter la contamination des habitats aquatiques par le ruissellement en provenance des zones traitées, il convient d'examiner les conditions et les caractéristiques du site avant de procéder au traitement. Parmi les conditions et caractéristiques pouvant favoriser le ruissellement figurent notamment les épisodes de fortes précipitations, un sol en pente modérée à abrupte, un sol nu et un sol mal drainé (p. ex., sol compacté ou sol à texture fine, tel que l'argile).

Éviter d'appliquer ce produit lorsqu'une pluie abondante est prévue.

Le potentiel de contamination des milieux aquatiques par le ruissellement peut être réduit grâce à l'aménagement d'une bande de végétation (zone tampon) entre la zone traitée et la rive du plan d'eau.

PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Le chlorpyrifos, un composé organophosphoré, est un inhibiteur de la cholinestérase. Parmi les symptômes typiques d'une surexposition aux inhibiteurs de la cholinestérase, on compte les maux de tête, les nausées, l'étourdissement, les sueurs, la salivation, l'écoulement nasal et le larmolement. Dans les cas d'intoxication plus grave, les symptômes peuvent aller jusqu'à des secousses musculaires, une faiblesse, des tremblements, un manque de coordination, des vomissements, des crampes abdominales et de la diarrhée. L'intoxication peut être mortelle en cas d'évanouissement, d'incontinence, de convulsions et de dépression respiratoire avec composante cardiovasculaire secondaire. Traiter selon les symptômes. Après une exposition, des tests de cholinestérase du plasma et des globules rouges peuvent indiquer le degré d'exposition (les données de référence sont utiles). L'atropine, administrée uniquement par injection, est le meilleur antidote. Les oximes, comme le chlorure de pralidoxime, peuvent avoir un effet thérapeutique s'ils sont administrés à un stade précoce; or, ils doivent être utilisés uniquement avec l'atropine. En cas d'intoxication aiguë grave, administrer les antidotes immédiatement après avoir ouvert les voies respiratoires et rétabli la respiration. En cas d'exposition par voie orale, la décision de provoquer ou non le vomissement doit être prise par le médecin traitant.

REMARQUE : Le produit contient un solvant à base de distillat de pétrole.

Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition. Si un lavage est administré, suggérer un examen endotrachéal et/ou œsophagien. Le danger dû à l'aspiration doit être évalué en fonction de la toxicité lorsqu'on considère un lavage gastrique. En cas de brûlure, traiter comme une brûlure thermique, après la décontamination.

DANGERS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

COMBUSTIBLE. Ne pas entreposer ni utiliser près d'une source de chaleur ou d'une flamme nue.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

L'insecticide PYRINEX 450 LV EC agit contre divers insectes nuisibles comme insecticide d'ingestion, au contact et sous l'action des vapeurs. Il ne présente aucune action systémique et son action résiduelle est de courte durée lorsqu'il est exposé à la lumière ultraviolette (UV) en présence d'une légère humidité. L'absence de lumière UV prolonge l'activité résiduelle. Utiliser la dose supérieure d'insecticide PYRINEX 450 LV EC lorsque la surface du sol à traiter est extrêmement sèche ou en cas de fortes infestations d'insectes nuisibles. Ne pas incorporer les traitements de préplantation aux sols organiques. Si on la pratique, l'incorporation aux sols minéraux doit rester superficielle (5 cm de profondeur). Pour l'application foliaire, on obtient les meilleurs résultats en effectuant le traitement en début de soirée. Le traitement doit utiliser suffisamment d'eau pour assurer une couverture complète du sol, de la végétation ou des insectes nuisibles ciblés.

Délais de sécurité

Culture	Activité	Délai de sécurité (DS)
Chou-fleur	Toute	10 jours
Avelines	Dépistage	4 jours
Toutes les autres cultures	Toute	1 jour

INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE

Ajouter la quantité requise d'insecticide PYRINEX 450 LV EC dans le réservoir de pulvérisation rempli au $\frac{2}{3}$ avec

le volume de pulvérisation final voulu, en agitant. Ajouter le reste de l'eau nécessaire pour atteindre le volume final voulu. Pour assurer un mélange homogène, laisser l'agitateur en marche durant le mélange et l'application. Pour empêcher la phytotoxicité, ne pas mélanger avec d'autres pesticides ni traiter les plantes soumises à une sécheresse extrême.

ENTREPOSAGE

Ne pas contaminer l'eau ni la nourriture humaine ou animale lors de l'entreposage ou de l'élimination des déchets. Éviter d'entreposer le produit à une température élevée. Craint l'humidité. Éviter de contaminer l'eau, les acides ou les alcalins. Ne pas entreposer le produit près d'une source de chaleur ou d'une flamme nue. Garder le contenant fermé.

ÉLIMINATION

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché.

Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

ÉPANDAGE AÉRIEN

Mode d'emploi

Épandre seulement avec un avion ou un hélicoptère réglé et étalonné pour être utilisé dans les conditions atmosphériques de la région et selon les taux et directives figurant sur l'étiquette. Les précautions à prendre ainsi que les directives et taux d'épandage à respecter sont propres au produit. Lire attentivement l'étiquette et s'assurer de bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Utiliser seulement les quantités recommandées pour l'épandage aérien qui sont indiquées sur l'étiquette. Si, pour l'utilisation prévue du produit, aucun taux d'épandage aérien ne figure sur l'étiquette, on ne peut utiliser ce produit, et ce, quel que soit le type d'appareil aérien disponible. S'assurer que l'épandage est uniforme. Afin d'éviter que le produit ne soit épandu de façon non uniforme (épandage en bandes, irrégulier ou double), utiliser des marqueurs appropriés.

Mises en garde concernant l'utilisation

Épandre seulement quand les conditions météorologiques à l'endroit traité permettent une couverture complète et uniforme de la culture visée. Les conditions favorables spécifiques à l'épandage aérien décrites dans le *Guide national d'apprentissage – Application de pesticides par aéronef*, élaboré par le Comité fédéral, provincial et territorial sur la lutte antiparasitaire et les pesticides, doivent être présentes. Ne pas épandre de pesticides sur les étendues d'eau. Éviter que la dérive n'atteigne une étendue d'eau ou tout autre endroit non visé. Les zones tampons indiquées devraient être respectées. Les grosses gouttelettes sont moins sujettes à la dérive; il faut donc éviter les pressions et les types de buses qui permettent la formation de fines particules (brume). Ne pas épandre par temps mort ou lorsque la vitesse du vent et son orientation peuvent provoquer une dérive. Ne pas épandre également lorsque le vent souffle en direction d'une culture, d'un jardin, d'un habitat terrestre (p. ex., plantations brise-vent) ou aquatique vulnérable.

Mises en garde concernant l'opérateur

Ne pas permettre au pilote de mélanger les produits chimiques qui seront embarqués à bord de l'appareil. Il peut toutefois charger des produits chimiques pré-mélangés contenus dans un système fermé. Il serait préférable que le pilote puisse établir une communication à chaque emplacement traité au moment de l'épandage. Le personnel au sol de même que les personnes qui s'occupent des mélanges et du chargement doivent porter des gants, des combinaisons et des lunettes ou un masque les protégeant contre les produits chimiques durant le mélange des produits, le chargement, le nettoyage et les réparations. Lorsque les précautions qu'on recommande à l'opérateur de prendre sont plus strictes que les recommandations générales qui figurent sur les étiquettes pour épandage avec pulvérisateur terrestre, suivre les précautions les plus rigoureuses. Tout le personnel doit se laver les mains et le visage à grande eau avant de manger et de boire. Les vêtements protecteurs, le cockpit de l'avion et les cabines des véhicules doivent être décontaminés régulièrement.

Mises en garde propres au produit

Lire attentivement l'étiquette au complet et bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Pour toute question, appeler le fabricant en composant le 1-919 256-9300. Pour obtenir des conseils techniques, contacter le distributeur ou un conseiller agricole provincial. L'épandage de ce produit spécifique doit répondre aux exigences suivantes :
Autres précautions et doses recommandées : voir les directives propres à chaque culture.

MODE D'EMPLOI

RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE

Aux fins de la gestion de la résistance, PYRINEX 450 LV EC contient un insecticide du groupe 1B. Toute population d'insectes peut renfermer des individus naturellement résistants à PYRINEX 450 LV EC et à d'autres insecticides du groupe 1B. Les individus résistants peuvent finir par dominer au sein de leur population des insectes si des insecticides de ce groupe sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut aussi exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux insecticides :

- Dans la mesure du possible, alterner le PYRINEX 450 LV EC ou les insecticides du même groupe 1B avec des insecticides qui appartiennent à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes nuisibles.
- Utiliser, si cet emploi est permis, des mélanges en cuve contenant des insecticides ou des acaricides qui appartiennent à des groupes différents et qui sont efficaces contre les organismes nuisibles ciblés..
- Utiliser les insecticides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée qui privilégie le dépistage et la consultation de données antérieures sur l'utilisation des pesticides de même que l'intégration de pratiques culturales ou biologiques ou d'autres formes de lutte chimique..
- Surveiller les populations d'organismes nuisibles traitées pour y déceler les signes éventuels de l'acquisition d'une résistance.
- Communiquer avec les spécialistes ou les conseillers agricoles certifiés de la région pour obtenir des recommandations supplémentaires sur un site ou un organisme nuisible précis pour ce qui est de la gestion de la résistance aux pesticides et de la lutte intégrée..
- Pour obtenir davantage d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, communiquer avec ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. au 1 855-264-6262 ou à www.ADAMA.ca

Zones tampons en vue de protéger les habitats aquatiques

Toutes les applications : NE PAS procéder à l'épandage pendant les périodes de calme plat. Éviter d'appliquer le produit lorsque les vents soufflent en rafales.

Épandage aérien : NE PAS appliquer le produit lorsque la vitesse du vent est supérieure à 16 km/h à la hauteur de vol au-dessus du site d'épandage. Seules les buses de type CP® sont permises, avec les restrictions suivantes relatives au réglage :

Type de buse	Restriction
CP®	PAS de déflexion supérieure à 30°

Zones tampons

Les zones tampons indiquées dans le tableau ci-dessous doivent être aménagées entre le point d'application directe et la limite la plus rapprochée en aval des habitats aquatiques sensibles (tels que : lacs, rivières, marécages, étangs, fondrières des Prairies, criques, marais, cours d'eau, réservoirs et zones humides) et des habitats estuariens ou marins.

Épandage aérien

Pour l'épandage aérien, il faut aménager une zone tampon de 100 mètres pour protéger les habitats aquatiques.

Traitement par vaporisateur agricole^{1,2}

Dose d'application (L/ha)	Zones tampons (mètres) requises pour protéger les habitats aquatiques d'une profondeur de :		
	< 1 mètre	1 à 3 mètres	> 3 mètres
Jusqu'à 1,2	50	40	30
Plus de 1,2 et moins de ou égal à 2,4	55	45	35
Plus de 2,4 et jusqu'à 4,8	60	50	40

Pour les mélanges en cuve, consulter les étiquettes des produits d'association et respecter la zone tampon la plus étendue (la plus restrictive) des produits faisant partie du mélange en cuve et appliquer en utilisant la pulvérisation de catégorie la plus grossière (ASAE) indiquée sur les étiquettes des produits d'association.

¹ Dans le cas de la pulvérisation agricole, il est possible de réduire les zones tampons au moyen d'écrans de réduction de la dérive. Les pulvérisateurs dont la rampe d'aspersion est équipée d'un écran sur toute sa longueur et qui s'étend jusqu'au couvert végétal ou au sol permettent de réduire la zone tampon figurant sur l'étiquette de 70 %. L'utilisation d'une rampe d'aspersion dont chaque buse est munie d'un écran conique fixé à une hauteur inférieure à 30 cm du couvert végétal ou du sol permet de réduire la zone tampon figurant sur l'étiquette de 30 %.

² Il n'est pas nécessaire d'aménager une zone tampon pour les traitements de bassinage (p. ex., arrosage du pied pour supprimer la mouche du chou, la mouche de l'oignon et la mouche des légumineuses).

NE PAS appliquer ce produit directement sur les habitats aquatiques (tels que : lacs, rivières, marécages, étangs, fondrières des Prairies, criques, marais, cours d'eau, réservoirs, fossés et zones humides) ni sur les habitats estuariens ou marins.

NE PAS contaminer l'eau d'irrigation, l'approvisionnement en eau potable ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

L'épandage aérien n'est permis que lorsque indiqué dans le mode d'emploi.

Il faut respecter un intervalle de replantation de 30 jours entre le traitement et les semis des cultures de rotation, sauf le radis, le chou chinois, le pak-choï et les choux, n'ayant aucune restriction relative à la replantation.

Cultures, organismes nuisibles	Doses et modes d'emploi
CANOLA	Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Ne pas appliquer moins de 21 jours avant la récolte. Le traitement est permis à l'aide d'un appareil au sol ou par épandage aérien lorsque indiqué. Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.

Cultures, organismes nuisibles	Doses et modes d'emploi
Légionnaire bertha, autographe de la luzerne, noctuelle ponctuée	Dose de 0,80 à 1.07 litres dans 50 à 200 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol, ou dans 10 à 30 L/ha pour épandage aérien. Pulvériser sur les feuilles. Choisir le taux de dilution le plus élevé lorsque les infestations sont graves et que le feuillage est dense. Pulvériser le soir pour éviter de nuire aux pollinisateurs.
Fausse-teigne des crucifères (larves)	Dose de 1.07 à 1,6 litres dans 50 à 200 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol, ou dans 40 L/ha pour épandage aérien. Pulvériser sur les feuilles. Choisir le taux de dilution le plus élevé lorsque les infestations sont graves et que le feuillage est dense. Pulvériser le soir pour éviter de nuire aux pollinisateurs.
Punaise terne	Dose de 0,53 à 1.07 litres dans 50 à 200 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol, ou dans 10 à 30 L/ha pour épandage aérien. Pulvériser sur les feuilles. Choisir le taux de dilution le plus élevé lorsque les infestations sont graves et que le feuillage est dense. Pulvériser le soir pour éviter de nuire aux pollinisateurs.
Légionnaire grise, ver-gris moissonneur, ver-gris orthogonal, ver-gris à dos rouge, ver-gris panaché	Dose de 0,93 à 1,28 litres dans 50 à 200 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol, ou dans 10 à 30 L/ha pour épandage aérien. Pulvériser sur le sol ou sur les feuilles. Ne pas incorporer les traitements de préplantation aux sols organiques. L'incorporation aux sols minéraux ne doit pas dépasser une profondeur de 5 cm.
Sauterelles	Dose de 0,62 à 0,93 litres dans 50 à 200 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol, ou dans 10 à 30 L/ha pour épandage aérien. Pulvériser sur les feuilles. Choisir la dose inférieure contre les jeunes sauterelles et la dose supérieure contre les sauterelles adultes. Il faut appliquer le produit dès que les signes d'infestation se manifestent dans les zones adjacentes non pâturées ni occupées comme les bords de chemins, les emprises et le long des clôtures.
LIN	Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Ne pas appliquer moins de 21 jours avant la récolte. Le traitement est permis à l'aide d'un appareil au sol ou par épandage aérien lorsque indiqué. Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.
Légionnaire bertha	Dose de 0,80 à 1.07 litres dans 50 à 200 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol et 10 à 30 L/ha pour épandage aérien. Pulvériser sur les feuilles. Choisir le taux de dilution le plus élevé lorsque les larves sont plus grosses ou lorsque le feuillage est dense.
Légionnaire grise, ver-gris moissonneur, ver-gris orthogonal, ver-gris à dos rouge, ver-gris panaché, noctuelle ponctuée	Dose de 0,93 à 1,28 litres dans 50 à 200 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol, ou dans 10 à 30 L/ha pour épandage aérien. Appliquer sur le sol ou sur les feuilles.
LENTILLES	Le traitement est permis à l'aide d'un appareil au sol ou par épandage aérien lorsque indiqué. Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Ne pas appliquer moins de 21 jours avant la récolte pour les doses allant jusqu'à 0,93 L/ha. Pour les doses supérieures à 0,93 L/ha, ne pas appliquer moins de 60 jours avant la récolte. Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.
Ver-gris orthogonal	Dose de 0,93 à 1,28 litres dans 100 à 200 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol, ou dans 20 L/ha pour épandage aérien. Dès l'apparition des dégâts, effectuer un épandage à la volée.

Cultures, organismes nuisibles	Doses et modes d'emploi
Sauterelles	Dose de 0,64 à 1,28 litres dans 50 à 200 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol, ou dans 10 à 30 L/ha pour épandage aérien. Appliquer une fois par année entre la floraison et le début de la formation des cosses de la culture. Il est essentiel de couvrir uniformément la culture et le couvert. Adopter la dose inférieure contre les jeunes sauterelles et la dose supérieure contre les sauterelles adultes. Il faut appliquer le produit dès que les signes d'infestation se manifestent dans les zones adjacentes non pâturées ni occupées comme les bords de chemins, les emprises et le long des clôtures.
MAÏS (CHAMPS, SUCRÉ)	Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Ne pas appliquer moins de 70 jours avant la récolte. Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.
Ver-gris noir, ver-gris moissonneur, ver-gris à dos rouge	<p>TRAITEMENT DU SOL (PRÉSEMIS) : Dose de 2,56 litres dans 200 à 400 L/ha. Pulvériser une fois comme traitement du sol 3 à 7 jours avant les semis. Ne pas incorporer. Appliquer également le long des clôtures adjacentes sur une bande de 15 m de largeur.</p> <p>TRAITEMENT DES SEMIS : Dose de 1,28 à 2,56 litres dans 200 à 400 L/ha. Effectuer un seul épandage à la volée au stade de 2 à 5 feuilles de la culture.</p>
FRAISES	Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Ne pas appliquer moins de 20 jours avant la récolte. Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.
Noctuelle du fraisier	Dose de 1,25 à 1,28 litres dans 2 000 L/ha. Appliquer une seule fois comme pulvérisation foliaire entre le 1 ^{er} et le 15 juin. L'usage d'une quantité abondante d'eau permet de mouiller à fond le collet des plantes.
RADIS DU JAPON (LO BOK, DAIKON)	Ne pas traiter plus de 3 fois par saison. Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Ne pas appliquer moins de 32 jours avant la récolte. Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.
Mouche du chou	Dose de 0,22 litres dans 1 000 L d'eau par 1 000 m de rangée. Bassinage des rangées ensemencées 7, 20 et 35 jours après le semis.
RADIS	Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Ne pas appliquer moins de 21 jours avant la récolte. Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.
Mouche du chou	Dose de 91 mL dans 380 L d'eau par 1 000 m de rangée. Bassinage avec les semences au moment du semis.
CÉLERI, CONCOMBRE, POIVRON (VERT)	Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Ne pas appliquer moins de 70 jours avant la récolte pour le céleri, 40 jours avant la récolte pour le poivron ou moins de 60 jours avant la récolte pour le concombre. Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.

Cultures, organismes nuisibles	Doses et modes d'emploi
Ver-gris noir, ver-gris moissonneur, ver-gris à dos rouge	<p>TRAITEMENT DU SOL : Dose de 2,56 litres dans 200 à 400 L/ha. Traiter le sol une seule fois de 3 à 7 jours avant les semis ou le repiquage. Ne pas incorporer. Traiter également une bande de 15 m dans les vaines clôtures adjacentes.</p> <p>TRAITEMENT DES SEMIS : Dose de 1,28 à 2,56 litres dans 200 à 400 L/ha. Effectuer un seul épandage à la volée au stade de 2 à 5 feuilles.</p>
PAK-CHOÏ, BROCOLI, CHOUX DE BRUXELLES, CHOUX, CHOUX-FLEURS, CHOUX CHINOIS	<p>Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités pour le pak-choï et le chou chinois. Attendre 10 jours avant de pénétrer dans les champs traités de choux-fleurs et 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités de toutes les autres cultures. [Voir aussi ci-dessous.]</p> <p>Si aucun ajout de granulés de chlorpyrifos n'a été effectué, ne pas traiter plus de 2 fois par saison pour le brocoli, le chou, le chou-fleur, le chou chinois et le pak-choï, et pas plus de 3 fois par saison pour le chou de Bruxelles. Si un ajout de granulés de chlorpyrifos a été effectué, ne pas traiter plus d'une fois par saison pour le brocoli, le chou, le chou-fleur, le chou chinois et le pak-choï, et pas plus de 2 fois par saison pour le chou de Bruxelles. Ne pas appliquer moins de 32 jours avant la récolte de brocoli, de chou de Bruxelles, de chou, de chou-fleur et de chou chinois ou moins de 15 jours avant la récolte de pak-choï.</p>
Mouche du chou	<p>TRAITEMENT À LA PLANTATION : Dose de 225 mL/1 000 m de rangée. Effectuer un traitement par bassinage avec une solution de pulvérisation de 1000 L/ha, sur 10 cm de chaque côté de la plante, de 7 à 10 jours après les semis ou 3 jours après la transplantation.</p> <p>BASSINAGE POSTPLANTATION : Mélanger 1,81 litres dans assez d'eau pour faire 1 000 L de bouillie prête à pulvériser. Appliquer 12,5 L de solution par 100 m de rangée, sur le sol, sur 10 cm de chaque côté de la plante. Ne pas traiter les parties des plantes qui seront récoltées.</p> <p>Si aucun ajout de granulés de chlorpyrifos n'a été effectué au moment des semis : Pour le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou et le chou-fleur, traiter par bassinage moins de 3 jours après la transplantation (après la récupération des plants) ou de 7 à 10 jours après les semis. Répéter 21 jours après le bassinage de transplantation ou 28 jours après le bassinage de semis.</p>
Ver-gris noir, ver-gris moissonneur, ver-gris à dos rouge (BROCOLI, CHOU DE BRUXELLES, CHOU, CHOU-FLEUR, CHOU CHINOIS)	<p>TRAITEMENT DU SOL : Dose de 2,56 litres dans 200 à 400 L/ha. Traiter le sol une seule fois de 3 à 7 jours avant la transplantation. Ne pas incorporer. Traiter également une bande de 15 m dans les vaines clôtures adjacentes.</p> <p>TRAITEMENT DES SEMIS : Dose de 1,28 à 2,56 litres dans 200 à 400 L/ha. Effectuer un seul épandage à la volée au stade de 2 à 5 feuilles.</p>
BROCOLI DE CHINE	Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Ne pas appliquer moins de 21 jours avant la récolte. Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.
Mouche du chou	Dose de 160 mL dans 800 L/1 000 m de rangée. Traiter une fois par saison par bandes sur les rangées, 5 à 7 jours après les semis.

Cultures, organismes nuisibles	Doses et modes d'emploi														
AIL	Ne pas traiter plus de 2 fois par saison. Ne pas appliquer moins de 50 jours avant la récolte. Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.														
Mouche de l'oignon	Dose de 3,73 litres dans 1 000 L/ha. Traiter par bassinage du sol sur la rangée de semis.														
Ver-gris noir ver-gris moissonneur, ver-gris à dos rouge	<p>TRAITEMENT DU SOL : Dose de 2,56 litres dans 200 à 400 L/ha. Traiter 1 fois 3 à 7 jours avant la transplantation. Ne pas incorporer. Traiter également une bande de 15 m dans les vaines clôtures adjacentes.</p> <p>TRAITEMENT DES SEMIS : Dose de 1,28 à 2,56 litres dans 200 à 400 L/ha Traiter une fois par épandage à la volée au stade de 2 à 5 feuilles.</p>														
RUTABAGA	<p>Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités. Ne pas appliquer moins de 30 jours avant la récolte. [Voir aussi ci-dessous.]</p> <p>Si aucun ajout de granulés de chlorpyrifos n'a été effectué, ne pas traiter plus de 4 fois par saison. Si un ajout de granulés de chlorpyrifos a été effectué, ne pas traiter plus de 3 fois par saison.</p>														
Ver-gris noir, ver-gris moissonneur, ver-gris à dos rouge	<p>TRAITEMENT DU SOL : Dose de 2,56 litres dans 200 à 400 L/ha. Traiter 1 fois 3 à 7 jours avant la transplantation. Ne pas incorporer. Traiter également une bande de 15 m dans les vaines clôtures adjacentes.</p> <p>TRAITEMENT DES SEMIS : Dose de 1,28 à 2,56 litres dans 200 à 400 L/ha. Traiter 1 fois par épandage à la volée au stade de 2 à 5 feuilles.</p>														
Mouche du chou	<p>Dose de 225 mL dans 125 L/1 000 m de rangée. Traiter après la transplantation par bassinage du sol sur 10 cm de chaque côté des plants. Selon l'espacement des rangées, les doses sont les suivantes :</p> <table data-bbox="602 1241 959 1457"> <thead> <tr> <th>Espacement de rangées</th> <th>L/ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 cm</td> <td>7,47</td> </tr> <tr> <td>60 cm</td> <td>3,73</td> </tr> <tr> <td>75 cm</td> <td>2,99</td> </tr> <tr> <td>80 cm</td> <td>2,77</td> </tr> <tr> <td>90 cm</td> <td>2,45</td> </tr> <tr> <td>105 cm</td> <td>2,13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ne pas traiter la partie de la plante qui doit être récoltée. Si aucun ajout de granulés de chlorpyrifos n'a été effectué au moment des semis, traiter par bassinage 10, 28, 49 et 70 jours après les semis. Si un ajout de granulés de chlorpyrifos a été effectué au moment des semis, traiter par bassinage 28, 49 et 70 jours après les semis.</p>	Espacement de rangées	L/ha	30 cm	7,47	60 cm	3,73	75 cm	2,99	80 cm	2,77	90 cm	2,45	105 cm	2,13
Espacement de rangées	L/ha														
30 cm	7,47														
60 cm	3,73														
75 cm	2,99														
80 cm	2,77														
90 cm	2,45														
105 cm	2,13														
CAROTTE	Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Ne pas appliquer moins de 60 jours avant la récolte. Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.														

Cultures, organismes nuisibles	Doses et modes d'emploi
Ver-gris noir, ver-gris moissonneur, ver-gris à dos rouge	<p>TRAITEMENT DU SOL : Dose de 2,56 à 5,12 litres dans 200 à 400 L/ha. Traiter une fois par saison, avant les semis ou la transplantation. On peut aussi traiter une bande de 15 m dans les vaines clôtures adjacentes. Adopter la dose la plus faible, sauf si l'humidité du sol est faible. Adopter la dose la plus élevée si le sol est sec jusqu'à une profondeur de 1 cm. Ne pas incorporer les traitements de préplantation aux sols organiques. L'incorporation aux sols minéraux ne doit pas dépasser une profondeur de 5 cm.</p> <p>TRAITEMENT DES SEMIS : Dose de 2,56 à 5,12 litres dans 200 à 400 L/ha. Traiter par épandage à la volée au stade de 2 à 5 feuilles. Adopter la dose la plus faible, sauf si l'humidité du sol est faible. Adopter la dose la plus élevée si le sol est sec jusqu'à une profondeur de 1 cm.</p>
POMME DE TERRE	Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Ne pas appliquer moins de 7 jours avant la récolte. Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités pour effectuer des travaux de dépistage, de désherbage ou d'irrigation.
Doryphore de la pomme de terre (larve), altise de la pomme de terre, punaise terne	Dose de 1.07 litres dans 400 à 800 L/ha pour une pulvérisation foliaire.
Ver-gris noir, ver-gris moissonneur, ver-gris à dos rouge	<p>TRAITEMENT DU SOL : Dose de 2,56 litres dans 200 à 400 L/ha. Pulvériser une fois par épandage à la volée de 3 à 7 jours avant les semis. Ne pas incorporer. Traiter également une bande de 15 m dans les vaines clôtures adjacentes.</p> <p>TRAITEMENT DES SEMIS : Dose de 1,28 à 2,56 litres dans 200 à 400 L/ha. Dès l'apparition des dégâts, appliquer une fois par épandage à la volée.</p>
TOURNESOL	Traiter à l'aide d'un appareil au sol ou par épandage aérien lorsque indiqué. Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Ne pas appliquer moins de 42 jours avant la récolte. Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.
Légionnaire grise, ver-gris orthogonal, ver-gris à dos rouge	Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Dose de 1,28 litres dans 50 à 200 L/ha. Ne pas appliquer par voie aérienne. Dès l'apparition des dégâts, appliquer une fois par épandage à la volée. Ne pas incorporer les traitements de préplantation aux sols organiques. L'incorporation aux sols minéraux ne doit pas dépasser une profondeur de 5 cm.
Charançon des graines	Traiter à l'aide d'un appareil au sol ou par épandage aérien. Dose de 1,28 litres dans au moins 20 L/ha. Traiter à la fin juillet ou au début août, quand des populations de charançons sont observées dans les capitules.
BETTERAVE À SUCRE	Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Ne pas appliquer moins de 90 jours avant la récolte. Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.
Ver-gris orthogonal, ver-gris à dos rouge	Dose de 1,28 à 2,56 litres dans 50 à 200 L/ha. Dès l'apparition des dégâts, traiter les plantules une fois par saison par épandage à la volée. Ne pas incorporer les traitements de préplantation aux sols organiques. L'incorporation aux sols minéraux ne doit pas dépasser une profondeur de 5 cm.

Cultures, organismes nuisibles	Doses et modes d'emploi
ORGE, BLÉ, AVOINE	Ne pas traiter l'orge ou le blé plus d'une fois par saison. Ne pas appliquer moins de 60 jours avant la récolte. Traiter à l'aide d'un appareil au sol ou par épandage aérien lorsque indiqué. Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.
Noctuelle ponctuée (notamment légionnaire berthia), légionnaire grise, ver-gris moissonneur, ver-gris orthogonal, ver-gris à dos rouge	Dose de 0,93 à 1,28 litres dans 50 à 200 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol ou dans 10 à 30 L/ha pour épandage aérien. Appliquer sur le sol ou sur les feuilles. Ne pas incorporer les traitements de préplantation aux sols organiques. L'incorporation aux sols minéraux ne doit pas dépasser une profondeur de 5 cm.
Sauterelles	Dose de 0,62 à 0,93 litres dans 50 à 200 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol, ou dans 10 à 30 L/ha pour épandage aérien. Appliquer comme épandage foliaire à la volée. Adopter la dose la plus faible contre les sauterelles juvéniles et la dose la plus élevée contre les adultes. Il faut appliquer le produit dès que les signes d'infestation se manifestent dans les zones adjacentes non pâturées ni occupées comme les bords de chemins, les emprises et le long des clôtures.
Tétranyque du blé	Dose de 670 mL dans 50 à 200 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol ou dans 10 à 30 L/ha pour épandage aérien. Pulvériser sur les feuilles.
Puceron russe du blé	Dose de 0,53 litres dans au moins 100 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol ou dans au moins 20 L/ha pour épandage aérien. Pulvériser sur les feuilles.
Cécidomyie orangée du blé (BLÉ seulement)	Dose de 0,89 à 1,07 litres dans 50 à 200 L/ha pour un appareil de pulvérisation au sol. Dose de 1 litre dans 10 à 30 L/ha pour l'épandage aérien. Traiter quand les populations d'adultes ont atteint le seuil économique et que 25 % des épis sont sortis de la gaine, mais attendre autant que possible que 30 % de la culture soit en floraison. Le moment de l'intervention est critique pour l'efficacité de la suppression. Traiter vers la fin de l'après-midi ou en début de soirée, lorsque la température dépasse 15 °C et que la vitesse du vent est inférieure à 10 km/h.
OIGNON (ordinaire ou à marinier)	Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités. Ne pas traiter les oignons à botteler. [Voir également ci-dessous.] Ne pas appliquer moins de 60 jours avant la récolte.
Ver-gris noir, ver-gris moissonneur, ver-gris à dos rouge	TRAITEMENT DU SOL : Dose de 2,56 à 5,12 litres dans 200 à 400 L/ha. Traiter une fois par saison, avant les semis ou la transplantation. On peut aussi traiter une bande de 15 m dans les vaines clôtures adjacentes. Adopter la dose la plus faible, sauf si l'humidité du sol est faible. Adopter la dose la plus élevée si le sol est sec jusqu'à une profondeur de 1 cm. Ne pas incorporer les traitements de préplantation aux sols organiques. L'incorporation aux sols minéraux ne doit pas dépasser une profondeur de 5 cm. TRAITEMENT DES SEMIS : Dose de 2,56 à 5,12 litres dans 200 à 400 L/ha. Traiter par épandage à la volée au stade de 2 à 5 feuilles. Utiliser la dose la plus faible, sauf si l'humidité du sol est faible. Adopter la dose supérieure si le sol est sec jusqu'à une profondeur de 1 cm.

Cultures, organismes nuisibles	Doses et modes d'emploi
TABAC	Ne pas traiter plus d'une fois par saison. Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Attendre 1 jour avant de pénétrer dans les champs traités.
Ver-gris noir, ver-gris moissonneur, ver-gris à dos rouge	TRAITEMENT DU SOL : Dose de 2,56 à 5,12 litres dans 200 à 400 L/ha. Appliquer une fois, 3 à 7 jours avant les semis ou la transplantation. Adopter la dose la plus élevée si le sol est sec jusqu'à une profondeur de 1 cm. Ne pas incorporer les traitements de préplantation aux sols organiques. L'incorporation aux sols minéraux ne doit pas dépasser une profondeur de 5 cm. Appliquer également dans les cultures-aris et le long des clôtures adjacentes sur une bande de 15 m de largeur.
Ver-gris moissonneur	TRAITEMENT DES CULTURES-ABRIS : Dose de 1,2 à 1,28 litres dans 200 à 400 L/ha. Les vers-gris moissonneurs risquent de se nourrir des cultures-abris avant l'enfouissement par labour au printemps. Appliquer sur la zone où a été semé le tabac et sur une bande de 15 m de largeur de la culture de couverture et des clôtures adjacentes. Traiter entre la mi-avril et la fin avril, 4 à 5 jours avant l'enfouissement par labour. Lorsque la culture-abri de seigle mesure environ 15 cm de hauteur, les larves de vers-gris auront atteint le stade optimal pour la suppression. Les céréales cultivées comme culture-abri et traitées avec cet insecticide ne doivent pas servir à la consommation humaine ou animale lorsqu'elles sont traitées moins de 60 jours avant la récolte.
AVELINE	Ne pas traiter plus de 3 fois par saison. Ne pas appliquer moins de 14 jours avant la récolte. Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Attendre 4 jours avant de pénétrer dans les champs traités pour procéder au dépistage.
Puceron du noisetier	Dose de 4,48 à 5,12 litres dans 100 L/ha. Pulvériser sur les feuilles à l'aide d'un pulvérisateur à jet porté seulement. Orienter les buses du pulvérisateur à jet porté vers le verger lors de la pulvérisation des bords de rangées.
FORÊT : PIN TORDU	USAGE RESTREINT : Appareils au sol seulement (NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE). Pour usage dans l'Ouest du Canada seulement.
Dendroctone du pin ponderosa	NATURE DE LA RESTRICTION : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi autorisé. Contacter les autorités locales sur la réglementation des pesticides concernant les permis appropriés pouvant être exigés. Ne doit être appliqué que sous la supervision immédiate d'un opérateur antiparasitaire commercial chargé des programmes de suppression des insectes nuisibles. Formulation : Appareils au sol seulement pour supprimer les petites infestations de dendroctone du pin ponderosa dans les peuplements de pins tordus. Surveiller les peuplements entre la mi-juin et la mi-juillet pour déterminer si les arbres sont infestés. Traiter les arbres infestés dans les quelques semaines précédant l'émergence prévue des dendroctones, habituellement en début juillet, pour tuer les dendroctones adultes. Éviter de pulvériser lorsque les conditions favorisent la dérive au-delà de la zone de pulvérisation. Préparer une bouillie de 44,8 litres de PYRINEX 450 LV EC /1 000 L d'eau pour produire une bouillie qui contient 2 % de matière active en poids. Traiter à raison de 1 L de bouillie/m ² d'écorce avant l'émergence des dendroctones adultes. Traiter les fûts à partir du sol jusqu'à une hauteur d'au moins 3 m ou jusqu'à ce que le diamètre d'un fût atteigne 12,5 cm.

COMBINAISONS DE MÉLANGES EN RÉSERVOIR

Lorsqu'il est appliqué comme mélange en réservoir, lire et observer toutes les instructions sur l'étiquette, y compris les taux, restrictions et limitations de pâturage pour chaque produit utilisé dans le mélange en réservoir. Suivre les mesures de précaution les plus strictes pour le mélange, le chargement et l'application telles que décrites sur les étiquettes des deux produits.

COMBINAISONS DE MÉLANGES EN RÉSERVOIR AVEC DES HERBICIDE

PYRINEX 450 LV EC peut être mélangé en réservoir avec les herbicides cités ci-dessous pour le blé, l'avoine et l'orge. Le mélange supprime les insectes ravageurs, de même que les dicotylédones et les mauvaises herbes graminées tel que recommandé sur les étiquettes des produits utilisés. Lire attentivement le mode d'emploi et les mises en garde pour PYRINEX 450 LV EC et l'herbicide utilisé dans le mélange en cuve. Si les doses et les temps d'application recommandés ne sont pas respectés pour chaque produit, la suppression des insectes et des mauvaises herbes risque d'être insatisfaisante.

Lorsqu'on mélange en réservoir PYRINEX 450 LV EC avec les herbicides suivants, toujours ajouter l'herbicide d'abord et PYRINEX 450 LV EC par la suite :

Avenge 200-C¹ contre la folle avoine
Banvel² plus 2,4-D Amine
Buctril M³
Herbicide Glean⁴ en granules dispersables
MCPA Ester
MCPA Amine
Tordon* 202C Herbicide liquide
2,4-D Amine
2,4-D Ester

REMARQUE : Si PYRINEX 450 LV EC est ajouté en premier, il risque de s'agglutiner et de boucher les conduits ou les buses.

MÉLANGES EN CUVE EN COMBINAISON AVEC LE FONGICIDE BUMPER 418 EC

PYRINEX 450 LV EC peut être mélangé au réservoir avec Bumper 418 EC dans le blé, l'avoine et l'orge de printemps. Le mélange supprime les insectes ravageurs de même que les maladies tel que recommandé sur les étiquettes des produits utilisés. Lire attentivement et suivre le mode d'emploi et les mises en garde des étiquettes de PYRINEX 450 LV EC et de Bumper 418 EC. Se reporter à l'étiquette de Bumper 418 EC pour les volumes de pulvérisation appropriés. Si les doses et les temps d'application recommandés ne sont pas respectés pour chaque produit, la suppression des insectes ou de maladie risque d'être insatisfaisante.

Le **MODE D'EMPLOI** de ce produit pour usage sur la mouche du chou dans le radis asiatique (lo bok, daikon), le brocoli chinois et le radis, a été rédigé par des personnes autres que Adama Agricultural Solutions Canada Ltd. (ADAMA) et est homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. ADAMA ne formule aucune allégation ni n'offre aucune garantie concernant l'efficacité du produit ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce produit est employé sur le radis asiatique, le brocoli chinois et le radis. En foi de quoi l'acheteur et l'utilisateur assument tous les risques relatifs à l'efficacité du produit et à la tolérance des cultures, et ils acceptent de dégager ADAMA de toute responsabilité liée à des réclamations relatives à l'efficacité ou à la phytotoxicité du produit lorsque celui-ci est appliqué aux fins des usages décrits pour le radis asiatique, le brocoli chinois et le radis.

MODE D'EMPLOI : Pour l'insecticide PYRINEX 450 LV EC (PULVÉRISATION TERRESTRE SEULEMENT) afin de supprimer la mouche du chou dans : Radis asiatique (lo bok, daikon) – Dose de 225 mL de produit dilué dans 1 000 L d'eau par 1 000 m de rangée en bassinage sur les rangées ensemencées, 7, 20 et 35 jours après les semis. Ne pas traiter plus de 3 fois par année. Ne pas traiter la culture moins de 32 jours avant la récolte.

Brocoli chinois – Appliquer en bandes sur le rang une fois par saison, en bassinage, 5 à 7 jours suivant les semis. Dose de 160 mL de produit dilué dans 800 L d'eau par 1 000 m de rangée. (À l'espacement habituel pour le brocoli chinois, cette dose équivaut à 2,2 kg m.a./ha.) Ne pas traiter la culture moins de 21 jours avant la récolte.

Radis – Dose de 90 mL de produit dilué dans 380 L d'eau par 1 000 m de rangée en bassinage sur les rangées avec la semence au moment des semis. Ne pas traiter la culture moins de 21 jours avant la récolte. Appliquer une seule fois par saison.

Le **MODE D'EMPLOI** de ce produit pour supprimer le ver fil-de-fer dans les pommes de terre, a été rédigé par des personnes autres que Adama Agricultural Solutions Canada Ltd. (ADAMA). ADAMA ne formule aucune allégation ni n'offre aucune garantie concernant l'efficacité du produit ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce produit est employé pour la suppression du ver fil-de-fer dans les pommes de terre.

En foi de quoi l'acheteur et l'utilisateur assument tous les risques relatifs à l'efficacité du produit et à la tolérance des cultures, et ils acceptent de dégager ADAMA de toute responsabilité liée à des réclamations relatives à l'efficacité ou à la phytotoxicité du produit lorsque celui-ci est appliqué aux fins des usages décrits pour la suppression du ver fil-de-fer dans les pommes de terre.

MODE D'EMPLOI

Pomme de terre : Ver fil-de-fer – (dans le sillon au moment du semis) – Dose de 23 mL de produit dans 5 L d'eau par 100 mètres de rangée (équivaut à 2,56 L de produit/ha, selon 90 cm d'espacement de rangée). Ne pas appliquer dans les 21 jours avant la récolte.

¹Avenge est une marque de commerce d'AMVAC Chemical Corporation

²Banvel est une marque de commerce de BASF Canada Inc.

³Buctril M est une marque de commerce de Bayer CropScience Inc.

⁴Glean est une marque de commerce d'E.I. Dupont de Nemours and Company