

2017-06-16  
2017-0651

**DE LABS**

**DX13 PRO EN POUDRE**

INSECTICIDE

USAGE COMMERCIAL

SERT À EXTERMINER

Les punaises de lit

Pour utilisation dans  
les sites commercial et industriel

GARANTIE :

Dioxyde de silicium (présent sous forme de terre de diatomées à 100%)..... 82 %

No D'HOMOL. 32766 LOI P.A.

CONTENU NET : 0.5 - 20 Kg

LIRE L'ETIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

DE Laboratories Inc.  
8246 Unit A Fraser St.  
Vancouver, BC  
V5X 3X6  
604-255-9290  
delabs.ca

## MODE D'EMPLOI

### Punaises de lit

**POUR TUER LES PUNAISES DE LIT :** Appliquer une couche uniforme et fine de DX13 PRO EN POUDRE sur la surface à traiter. Les applications doivent se faire de sorte d'éviter les dépôts sur les surfaces exposées ou l'introduction du produit dans l'air. Démontez les lits. Appliquer sur les fissures, crevasses et les vides associés aux matelas, sommiers à ressorts, cadre de lit et autres meubles où ces insectes peuvent abriter, voyager, raser ou entrer dans la salle. Traiter matelas, surtout autour des coutures, des touffes, plis et bords. Couvrir avec de la litière propre avant de l'utiliser. Les punaises de lit peuvent également héberger dans les zones de la salle loin du lit ou des meubles. Appliquer dans les espaces vides dans les murs, derrière des tentures murales, sol moulage, encadrements de fenêtre, bord de tapis et d'autres fissures et les crevasses ou des vides. Appliquer directement sur la punaise de lit, si possible. Répéter selon les besoins.

Pour appliquer l'insecticide directement dans les fissures et les crevasses, les galeries, les hébergements et les vides, utiliser une poudreuse mécanique manuelle telle qu'une PowerPuff fabriquée par Greomar.

### PRECAUTIONS

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Éviter de respirer les poussières. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Porter un masque anti-poussière approprié approuvé par le NIOSH / MSHS lors de la manipulation.

Pour les applications avec un dispositif de soufflage dépoussiérant, porter un masque respiratoire complet approuvé par le NIOSH pendant le chargement et l'application.

Se laver les mains après les activités d'application et de nettoyage.

Les personnes non protégées ne doivent pas entrer dans la zone, pendant l'application ou le nettoyage ultérieur. Utiliser une ventilation adéquate lors de la manipulation, lors de l'application, et les activités de nettoyage. Lorsqu'il est utilisé à l'intérieur en milieu résidentiel, commercial ou industriel, ne pas appliquer dans le voisinage immédiat des personnes ou des animaux. Lorsque le produit est utilisé dans des locaux d'un milieu institutionnel, ne pas l'utiliser aux endroits et près des endroits où se trouvent les occupants. Avant d'utiliser le produit dans les hôpitaux, évacuer les patients des zones à traiter.

### ENTREPOSAGE :

Afin d'éviter toute contamination, ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

### ELIMINATION

Lorsque le récipient est vide se débarrasser du récipient vide conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme

provincial de réglementation responsable. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements

### **PREMIERS SOINS**

**En cas d'ingestion :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes.

Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

### **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

Traiter selon les symptômes.

### **AVIS À L'UTILISATEUR**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume le risque de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.