

# APPÂT POUR FOURMIS ET INSECTES NEUDORFF

INSECTICIDE

GRANULAIRE

DOMESTIQUE

PRÊT À L'EMPLOI

Tue les fourmis et supprime les vers-gris noirs

Contient l'ingrédient actif spinosad qui est dérivé d'un organisme d'origine naturelle.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'EMPLOI

PRINCIPE ACTIF : Spinosad 0,07 %

Avertissement : contient l'allergène du blé et lait

N° D'HOM. 33308 L.P.A.

250 g à 10 kg

W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3,  
31860 Emmerthal, Allemagne

**Agent canadien :**

Neudorff North America

PO Box 178

Brentwood Bay, C.-B. V8M 1R3

250 652-5888

## **PRÉCAUTIONS**

### **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas permettre aux adultes, enfants ou animaux de compagnie d'entrer dans les zones de traitement lors de l'application. Se laver immédiatement après avoir employé ce produit.

### **PREMIERS SOINS**

**En cas d'ingestion** : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements** : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation** : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec les yeux** : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

### **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :**

Traiter selon les symptômes.

### **PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES :**

Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les abeilles et certains insectes utiles. Afin de réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compacté ou sur de l'argile. Éviter d'appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues. La contamination des habitats aquatiques par ruissellement peut être réduite par l'aménagement d'une bande de végétation entre le site traité et le bord du plan d'eau.

**ENTREPOSAGE** : Afin d'éviter la contamination, entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou animale

**ÉLIMINATION** : NE PAS réutiliser les contenants vides. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.

## MODE D'EMPLOI

Pour tuer les fourmis : Appliquer l'appât à raison de 6 à 45 kg/ha (0,6 à 4,5 g/m<sup>2</sup>) aux cultures/sites indiquées ci-dessous.

**Pour supprimer les vers-gris noirs** : Appliquer à raison de 25 à 50 kg/ha (2,5 à 5,0 g/m<sup>2</sup>)

Appliquer manuellement (dispersion manuelle, avec une cuillère, une tasse ou un shaker), ou un épandeur manuel qui convient aux produits granuleux. Ne pas utiliser d'ustensiles de cuisine, comme des cuillères à soupe, des tasses, etc. à des fins alimentaires après les avoir utilisés avec des pesticides.

Disperser l'appât sur le sol ou dans les [contenants/pots]. Pour les habitations et d'autres structures, disperser l'appât dans un traitement des fondations périphériques qui est 1 m ou moins de la fondation du bâtiment à protéger. Sur les pelouses, appliquer l'appât de manière générale sur toute la surface où se trouvent les fourmis ou les vers-gris noirs. Appliquer la quantité recommandée la plus élevée si l'infestation est sévère. Appliquer à nouveau après une forte pluie ou un arrosage excessif. Appliquer à nouveau si l'appât a été consommé ou toutes les quatre semaines.

NE PAS appliquer sur un plan d'eau.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.

Éviter d'appliquer ce produit quand les vents soufflent en rafales.

À l'extérieur: tuer les fourmis et supprimer les vers-gris noirs		
Cultures/Sites	No. Maximale d'application s par année	Délai d'attente avant la récolte (DAAR)
topinambour; pomme de terre; maïs sucré; patate douce; igname	2	7
haricots, gourgane, pois chiques, pois	2	28 (sauf 3 pour les haricots et les pois à gousses comestibles)
amarante; poivron; cardon; céleri; cerfeuil, feuille fraîche; chou cavalier; mâche; pissenlit; oseille; aubergine; endive; fenouil; cerise de terre; laitue; piment autre que poivron; okra; arroche; pépino; pourpier potager; radicchio; rhubarbe; épinard; bette à cardes; tomatille; tomate	3	1

abricot; roquette; betterave; pak-choï; brocoli; rapini; chou de Bruxelles; chou; carotte; chou-fleur; céleri-rave; cerise (douce, acide); brocoli de Chine; chou chinois (pé-tsaï); chou cavalier; cresson; concombre; daikon; ail d'Orient; ail; ginseng; gourde; oignon vert; raifort; chou frisé; chou-rave; poireau; mizuna; melon véritable (y compris le cantaloup, les melons Casaba, Crenshaw, Honeydew); feuille de moutard; oignon; panais; prune; prucot; prune à pruneaux; citrouille; radis; rutabaga; salsifs; échalote; betterave à sucre; courge d'été; navet; pastèque; courge d'hiver	3	3
asperge	3	60
pelouse; plantes ornementales y compris les plantes cultivés dans les contenants	4	-
<b>À l'extérieur: tuer les fourmis</b>		
<b>Cultures/Sites</b>	<b>No. Maximale d'application s par année</b>	<b>Délai d'attente avant la récolte (DAAR)</b>
mûre; bleuet; mûre de Boysen; gadelles et cassis; baie de sureau; groseille à maquereau; baie de gaylussaquier; mûre de Logan; nectarine; pêche; framboise; fraise	3	1
abricot; cerise (douce, acide); prune; prucot; prune à pruneaux	3	3
pomme; pommette; cenelle; poire; poire asiatique; coing	3	7
raisins	3	7
noyer cendré; châtaignier; noisetier; caryer; pacanier; noyer	3	14
canneberge	3	21
autour du périmètre des bâtiments	4	-
<b>Serres: tuer les fourmis</b>		
<b>Cultures/Sites</b>	<b>No. Maximale d'application s par année</b>	<b>Délai d'attente avant la récolte (DAAR)</b>
poivron; concombre; aubergine; laitue; piment autre que poivron; tomate	3	2

- Le produit fonctionne mieux lorsque le sol est humide, mais avec peu ou pas d'eau stagnante.
- L'appât peut être placé directement sur les fourmilières et les pistes de fourmis.
- Ne pas disposer en amas.

### **Énoncés facultatifs :**

- Tue les fourmis y compris les fourmis de feu, fourmis fourrageuses, fourmis sucrières, fourmis des trottoirs, fourmis citronnelles, fourmis d'humidité, petites fourmis noires, fourmis d'Argentine, fourmis folles, fourmis acrobates, fourmis brunes des champs, fourmis fantômes, fourmis odorantes, fourmis ravisseuses et fourmis des champs
- Les animaux de compagnie peuvent entrer dans les zones traitées après l'application.
- Peut être utilisé à proximité des animaux de compagnie et de la faune.
- Efficace pour un maximum de 4 semaines.
- Empêche les fourmis d'entrer dans les habitations.
- Granules faciles à appliquer (pastilles).
- Supprime les vers-gris noirs