

Aceto Imazéthapyr Technique

POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE RECONDITIONNEMENT

Solide

PRINCIPE ACTIF : Imazéthapyr..... 99,5 %

ATTENTION POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

N° D'HOMOLOGATION : 34430 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 40 kg - Vrac

ACETO LIFE SCIENCES, L.L.C.

4 Tri Harbor Court

Port Washington, New York

USA 11050-4661

516-627-6000

MISES EN GARDE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS.

NE PAS CONTAMINER LES ALIMENTS POUR HUMAINS OU LES ALIMENTS POUR ANIMAUX.

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ, INHALÉ OU SI ABSORBÉ PAR LA PEAU.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

PROVOQUE UN DOMMAGE AUX YEUX.

CAUSE UNE IRRITATION DE LA PEAU.

Éviter de respirer la poussière.

Bien se laver avec du savon et de l'eau après la manipulation.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE

NE PAS contaminer l'eau, les aliments pour humains et aliments pour animaux lors de l'entreposage ou de l'élimination. Conserver le contenant bien fermé.

ÉLIMINATION

Vider complètement le contenant en le brassant et en tapant sur les côtés et le dessus pour dégager les particules collantes. Vider les résidus dans l'équipement de formulation.

Les fabricants canadiens de formulations qui utilisent ce produit doivent éliminer les matières actives non utilisées et les contenants en respectant la réglementation municipale ou provinciale. Pour plus de détails et pour des renseignements sur le nettoyage des déversements, s'adresser au fabricant ou à l'agence provinciale responsable.

MODE D'EMPLOI

Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication d'un herbicide homologué en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.