

2020-04-22
2020-0972

ADAMA THIFENSULFURON-MÉTHYLE HERBICIDE TECHNIQUE
POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE RECONDITIONNEMENT
SOLIDE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

ATTENTION : Nocif si inhalé ou si absorbé par la peau Irrite la peau.

PRINCIPE ACTIF : Thifensulfuron-méthyle...98.0%

N° D'HOMOLOGATION 33751 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 50 kg – 100 kg

Pour toute médicale d'urgence appeler PROPHARMA au 1.877.250.9291 (24 heures sur 24)
En cas de déversement, de fuite ou d'incendie, appeler INFOTRAC au 1.800.535.5053 (24 heures sur 24).

ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd.
300-191 Lombard Avenue
Winnipeg, Manitoba R3B 0X1
1-855-264-6262

MODE D'EMPLOI :

Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication d'un herbicide homologué en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES.

PRÉCAUTIONS :

- **EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS**
- Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
- Se laver les mains et le visage avant de manger, boire, fumer et utiliser les toilettes.
- Prendre une douche immédiatement après l'usage.
- Laver les vêtements protecteurs avec de l'eau chaude et un détersif, séparément de la lessive domestique avant de les réutiliser.
- Ne pas contaminer les plans d'eau.

PREMIERS SOINS :**EN CAS D'INGESTION :**

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION :

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Appliquer un traitement symptomatique.

Pour l'aide médicale d'urgence appelez PROPHARMA au 1.877.250.9291 (24 heures par jour)

ENTREPOSAGE :

Entreposer le produit dans son contenant d'origine seulement, à l'écart des autres pesticides, des engrais et des aliments pour humains ou pour animaux. Ne pas utiliser ni entreposer dans une maison ou aux alentours. Bien refermer le contenant.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION :

Les fabricants canadiens du présent produit doivent éliminer les matières actives et les

contenants en respectant la réglementation municipale et provinciale. Pour des renseignements détaillés concernant l'élimination ou le nettoyage des déversements, s'adresser à l'agence provinciale chargée de la réglementation ou au fabricant.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les Produits Antiparasitaires*.