

2022-10-05
2021-6684

GROUPE	M	FONGICIDE
--------	----------	-----------

Doktor Doom fongicide premium au soufre

POUDRE MOUILLABLE

COMMERCIALE-AGRICOLE

PRINCIPE ACTIF: 92% SOUFRE

NO. D'HOMOLOGATION 34626 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ETIQUETTE AVANT L'UTILISATION

CONTENU NET: 1 - 22.68 KILOGRAMMES

753146 AB Ltd o/a Ultrasol Industries
10755-69 Ave.
Edmonton, Alberta
T6H 2C9
780-432-6535

MISES EN GARDE :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas respirer les poussières ou le brouillard pulvérisé. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Après manipulation, se laver soigneusement avec de l'eau et du savon, avant de manger ou de fumer. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou tout autre plan d'eau. Éviter la contamination des aliments et de la nourriture. Sauf indication contraire, portez des lunettes ou un masque facial, des gants résistants aux produits chimiques, un chapeau, une chemise à manches longues, des pantalons longs et des bottes de caoutchouc durant le mélange/remplissage, l'application, le nettoyage et les activités de réparation. Ne pas entrer ou laisser les employés entrer dans la zone traitée au moins 24 heures après l'application.

PREMIERS SOINS:

EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT SUR LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

ENTREPOSAGE : Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

DÉCONTAMINATION/ÉLIMINATION:

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
 2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
 3. Rendre le contenant inutilisable.
 4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
 5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial.
- S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

GESTION DE LA RÉSISTANCE:

Aux fins de la gestion de la résistance, Doktor Doom fongicide premium au soufre contient un fongicide appartenant au groupe M. Toute population de champignons peut renfermer des individus naturellement résistants à Doktor Doom fongicide premium au soufre et à d'autres fongicides du groupe M. Il peut se produire une perte progressive ou complète d'efficacité

lorsque ces fongicides sont appliqués à répétition sur les mêmes champs. Il peut également exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition d'une résistance aux fongicides ou aux bactéricides :

- Dans la mesure du possible, alterner le Doktor Doom fongicide premium au soufre ou d'autres fongicides du même groupe M avec des produits qui appartiennent à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes pathogènes.
- Utiliser, si cet emploi est permis, des mélanges en cuve contenant des fongicides qui appartiennent à un groupe différent et qui sont efficaces contre les pathogènes ciblés.
- Utiliser les fongicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre les maladies qui privilégie les inspections sur le terrain, la consultation de données antérieures sur l'utilisation des pesticides et la rotation des cultures, et qui prévoit l'acquisition d'une résistance chez les plantes hôtes, les répercussions des conditions environnementales sur l'apparition des maladies, les seuils déclencheurs de maladie de même que l'intégration de pratiques culturales ou biologiques ou d'autres formes de lutte chimique.
- Le cas échéant, utiliser des modèles de prévision des maladies afin d'appliquer les fongicides au moment propice.
- Surveiller les populations fongiques traitées pour y déceler les signes éventuels de l'acquisition d'une résistance. Informer Ultasol Industries en présence d'une baisse possible de sensibilité à Doktor Doom fongicide premium au soufre chez l'agent pathogène.
- Lorsque la maladie continue de progresser après le traitement avec ce produit, ne pas augmenter la dose d'application. Cesser d'employer le produit et opter, si possible, pour un autre fongicide ayant un site d'action différent.
- Communiquer avec les spécialistes ou les conseillers agricoles certifiés de la région pour obtenir des recommandations supplémentaires sur une culture ou un agent pathogène précis pour ce qui est de la gestion de la résistance aux pesticides et de la lutte intégrée.
- Pour obtenir davantage d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, communiquer avec Ultrasol Industries au (780)-432-6535.

COMPATIBILITÉ:

Ce produit est compatible avec la plupart des fongicides et insecticides d'utilisation courante, sauf le DNOC (Elgetol) et l'huile.

AVIS À L'UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

MODE D'EMPLOI

Les dosages recommandés ci-dessous sont basés sur 1 000 L de solution diluée et la quantité spécifiée (kg) de produit par ha. Doktor Doom fongicide premium au soufre peut être utilisé à faible volume ou en pulvérisations concentrées en augmentant le dosage pour appliquer la même quantité de produit à l'hectare normalement utilisée pour la pulvérisation en mélanges dilués.

N 'APPLIQUEZ PAS PAR AVION.

Respectez les périodes de traitement recommandées dans chaque province.

Ne pas appliquer si des températures élevées (supérieure à 26 °C) et un haut taux d'humidité prévalent ou sont prévus pour les trois jours suivant le traitement.

Ne pas utiliser de soufre dans les trente jours suivant un traitement à l'huile ou à la bouillie bordelaise.

Ne pas faire plus que 8 applications par saison.

Ne pas appliquer par temps calme ou lorsque le vent est très violent.

Application avec pulvérisateur pneumatique : Ne pas diriger les jets au-dessus des plantes à traiter. Fermez les jets extérieurs à la fin des rangs et sur les rangs de bordure.

Ne pas appliquer si la vitesse du vent est supérieure à 16 km/h, mesuré à l'extérieur de la parcelle traitée, du côté des vents dominants.

Culture - Maladie	Dosage - Méthode
Pomme, Poire: Blanc (Mildiou), Tavelure	Appliquer 6.5 kg par 1000 L (19.5 kg/ha) au stade pré-floraison, calice et première couverture. Réduire à trois kg par 1000 L (9 kg/ha) si le temps chaud menace. Pour les traitements ultérieurs, appliquer 3.5 kg - 4.5 kg par 1000 L (10.5 kg-13.5 kg parha) selon la gravité du Blanc et la température.
Pêche: Pourriture brune, Tavelure	Appliquer 6.5 kg par 1000 L (19.5 kg/ha) en programme régulier commençant au stade bouton rose avancé. Répéter juste avant et pendant la cueillette si temps humide.
Prune, Pruneau: Pourriture brune, Nodule noir	Appliquer 6.5 kg par 1000 L (19.5 kg/ha) en programme régulier commençant à la chute des sépales. Répéter juste avant et pendant la cueillette si temps humide.
Cerise douce: Pourriture brune	Appliquer 6.5 kg par 1000 L (19.5 kg/ha) en programme régulier, de la floraison à la cueillette. Répéter pendant la cueillette si temps humide.
Cerise amère: Pourriture brune, Blanc (Mildiou)	Appliquer 6.5 kg par 1000 L (19.5 kg/ha) à la floraison. Si le Blanc est un problème, appliquer 3.5 kg par 1000 L (10.5 kg/ha) au stade première, deuxième et troisième couverture.
Raisin: Blanc (Mildiou)	Appliquer 4.5 kg/1000 L après la floraison, vaporisez sur les variétés de "Agawam-Seneca et Seibel". Ne pas utiliser sur les variétés de "Concord-Foch, Van Buren ou d'autres variétés de raisins sensibles au soufre. Appliquez 6 kg/1000 L à la première, deuxième et les vaporisations suivantes. Cessez l'application 21 jours avant la récolte des raisins à vins.

ZONES TAMPONS POUR LA PROTECTION DES HABITATS AQUATIQUES

La table suivante désigne les zones tampons qui sont requises entre le lieu d'application et la limite la plus proche, dans la direction du vent, des habitats sensibles d'eau douce (comme les lacs, les rivières, les bourbiers, les étangs, les prairie potholes, les criques, les marécages, les ruisseaux, les réservoirs et les terres humides) et les habitats estuarien/marin.

Méthode d'application	Culture	Zones tampons (metres) pour la protection des habitats aquatiques
Pulvérisateur Pneumatique	Cerise douce Cerise amer Prune Pêche Pomme	5

	Poire Pruneau Raisin	
--	----------------------------	--

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Administer un traitement symptomatique.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES :

Ne pas appliquez directement sur les habitats aquatiques (comme les lacs, les rivières, les marécages, les étangs, les points d'eau, les criques, les marais, les cours d'eau, les réserves d'eau et les terres humides) et les habitats marins/estuariens. Ne pas contaminez l'eau lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

POUR COMBATTRE LE BLANC SUR LES TOMATES DE SERRE

NOTE A L'UTILISATEUR: LIRE L'ÉNONCÉ SUIVANT AVANT D'UTILISER LE PRÉSENT PRODUIT A DES FINS SPÉCIALES: Le MODE D'EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites dans cette partie de l'étiquette, a été élaboré par des personnes autres qu'Ultrasol Industries dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dans le cas de ces utilisations, Ultrasol Industries n'a pas complètement évalué la performance (efficacité) et(ou) la tolérance des cultures (phytotoxicité) du produit lorsqu'il est utilisé de la façon indiquée sur l'étiquette pour l'ensemble des conditions environnementales ou des variétés végétales. Avant d'appliquer le produit à grande échelle, l'utilisateur devrait faire un essai sur une surface réduite, dans les conditions du milieu et en suivant les pratiques courantes pour confirmer que le produit se prête à une application généralisée.

Portez des lunettes ou un masque facial, un respirateur approuvé NIOSH, des gants résistants aux produits chimiques, un chapeau, une chemise à manches longues, des pantalons longs et des bottes de caoutchouc durant le mélange/remplissage, l'application, le nettoyage et les activités de réparation. Ne pas entrer ou laissez les employés entrer dans la zone traitée au moins 24 heures après l'application.

MODE D'EMPLOI

Culture - Maladie	Dosage - Méthode
Tomate de serre: Blanc (Mildiou)	Appliquer 750 g / 1000 L d'eau/ha; délai d'un jour avant la récolte; maximum de 10 applications par cycle de culture. Appliquer chaque semaine dès l'apparition des premiers symptômes et durant les conditions propices à la maladie; deux applications suffiront peut-être à combattre la maladie chaque fois qu'elle de manifeste; peut causer une légère phytotoxicité des feuilles.

POUR SUPPRIMER LE BLANC SUR LES PIMENTS EN SERRE

NOTE À L'UTILISATEUR: LIRE L'ÉNONCÉ SUIVANT AVANT D'UTILISER LE PRÉSENT PRODUIT À DES FINS SPÉCIALES: Le MODE D'EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites dans cette partie de l'étiquette, a été élaboré par des personnes autres qu'Ultrasol Industries dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dans le cas de ces utilisations, Ultrasol Industries n'a pas

complètement évalué la performance (efficacité) et(ou) la tolérance des cultures (phytotoxicité) du produit lorsqu'il est utilisé de la façon indiquée sur l'étiquette pour l'ensemble des conditions environnementales ou des variétés végétales. Avant d'appliquer le produit à grande échelle, l'utilisateur devrait faire un essai sur une surface réduite, dans les conditions du milieu et en suivant les pratiques courantes pour confirmer que le produit se prête à une application généralisée.

Portez des lunettes ou un masque facial, un respirateur approuvé NIOSH, des gants résistants aux produits chimiques, un chapeau, une chemise à manches longues, des pantalons longs et des bottes de caoutchouc durant le mélange/remplissage, l'application, le nettoyage et les activités de réparation. Ne pas entrer ou laissez les employés entrer dans la zone traitée au moins 24 heures après l'application.

MODE D'EMPLOI

Culture - Maladie	Dosage - Méthode
Piments en serre - Blanc (Mildiou)	Appliquer 543-760g / 1000 L d'eau/ha; appliquer au besoin; ne pas dépasser 10 applications par saison de croissance; appliquer à un intervalle minimum de 14jours.

POUR COMBATTRE LE BLANC SUR CANNABIS (MARIHUANA) PRODUIT COMMERCIALEMENT À L'INTÉRIEUR

NOTE A L'UTILISATEUR: LIRE L'ÉNONCÉ SUIVANT AVANT D'UTILISER LE PRÉSENT PRODUIT A DES FINS SPÉCIALES: Le MODE D'EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites dans cette partie de l'étiquette, a été élaboré par des personnes autres qu'Ultrasol Industries dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dans le cas de ces utilisations, Ultrasol Industries n'a pas complètement évalué la performance (efficacité) et(ou) la tolérance des cultures (phytotoxicité) du produit lorsqu'il est utilisé de la façon indiquée sur l'étiquette pour l'ensemble des conditions environnementales ou des variétés végétales. Avant d'appliquer le produit à grande échelle, l'utilisateur devrait faire un essai sur une surface réduite, dans les conditions du milieu et en suivant les pratiques courantes pour confirmer que le produit se prête à une application généralisée.

Portez des lunettes ou un masque facial, un respirateur approuvé NIOSH, des gants résistants aux produits chimiques, un chapeau, une chemise à manches longues, des pantalons longs et des bottes de caoutchouc durant le mélange/remplissage, l'application, le nettoyage et les activités de réparation. Ne pas entrer ou laissez les employés entrer dans la zone traitée au moins 24 heures après l'application.

MODE D'EMPLOI

Culture - Maladie	Dosage - Méthode
<i>Cannabis</i> (marihuana) produite commercialement à l'intérieur - Blanc (Mildiou) (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	Appliquer 750 g / 1000 L d'eau/ha; maximum de 10 applications par cycle de culture. Appliquer chaque semaine dès l'apparition des premiers symptômes et durant les conditions propices à la maladie; deux applications suffiront peut-être à combattre la maladie chaque fois qu'elle se manifeste.

DÉCLARATIONS FACULTATIVES :

Peut être utilisé pour supprimer blanc (mildiou) sur Cannabis (marihuana) produite commercialement à l'intérieur)

Peut être utilisé pour supprimer blanc (mildiou) sur les tomates de serre

Peut être utilisé pour supprimer blanc (mildiou) sur les piments en serre