

2022-1495
2022-10-04

Doktor Doom fongicide soufre premium pour fruits, légumes, roses, fleurs et
plantes ornementales

Au soufre mouillable

DOMESTIQUE

NO. D'HOM 34635 LPA

PRINCIPE ACTIF: Soufre ... 92%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONTENU NET: 500g

753146 AB Ltd o/a Ultrasol Industries
10755-69 Ave.
Edmonton, Alberta
T6H 2C9
780-432-6535

2022-1495
2022-10-04

MODE D'EMPLOI:

Contrôle blanc, rouille, tavelure du pommier, tavelure, nodule noir et certaines mites sur quelques fruits, fleurs et légumes.

COMMENT UTILISER: Ce produit peut être saupoudré directement sur les plantes ou les bulbes ou mélangé avec de l'eau pour être pulvérisé.

MÉLANGE: Ajouter 15 ml (1 c. à soupe) pour chaque litre d'eau et bien mélanger. Pour prévenir toute sédimentation, agiter le mélange durant la pulvérisation. REMARQUE: 15 ml pèse environ 10 grammes.

Cultures	Contrôle	Instructions
Pommes, Poires	Blanc, Tavelure, Mites	Appliquer à partir du stade de la pointe verte jusqu'au premier traitement postfloral. Réduire le taux de moitié pour les pulvérisations subséquentes. N'utiliser pas ce produit sur les poires Anjou et Comice.
Cerises (à fruits sucrés ou surs)	Pourriture brune, Tache des feuilles, Blanc, Mites	Appliquer conformément au programme prévu d'arrosages protecteurs, à partir de la floraison jusqu'à la cueillette.
Raisins, Fraises	Blanc	Appliquer dès l'apparition du blanc et répéter le traitement tous les dix jours, au besoin. Ne pas employer sur les raisins Concord ni sur les autres variétés sensibles.
Pêches, Prunes	Pourriture brune, Tache des feuilles, Nodule noir	
Raisins de Corinthe, Groseilles	Blanc, Rouille	Appliquer avant l'apparition des premières fleurs, et continuer jusqu'à la fin de la récolte.
Haricots, Pois	Blanc, Rouille	Pulvériser ou saupoudrer dès l'apparition de la maladie, puis répéter le traitement à des intervalles de 7 à 10 jours, selon les besoins.
Roses, Fleurs, Plantes ornementales	Rouille, Blanc, Tavelure du pommier, Mites	Saupoudrer ou pulvériser tous les 7 à 10 jours pendant la saison.

INTERVALLE AVANT LA RÉCOLTE

Peut être utilisé sur toutes les cultures jusqu'à la veille de la récolte, sauf dans le cas des raisins pour le vin qui exigent un intervalle de 21 jours.

MISES EN GARDE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

2022-1495

2022-10-04

Ne pas appliquer lorsque la température atteint ou dépasse 24° C. Ne pas appliquer sur les concombres, les melons et les courges. Ne pas appliquer moins de 30 jours après une pulvérisation d'huile. Éviter de respirer la poussière ou le brouillard de pulvérisation. Éviter tout contact du produit avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas contaminer les aliments pour les animaux, les aliments pour les humains et les masses d'eau. Bien se laver après l'utilisation et avant de manger, boire ou fumer. Entreposer dans un endroit sec et bien aéré.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTAUX

Ne pas appliquer directement sur des habitats aquatiques (tels que lacs, rivières, coulées, fondrières, étangs, fondrières des Prairies, ruisseaux, marécages, cours d'eau, réservoirs et milieux humides) ainsi que sur des habitats estuariens ou marins. Ne pas contaminer l'eau en nettoyant le matériel ou en éliminant les déchets.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Administer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION:

Emballer le contenant vide et le jeter aux ordures ménagères. Ne pas réutiliser le contenant vide.

DÉCLARATIONS FACULTATIVES

Saupoudrer ou vaporizer

Fongicide/Miticide