

Aquashield Mini Pucks

Pastilles de Chloration Stabilisées
Détruit les bactéries et les algues dans l'eau des SPAS

DOMESTIQUE

NO. D' ENREGISTREMENT 34391 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARANTIE:

Chlore libre, disponible sous forme de Tricholoro-s-triazinetriane.....90%

ATTENTION
POISON
CORROSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Contenu net
1.0kg- 2 kg

Aqua Coastal Imports Inc,
4496 Chesswood Drive,
Toronto ON M3J 2B9

Poids d'une pastille :15 g

MODE D'EMPLOI:

AVERTISSEMENT : Le contact direct entre les pastilles et le revêtement du spa peut causer un blanchiment. Les mécanismes de distribution automatique utilisés avec ces pastilles doivent être totalement libre de toutes traces d'un autre désinfectant afin d'éviter la possibilité d'une explosion.

Maintenir quotidiennement les teneurs aux valeurs appropriées; ces teneurs sont déterminées à l'aide d'une trousse d'analyse.

Chlore libre disponible: 3,0 - 5,0 ppm;

pH: 7,2 - 7,8;

Alcalinité totale: 125 - 150 ppm;

Dureté (en calcium): 150 - 200 ppm

AQUASHIELD MINI PUCKS peut être utilisé soit avec un chlorateur, un distributeur flottant ou dans l'écumoire du spa, pour maintenir un chlore résiduel idéal.

Ajouter 10g de AQUASHIELD LIFE MINI PUCKS par 1000 L d'eau quotidiennement ou au besoin. Laisser circuler l'eau au moins une heure avant l'utilisation.

Une surchloration périodique de l'eau du spa est recommandée. Suivre les instructions de l'étiquette pour la surchloration.

REMARQUE : Par temps chaud, après l'utilisation des jets d'aire ou un usage intensif du spa, des doses plus fortes peuvent être nécessaire pour garder les teneurs en chlore résiduel aux valeurs appropriées. La mousse persistante, la turbidité ou une odeur désagréable sont des indications de mauvaises désinfections.

Pour un meilleur rendement, le spa doit être vidé périodiquement. Le nombre de jour entre chaque vidange est égal, au volume en litres d'eau du spa divisé par dix fois le nombre maximum de baigneurs par jour. Au remplissage du spa, suivre les indications du fabricant.

La température ne doit jamais excéder 40C. Le temps d'utilisation ne devrait pas dépasser 15 minutes.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Forme un gaz dangereux lorsqu'il est mélangé à un acide. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Agent d'oxydation puissant. Peut provoquer un incendie ou une explosion s'il est contaminé. Il est recommandé d'utiliser des gants de caoutchouc pour manipuler ce produit. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Dangereux s'il est ingéré. Garder le contenant fermé et le placer dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION

Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas réutiliser le contenant vide. Recycler si possible ou éliminer conformément aux règlements locaux et provinciaux. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux in cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

PREMIERS SOINS

INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Administrer un traitement symptomatique