

TotalSTOP

TISSU IMPRÉGNÉ

USAGE DOMESTIQUE

LINGETTES INSECTIFUGE

PRINCIPE ACTIF : 1.1 g d'icaridine / lingette

Contient 1 à 250 lingettes par emballage

N° D'ENR. 34335 LOI P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT - IRRITANT OCULAIRE

HPP Europe Oy
Portaan Teollisuustie 2
14700 HAUHO

Surface Science INC.
4056 Meadowbrook Drive,
Suite 101, London, Ontario
Canada N6L 1E4

Tél. (519) 652-5242 | Sans frais: (800) 682-6943 | Fax: (519) 652-9614 |
International: + (1) (519) 652-5242

TotalSTOP fournit une protection efficace d'une durée de 12 heures contre les moustiques et les tiques, ainsi qu'une protection de 10 heures contre les mouches noires. Ce produit n'est pas huileux, gras ou collant. N'endommage pas les lignes de pêche, le plastique ou les autres matériaux synthétiques.

MODE D'EMPLOI:

Ouvrir la pochette et enlever la lingette. Déplier immédiatement la lingette et appliquer uniformément sur toute la peau exposée. En cas d'application au niveau du visage, éviter les yeux et la bouche. Il peut être nécessaire d'utiliser plus d'une lingette pour assurer une couverture et une protection suffisante. Appliquer en petites quantités, mais pas sous les vêtements et seulement si nécessaire. Ne pas appliquer sur une peau excessivement brûlée par le soleil. Appliquer à nouveau si nécessaire après 12 heures pour la protection contre les moustiques et les tiques et 10 heures pour la protection contre les mouches noires.

MISES EN GARDE:

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Superviser l'application sur les enfants. Ne pas appliquer sur les mains de jeunes enfants. Ne pas employer sur les nourrissons (de moins de 6 mois). Provoque une irritation des yeux. NE PAS mettre en contact avec les yeux. Éviter le contact avec la bouche, les blessures, les coupures et la peau irritée.

PREMIERS SOINS:

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE: Entreposer le produit dans un lieu frais, sec, loin de la nourriture humaine ou animale.

ÉLIMINATION: Jeter les emballages vides et les lingettes usagées avec les ordures ménagères.