

2023-5291
2023-09-25

KINOPROL^{MD} TECHNIQUE

FONGICIDE

Solide

POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE RECONDITIONNEMENT

PRINCIPE ACTIF : Ipflufenquin99,2%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

No. D'HOMOLOGATION 34755 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

EN CAS D'URGENCE CONCERNANT UN EMPOISONNEMENT OU DÉVERSEMENT
IMPORTANT, APPELER 1-800-424-9300

CONTENU NET :

Titulaire :

Nippon Soda Co., Ltd.

Shin-Ohtemachi Building,

2-1, Ohtemachi 2-Chome,

Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8165

Japan

USA Contact Number: (212) 490-0350

Représentant Canadien :

Nailor Regulatory Consulting Inc.

935 Rosinke Drive,

Kincardine, Ontario N2Z 2X3

519-829-5422

MODE D'EMPLOI

Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication de pesticides homologués en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

MISES EN GARDE

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS.

ATTENTION : Nocif si absorbé par la peau. Nocif en cas d'ingestion. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Bien se laver avec de l'eau et du savon après la manipulation et avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'utiliser les toilettes. Porter une chemise à manches longues et un pantalon long, des chaussettes et des chaussures. Retirer et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Administrier un traitement symptomatique.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

NE PAS rejeter d'effluent contenant ce produit dans un réseau d'égouts, un lac, un cours d'eau, un étang, un estuaire, un océan ou tout autre étendue d'eau.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans le contenant d'origine dans un endroit sûr, frais, sec et bien ventilé. Expédier et entreposer à l'écart des aliments de consommation humaine ou animale et des semences. Garder les contenants hermétiquement fermés.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant et les organismes provinciaux de réglementation.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*.