

*Box Label*

## Parapet K9 Praventia 360 Chien de Petite Taille

Adulticide/larvicide/ovicide contre les puces et adulticide contre les tiques  
Traitement topique mensuel contre les puces et les tiques

Solution

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS ET LES CHIOTS PESANT 4,5 kg OU MOINS ET  
ÂGÉS DE PLUS DE 12 SEMAINES

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS OU CHATONS, NI SUR TOUT AUTRE ANIMAL

USAGE DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION : IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU  
Avertissement, contient l'allergène soya.

Cat pictogram  
TOXIQUE POUR LES CHATS

PRINCIPE ACTIF :  
Imidaclopride à 7,12 %  
Permethrine à 35,6 %  
Pyriproxyfène à 0,36 %

N° D'HOM. 33792 L.P.A.

CONTENU NET : [Un à six tubes de] 0,48 mL

Evergreen Animal Health LLC  
22655 Centennial Road  
Gretna, Nebraska, 68028, USA  
1-402-215 5502

Distribué par :  
Rolf C. Hagen Inc.  
20500 Trans Canada Hwy  
Baie d'Urfé, QC H9X 0A2  
Telephone: 1-800-554-2436

Parapet K9 Praventia 360 Chien de Petite Taille contrôlera les puces et les tiques se trouvant sur un chien pesant 4.5 kg ou moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les nouvelles infestations durant au moins quatre semaines. Appliquer de nouveau à tous les mois pour un contrôle antiparasitaire continu dans les situations où le risque de réinfestation par les puces ou les tiques est persistant. Si un nouveau traitement s'avère nécessaire avant quatre semaines, utiliser des produits antiparasitaires avec des principes actifs de remplacement et des autres méthodes de lutte antiparasitaires.

Parapet K9 Praventia 360 Chien de Petite Taille offre un contrôle des puces à plusieurs stades de leur développement, interrompant de façon efficace le cycle de vie de la puce pour un contrôle rapide et durable des populations de puces. Les puces, les œufs de puces et les larves sont tués après contact lorsqu'un chien est traité au moyen de Parapet K9 Praventia 360 Chien de Petite Taille. Tue les tiques adultes seulement.

#### PRÉCAUTIONS :

**ÊTRES HUMAINS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut irriter les yeux. Éviter le contact avec les yeux. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Porter des gants de caoutchouc au moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Ce produit est très toxique pour les poissons. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en conservant ou en éliminant le produit.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Toxique pour les chats. Les chats qui font leur toilette ou qui se trouvent à proximité de chiens récemment traités risquent de graves lésions, même la mort. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilité. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près.

Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux recevant un traitement médical ou pesticide. Ne pas utiliser sur des chiens de moins de 12 semaines. Pour obtenir de l'aide sur l'usage de Parapet K9 Praventia 360 Chien de Petite Taille, composer le 1-800-554-2436.

#### EFFETS SECONDAIRES :

<p><b>Effets Secondaires :</b> Surveiller votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie ou des effets gastro-intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Rolf C. Hagen Inc. au 1-800-554-2436.</p>
--

Ce produit contient Permethrine, Imidaclopride et Pyriproxyfène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres et des colliers qui

contiennent Imidaclopride, Permethrine et Pyriproxyfène lorsque vous utilisez Parapet K9 Praventa 360 pour Chien de Taille Petite.

#### PREMIERS SOINS :

**ÊTRES HUMAINS : EN CAS D'INGESTION**, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu le conseil par le centre antipoison ou le médecin.

Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE** : S'il y a signes de sensibilité, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** : Traiter le patient selon les symptômes.

**ÉLIMINATION** : Envelopper le contenant et le capuchon dans du papier journal et jeter aux ordures ménagères.

[Contient de l'imidaclopride, de la perméthrine, et du pyriproxyfène, des principes actifs qui se trouvent dans le produit K9 Advantix® II.]

[Contient les mêmes principes actifs que K9 Advantix® II.]

[Ce produit n'est pas fabriqué ou distribué par Bayer, le fabricant de K9 Advantix® II. K9 Advantix<sup>MD</sup> est une marque déposée de Bayer Aktiengesellschaft.]

*Insert*

## Parapet K9 Praventa 360 Chien de Petite Taille

Adulticide/larvicide/ovicide contre les puces et adulticide contre les tiques  
Traitement topique mensuel contre les puces et les tiques

Solution

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS ET LES CHIOTS PESANT 4,5 kg OU MOINS ET  
ÂGÉS DE PLUS DE 12 SEMAINES

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS OU CHATONS, NI SUR TOUT AUTRE ANIMAL

USAGE DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION : IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU  
Avertissement, contient l'allergène soya.

Cat pictogram

TOXIQUE POUR LES CHATS

PRINCIPE ACTIF :

Imidaclopride à 7,12 %

Perméthrine à 35,6 %

Pyriproxifène à 0,36 %

N° D'HOM. 33792 L.P.A.

CONTENU NET : [Un à six tubes de] 0,48 mL

Evergreen Animal Health LLC  
22655 Centennial Road  
Gretna, Nebraska, 68028, USA  
1-402-215 5502

Distribué par :  
Rolf C. Hagen Inc.  
20500 Trans Canada Hwy  
Baie d'Urfé, QC H9X 0A2

Telephone: 1-800-554-2436

Parapet K9 Praventa 360 Chien de Petite Taille contrôlera les puces et les tiques se trouvant sur un chien pesant 4.5 kg ou moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les nouvelles infestations durant au moins quatre semaines. Appliquer de nouveau à tous les mois pour un contrôle antiparasitaire continu dans les situations où le risque de réinfestation par les puces ou les tiques est persistant. Autrement, le traitement doit être répété uniquement si les problèmes réapparaissent. Si un nouveau traitement s'avère nécessaire avant quatre semaines, utiliser des produits antiparasitaires avec des principes actifs de remplacement et des autres méthodes de lutte antiparasitaires. Consulter un vétérinaire si l'infestation par le parasite persiste et devient un problème.

L'activité alimentaire répétitive des puces infestant les animaux de compagnie peut provoquer chez ces derniers un trouble d'hypersensibilité de l'épiderme : la dermatite allergique aux piqûres de puces (DAPP). Le traitement avec Parapet K9 Praventa 360 Chien de Petite Taille permet de tuer rapidement les puces et peut diminuer l'incidence de cette dermatite.

Parapet K9 Praventa 360 Chien de Petite Taille offre un contrôle des puces à plusieurs stades de leur développement, interrompant de façon efficace le cycle de vie de la puce pour un contrôle rapide et durable des populations de puces. Les puces, les œufs de puces et les larves sont tués après contact lorsqu'un chien est traité au moyen de Parapet K9 Praventa 360 Chien de Petite Taille. Tue les tiques adultes seulement. La réinfestation causée par l'émergence de nouvelles puces, et tiques dans l'environnement peut continuer de survenir pendant six semaines ou plus après le début du traitement. Pour un contrôle efficace des puces et des tiques, le traitement de l'animal devrait être combiné avec la désinfection de tout endroit qu'il fréquente. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jetez le sac après usage) et laver les endroits où l'animal se couche et vit, ainsi que les lieux voisins. Si le problème persiste, il sera peut-être nécessaire d'effectuer un traitement insecticide des lieux.

Ne pas faire de shampooing ni immerger l'animal dans l'eau immédiatement après le traitement. Le chien peut recevoir un shampooing, être immergé dans l'eau ou exposé à la pluie trois jours après le traitement. L'effet peut être réduit par de multiples shampooings, immersions dans l'eau ou expositions à la pluie.

#### PRÉCAUTIONS :

**ÊTRES HUMAINS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut irriter les yeux. Éviter le contact avec les yeux. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Porter des gants de caoutchouc au moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (ou toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Ce produit est très toxique pour les poissons. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en conservant ou en éliminant le produit.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Toxique pour les chats. Les chats qui font leur toilette ou qui se trouvent à proximité de chiens récemment traités risquent de graves lésions, même la mort.

L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilité. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près.

Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux recevant un traitement médical ou pesticide. Ne pas utiliser sur des chiens de moins de 8 semaines. Pour obtenir de l'aide sur l'usage de Parapet K9 Praventia 360 Chien de Petite Taille, composer le 1-800-554-2436.

#### EFFETS SECONDAIRES :

**Effets Secondaires** : Surveiller votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie ou des effets gastro-intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Rolf C. Hagen Inc. au 1-800-554-2436.

Ce produit contient Imidaclopride, Perméthrine et Pyriproxifène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres et des colliers qui contiennent Perméthrine, Imidaclopride et Pyriproxifène lorsque vous utilisez Parapet K9 Praventia 360 pour Chien de Taille Petite.

#### PREMIERS SOINS :

**ÊTRES HUMAINS** : EN CAS D'INGESTION, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu le conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE** : S'il y a des signes de sensibilité, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** : Traiter le patient selon les symptômes.

**ÉLIMINATION** : Envelopper le contenant et le capuchon dans du papier journal et jeter aux ordures ménagères.

#### MODE D'EMPLOI :

Pour le contrôle des puces et des tiques sur les chiens pesant 4.5 kg ou moins et âgés de plus de 12 semaines.

**POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT SUR DES CHIENS PESANT 4.5 KG OU MOINS. NE PAS administrer par la gueule. NE PAS utiliser chez les chiens âgés de moins de 12 semaines. NE PAS utiliser sur les chats ou chatons, ni sur tout autre animal. Les chats qui font leur toilette ou qui se trouvent à proximité de chiens récemment traités risquent de graves lésions, même la mort (voir les PRÉCAUTIONS). Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux recevant un traitement médical ou pesticide.**

Parapet K9 Praventia 360 Chien de Petite Taille est emballé dans des tubes unidoses de 0,48 mL. [Cet emballage contient [une à six] doses mensuelles de 0,48 mL. Appliquer de nouveau tous les mois pour un contrôle antiparasitaire continu dans les situations où le risque de réinfestation par les puces ou les tiques est persistant. Dans les autres cas, le traitement ne doit être répété que si un problème d'infestation survient de nouveau. Si un nouveau traitement s'avère nécessaire avant quatre semaines, utiliser des produits antiparasitaires avec des principes actifs de remplacement et des autres méthodes de lutte antiparasitaires. Consulter un vétérinaire si l'infestation persiste et devient un problème.

Traitez votre chien de la façon suivante :

Retirer un applicateur de l'emballage.

Tenir le tube-applicateur en position verticale, le capuchon vers le haut. Couper le capuchon du tube.

Pour faciliter l'application, maintenir le chien debout.

Écarter les poils sur le dos du chien entre les omoplates jusqu'à ce que la peau soit visible.

Placer la pointe du tube sur la peau et presser le tube de façon à le vider complètement, directement sur la peau. Éviter tout contact de ce produit avec les yeux ou la gueule de votre animal.

Jeter le tube vide, tel que décrit à la section « ÉLIMINATION ».

Jusqu'à ce qu'Parapet K9 Praventia 360 Chien de Petite Taille ait séché, tenez votre animal éloigné des meubles.

**GARDER LE FEUILLET D'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

Surveiller votre chien pour tout signe de sensibilité à Parapet K9 Praventia 360 Chien de Petite Taille. Voir les PREMIERS SOINS pour de plus amples renseignements.

*Tube Label*

Parapet K9 Praventa 360 Chien de Petite Taille

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION : IRRITANT POUR LES YEUX

Avertissement, contient l'allergène soya.

TOXIQUE POUR LES CHATS

0,48 mL

N° D'HOM. 33792 L.P.A.