

2021-5878

2022-07-21

L'étiquette préalablement approuvée est valide jusqu'au 19/05/2023, conformément à la période d'abandon graduel établie dans la décision de réévaluation concernant l'Imidacloprid, RVD2021-05. Il est possible d'obtenir cette étiquette préalablement approuvée sur demande en envoyant un courriel à hc.pmra.info-arla.sc@canada.ca. Veuillez indiquer dans votre courriel le nom et le numéro d'homologation du produit dont vous demandez l'étiquette.

2021-5878
2022-07-21

Box label

Primidacide Puces & Tiques pour Chiens Plus de 25Kg

Adulticide contre les puces et les tiques

Traitement topique mensuel contre les puces et les tiques

Liquide

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS PESANT PLUS DE 25 KG

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS OU CHATONS OU TOUT AUTRE ANIMAL

USAGE DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT : POISON ET IRRITANT POUR LES YEUX

TOXIQUE POUR LES CHATS

PRINCIPE ACTIF : Imidaclopride à 8,8 %

Perméthrine à 44 %

N° D'HOM. 33629 L.P.A.

CONTENU NET: Un à six tubes de 4 mL

Fusion Animal Health

71 Main St.

Exeter, ON

NOM 1S3

416-627-9425

2021-5878
2022-07-21

Primidacide Puces & Tiques pour Chiens Plus de 25Kg Adulticide contre les puces et les tiques contrôlera les puces et les tiques présents sur le chien en moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les réinfestations durant au moins quatre semaines. D'autres infestations causées par l'apparition de nouveaux parasites dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6 semaines ou plus après le début du traitement. Appliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation ou si une action préventive contre les puces et les tiques est désirée. Donner un shampoing au chien peut diminuer la durée de la protection. Pour l'utilisation sur les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le vétérinaire.

MISES EN GARDE :

ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré ou absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Porter des gants de caoutchouc pendant l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (ou toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon.

Ce produit est très toxique pour les poissons. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en conservant ou en éliminant le produit.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Toxique pour les chats. Les chats qui font leur toilette ou qui se trouvent physiquement proches de chiens récemment traités risquent de graves lésions, même la mort. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près.

Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux recevant un traitement médical ou pesticide. Ne pas utiliser sur des animaux de moins de 8 semaines.

Effets secondaires

Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro-intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou [titulaire d'homologation au 416-627-9425].

PREMIERS SOINS :

ÊTRES HUMAINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu le conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés.

2021-5878

2022-07-21

Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : S'il y a des signes de sensibilité, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter le patient selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Envelopper le contenant et le capuchon dans du papier journal et jeter aux ordures ménagères.

2021-5878
2022-07-21

Label insert

Primidacide Puces & Tiques pour Chiens Plus de 25Kg
Adulticide contre les puces et les tiques
Traitement topique mensuel contre les puces et les tiques
Liquide

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS DE PLUS DE 25 KG
NE PAS UTILISER SUR LES CHATS OU CHATONS OU TOUT AUTRE ANIMAL
USAGE DOMESTIQUE
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
AVERTISSEMENT : POISON ET IRRITANT POUR LES YEUX
TOXIQUE POUR LES CHATS

PRINCIPE ACTIF : Imidaclopride à 8,8 %
Perméthrine à 44 %

N° D'HOM. 33629 L.P.A.

CONTENU NET: Un à six tubes de 4 mL

Fusion Animal Health
71 Main St.
Exeter, ON
NOM 1S3
416-627-9425

2021-5878
2022-07-21

Primidacide Puces & Tiques pour Chiens Plus de 25Kg Adulticide contre les puces et les tiques contrôlera les puces et les tiques présents sur le chien en moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les réinfestations durant au moins quatre semaines.

D'autres infestations causées par l'apparition de nouveaux parasites dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6 semaines ou plus après le début du traitement.

Appliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a risque constant d'infestation ou si une action préventive contre les puces et les tiques est désirée. Pour une élimination efficace des puces et des tiques, le traitement de l'animal devrait être accompagné d'un nettoyage de tous les endroits qu'il fréquente. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac après usage) et laver les endroits où l'animal se couche et vit, ainsi que les lieux voisins. Si le problème persiste, il sera peut-être nécessaire d'effectuer un traitement insecticide des lieux.

Donner un shampoing au chien peut diminuer la durée de la protection. Ce produit contient l'imidaclopride et la perméthrine. Ne pas appliquer un autre produit antiparasitaire tel qu'un shampoing, un collier ou une poudre contenant de l'imidaclopride ou de la perméthrine sur l'animal traité après l'application de Primidacide Puces & Tiques Pour Chiens Plus De 25kg. L'activité alimentaire répétitive des puces infestant les animaux de compagnie peut provoquer chez ces derniers un trouble d'hypersensibilité de l'épiderme : la dermatite allergique aux piqûres de puces (DAPP). Le traitement avec Primidacide Puces & Tiques pour Chiens Plus de 25Kg Adulticide

contre les puces et les tiques tue rapidement les puces et peut diminuer l'incidence de cette dermatite.

Pour l'utilisation sur les animaux gravides ou qui allaitent, consulter le vétérinaire.

MISES EN GARDE :

ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré ou absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec.

Porter des gants en caoutchouc au moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (ou toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Ce produit est très toxique pour les poissons. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en conservant ou en éliminant le produit.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Toxique pour les chats. Les chats qui font leur toilette ou qui se trouvent physiquement proches de chiens récemment traités risque de graves lésions, même la mort. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilité. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux recevant un traitement médical ou pesticide. Ne pas utiliser sur des animaux de moins de 8 semaines.

Effets secondaires

Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro-intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets

secondaires, consultez votre vétérinaire ou [titulaire d'homologation au 416-627-9425.

PREMIERS SOINS :

ÊTRES HUMAINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu le conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés.

Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : S'il y a des signes de sensibilité, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter le patient selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Envelopper le contenant et le capuchon dans du papier journal et jeter aux ordures ménagères.

MODE D'EMPLOI :

NE PAS administrer par la gueule. Ne pas utiliser chez les chiens âgés de moins de 8 semaines.

Consulter un vétérinaire si l'infestation persiste. Ne pas utiliser sur les chats ou chatons.

Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux recevant un traitement médical ou pesticide. N'utiliser que sur les chiens pesant plus de 25 kg. Ce produit est emballé dans des tubes à dose unique. Cet emballage contient un à six doses mensuelles de 4,0 mL. Traiter votre chien mensuellement de la façon décrite ci-dessous. Ne pas appliquer une dose supérieure à un tube de 4,0 mL à la fois. Un traitement mensuel est nécessaire si l'animal est continuellement réinfesté ou si on désire une action préventive contre les puces et les tiques.

Retirer un applicateur de l'emballage.

Tenir le tube-applicateur en position verticale.

Tourner la pointe pour briser le sceau.

Pour faciliter l'application, maintenir le chien debout. Appliquer uniformément tout le contenu du tube de Primidacide Puces & Tiques pour Chiens Plus de 25kg à six ou huit endroits sur le dessus du dos, entre les épaules et la base de la queue. À chaque endroit, écarter les poils jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer la pointe du tube sur la peau et presser doucement pour appliquer une certaine quantité de solution sur la peau. Ne pas appliquer une quantité excessive de solution en un seul endroit de façon à éviter que la solution coule le long des flancs de l'animal. Éviter tout contact de ce produit avec les yeux ou la gueule de votre animal de compagnie.

Jeter le tube vide, tel que décrit à la section « ÉLIMINATION ».

2021-5878
2022-07-21

Fusion Animal Health
71 Main St.
Exeter, ON
N0M 1S3
416-627-9425

2021-5878

2022-07-21

Tube label

Primidacide Puces & Tiques pour Chiens Plus de 25Kg
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
AVERTISSEMENT : POISON ET IRRITANT POUR LES YEUX
TOXIQUE POUR LES CHATS
N° D'ENR. 33629 L.P.A.