

Container Label

## FOISON Glufosinate Ammonium 200 SN

<b>GROUPE</b>	<b>10</b>	<b>HERBICIDE</b>
---------------	-----------	------------------

**EN VENTE POUR USAGE DANS LES HYBRIDES DE MAÏS TOLÉRANTS AU GLUFOSINATE AMMONIUM ET SOJA TOLÉRANTS AU GLUFOSINATE AMMONIUM AU CANADA ET DANS LE CANOLA TOLÉRANTS AU GLUFOSINATE AMMONIUM CULTIVÉ DANS L'EST DU CANADA ET EN COLOMBIE-BRITANNIQUE (Y COMPRIS LA RÉGION DE LA RIVIÈRE DE LA PAIX EN COLOMBIE-BRITANNIQUE)**

**SOLUTION  
USAGE COMMERCIAL**



**ATTENTION - IRRITANT DES YEUX**

**N° D'HOMOLOGATION: 33386 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**

**PRINCIPE ACTIF : glufosinate ammonium 200 g/L**

**CONTENU NET : 1L – 1,000L**

**LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET CI-JOINT AVANT L'UTILISATION**

**Information produit: 519-702-2185**

**Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., LTD  
Laogang, Qidong Ville, Jiangsu 226221 Chine  
Représentant canadien: Hanson Industry Company  
569 Rosehill Ave, Stittsville, ON K2S 0E8  
Tel: +1-519-702-2185**

En cas de déversement, d'empoisonnement ou d'incendie, appeler le numéro d'urgence:  
+1-519-702-2185

**MISE EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. ATTENTION : IRRITANT POUR LES YEUX.** Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation.

Bien se laver après utilisation et avant de manger, de boire ou de fumer.

**Vêtements et équipement de protection :** Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes pendant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et les réparations. De plus, porter des lunettes de protection (lunettes de sécurité ou écran facial) pendant le mélange, le chargement. Porter un respirateur avec une cartouche anti-vapeurs organiques approuvé par le NIOSH avec un préfiltre approuvé pour les pesticides ou une boîte filtrante approuvé par le NIOSH approuvé pour les pesticides pendant le mélange, le chargement, l'application.

**Délai de sécurité : NE PAS** pénétrer ou permettre l'accès aux travailleurs dans les zones traitées durant le délai de sécurité (DS) de 24 heures. Si nécessaire, un préposé à l'application accrédité peut entrer dans les sites traités pour y effectuer des tâches à court terme, non manuelles, s'il s'est écoulé au moins 4 heures depuis l'application et s'il porte une chemise à manches longues, un pantalon long, une combinaison résistant aux produits chimiques, des chaussures résistant aux produits chimiques, des chaussettes, des lunettes de sécurité, des gants résistant aux produits chimiques, un chapeau et un respirateur avec une cartouche anti-vapeurs organiques approuvé par le NIOSH avec un préfiltre approuvé pour les pesticides ou une boîte filtrante approuvé par le NIOSH approuvé pour les pesticides. Il est interdit de passer plus d'une heure dans les sites traités par période de 12 heures pendant le délai de sécurité.

Appliquer uniquement lorsque le risque de dérive de pulvérisation vers les zones résidentielles et les zones d'occupation humaine comme les maisons, les chalets, les écoles et les aires de loisir est minime. Tenir compte de la vitesse du vent, de la direction du vent, des inversions de température, de l'équipement d'application et des réglages du pulvérisateur.

**NE PAS appliquer ce produit à l'aide d'un équipement de pulvérisation aérienne**

Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée et que vous avez besoin de renseignements sur les limites maximales de résidus pour un pays importateur, veuillez communiquer avec +1-519-702-2185.

**PREMIERS SOINS:** Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas**

**d'inhalation**, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Note au médecin** : En cas d'ingestion de ce produit, procéder sans tarder à une intubation endotrachéale et à un lavage d'estomac, suivis d'une administration de charbon et de sulfate de sodium.

**MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES: TOXIQUE** pour les organismes aquatiques et les plantes terrestres non ciblées. Respecter les zones tampons indiquées à la section MODE D'EMPLOI. Pour réduire le ruissellement des zones traitées vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer dans des zones caractérisées par une pente modérée ou prononcée, un sol compacté ou argileux. Éviter d'appliquer si des averses abondantes sont prévues. La contamination des zones aquatiques par suite d'un ruissellement peut être réduite en prévoyant une bande de végétation entre la zone traitée et le bord du plan d'eau. Éviter toute dérive de pulvérisation sur les plantes sensibles et **N'UTILISER QU'AUX FINS ET AUX DOSES RECOMMANDÉES. NE PAS APPLIQUER PAR AVION.**

**ENTREPOSAGE** : **Ne peut pas** être entreposé sous le point de congélation. Si le produit est entreposé depuis au moins un an, bien le secouer avant l'emploi. Entreposer le contenant hermétiquement fermé à l'écart des fourrages, des semences, des engrais, des plantes et des denrées alimentaires. Conserver dans le contenant d'origine pendant l'entreposage. Ne pas utiliser ni entreposer dans la maison ou autour de celle-ci. **Élimination du contenant recyclable** : Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant : 1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir. 2. Rendre le contenant inutilisable. S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. **Élimination du contenant réutilisable** : Ne pas réutiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point d'achat (distributeur/détaillant). **Élimination du contenant rempli par le distributeur ou par le détaillant à l'intention de l'utilisateur** : En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. **Élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir** : Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

**AVIS À L'UTILISATEUR** : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

Booklet

## FOISON Glufosinate Ammonium 200 SN

GROUPE	10	HERBICIDE
--------	----	-----------

**EN VENTE POUR USAGE DANS LES HYBRIDES DE MAÏS TOLÉRANTS AU GLUFOSINATE AMMONIUM ET SOJA TOLÉRANTS AU GLUFOSINATE AMMONIUM AU CANADA ET DANS LE CANOLA TOLÉRANTS AU GLUFOSINATE AMMONIUM CULTIVÉ DANS L'EST DU CANADA ET EN COLOMBIE-BRITANNIQUE (Y COMPRIS LA RÉGION DE LA RIVIÈRE DE LA PAIX EN COLOMBIE-BRITANNIQUE)**

**SOLUTION  
USAGE COMMERCIAL**



**ATTENTION - IRRITANT DES YEUX**

**N° D'HOMOLOGATION: 33386 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**

**PRINCIPE ACTIF:** glufosinate ammonium 200 g/L

**CONTENU NET:** 1L – 1,000L

**LIRE L'ÉTIQUETTE ET CE LIVRET AVANT L'UTILISATION**

Information produit: 519-702-2185  
Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co., Ltd.  
Laogang, Qidong Ville, Jiangsu 226221 Chine  
**Représentant canadien:** Hanson Industry Company  
569 Rosehill Ave., Stittsville, ON K2S 0E8  
Tel: +1-519-702-2185

En cas de déversement, d'empoisonnement ou d'incendie, appeler le numéro d'urgence:  
+1-519-702-2185

## HERBICIDE FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200 SN

### *Table des matières:*

### *Numéro de section:*

<b>RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX</b>	Le produit	1
<b>SÉCURITÉ ET MANUTENTION</b>	Mise en garde, vêtements et équipement protecteurs, et restriction de ré-entrée	2
	Premiers soins et renseignements toxicologiques	3
	Mises En Garde Environnementales	4
	Entreposage	5
	Élimination	6
<b>MODE D'EMPLOI</b>	Cultures, mauvaises herbes, doses d'emploi, périodes d'application	7
	Mélanges en cuve	8
	Recommandations sur la gestion de la résistance	9
	Instructions d'application et mises en garde	10
	Instructions de mélange	11
	Nettoyage du pulvérisateur	12
	Alimentation du bétail et délai d'attente avant la récolte	13
	Avis	14

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

### Section 1 : Le produit

- FOISON Glufosinate Ammonium 200SN permet la répression d'un large spectre de graminées et de mauvaises herbes à feuilles larges dans les variétés de canola, les hybrides de maïs et les variétés de soja spécialement conçus pour être tolérants au glufosinate ammonium.
- FOISON Glufosinate Ammonium 200SN peut également être appliqué sur les lignées de maïs consanguines tolérantes au glufosinate ammonium, destinées à la production de semence.
- Pour la production de semences d'hybrides de canola, FOISON Glufosinate Ammonium 200SN peut être utilisé pour éliminer les plantes sauvages en disjonction au sein de la population femelle. Voir section 7 (Cultures, mauvaises herbes, doses d'emploi, périodes d'application - Pour la production de semences hybrides de canola).

## SÉCURITÉ ET MANUTENTION

### Section 2 : Précautions, vêtements et équipement protecteurs, et restriction de ré-entrée

#### MISE EN GARDE :

- ATTENTION: IRRITANT DES YEUX
- **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- Peut irriter les yeux.
- Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation.
- Se laver à fond après l'emploi et avant de manger, de boire ou de fumer.

**Vêtements et équipement de protection** : Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes pendant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et les réparations. De plus, porter des lunettes de protection (lunettes de sécurité ou écran facial) pendant le mélange, le chargement. Porter un respirateur avec une cartouche anti-vapeurs organiques approuvé par le NIOSH avec un préfiltre approuvé pour les pesticides ou une boîte filtrante approuvé par le NIOSH approuvé pour les pesticides pendant le mélange, le chargement, l'application.

**Délai de sécurité** : **NE PAS** pénétrer ou permettre l'accès aux travailleurs dans les zones traitées durant le délai de sécurité (DS) de 24 heures. Si nécessaire, un préposé à l'application accrédité peut entrer dans les sites traités pour y effectuer des tâches à court terme, non manuelles, s'il s'est écoulé au moins 4 heures depuis l'application et s'il porte une chemise à manches longues, un pantalon long, une combinaison résistant aux produits chimiques, des chaussures résistant aux produits chimiques, des chaussettes, des lunettes de sécurité, des gants résistant aux produits chimiques, un chapeau et un respirateur avec une cartouche anti-vapeurs organiques approuvé par le NIOSH avec un préfiltre approuvé pour les pesticides ou une boîte filtrante approuvé par le NIOSH approuvé pour les pesticides. Il est interdit de passer plus d'une heure dans les sites traités par période de 12 heures pendant le délai de sécurité.

Appliquer uniquement lorsque le risque de dérive de pulvérisation vers les zones résidentielles et les zones d'occupation humaine comme les maisons, les chalets, les écoles et les aires de loisir est minime. Tenir compte de la vitesse du vent, de la direction du vent, des inversions de température, de l'équipement d'application et des réglages du pulvérisateur.

### **Section 3 : Premiers soins et renseignements toxicologiques**

**PREMIERS SOINS :** Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation,** déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

#### **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :**

**Note au médecin :** En cas d'ingestion de ce produit, procéder sans tarder à une intubation endotrachéale et à un lavage d'estomac, suivis d'une administration de charbon et de sulfate de sodium.

### **Section 4 : Mises En Garde Environnementales**

TOXIQUE pour les organismes aquatiques et les plantes terrestres non ciblées. Respecter les zones tampons indiquées à la section MODE D'EMPLOI.

Pour réduire le ruissellement des zones traitées vers les habitats aquatiques, éviter d'appliquer dans des zones caractérisées par une pente modérée ou prononcée, un sol compacté ou argileux. Éviter d'appliquer si des averses abondantes sont prévues. La contamination des zones aquatiques par suite d'un ruissellement peut être réduite en prévoyant une bande de végétation entre la zone traitée et le bord du plan d'eau.

Éviter toute dérive de pulvérisation sur les plants sensibles et N'UTILISER QU'AUX FINS ET AUX DOSES RECOMMANDÉES.

### **Section 5 : Entreposage**

- **Ne peut pas** être entreposé sous le point de congélation.
- Si le produit est entreposé depuis au moins un an, bien le secouer avant l'emploi.

- Entreposer le contenant hermétiquement fermé à l'écart des fourrages, des semences, des engrais, des plantes et des denrées alimentaires.
- Ne pas utiliser ni entreposer dans la maison ou autour de celle-ci.
- Conserver dans le contenant d'origine pendant l'entreposage.

## **Section 6 : Élimination**

### **Élimination du contenant recyclable :**

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

### **Élimination du contenant réutilisable :**

Ne pas réutiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point d'achat (distributeur/détaillant).

**Élimination du contenant rempli par le distributeur ou par le détaillant à l'intention de l'utilisateur :** En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins.

### **Élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir :**

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

### **Élimination de la solution non utilisée :**

S'il reste de la solution de pulvérisation dans le réservoir une fois l'application terminée, elle doit être pulvérisée sur le périmètre du champ qui vient d'être traité loin des sources d'approvisionnement en eau, des fossés, et des canaux d'irrigation.





**Stramoine commune:** Pour la suppression de la stramoine commune, appliquer FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN à raison de 2,5 L/ha, lorsque les mauvaises herbes sont au stade de 1 à 6 feuilles.

**Chardon des champs et liseron des champs:** Pour la répression pendant toute la saison du chardon des champs et du liseron des champs, appliquer FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN à raison de 2 L/ha, lorsque les mauvaises herbes sont au stade de 1 à 6 feuilles.

**Chiendent :** Pour supprimer le chiendent pendant toute la saison, appliquer FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN à raison de 2,5 L/ha avec du sulfate d'ammonium à raison de 6 L/ha (solution à 49%) OU de 3 kg/ha (99%) lorsque le chiendent est au stade de 1 à 4 feuilles.

**Cultures spontanées nuisibles :** FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN ne supprime pas les cultures spontanées qui émergent à la suite de semis précédents de cultures tolérantes au glufosinate-ammonium.

**ADJUVANTS:** Pour obtenir une meilleure suppression de l'abutilon et la stramoine commune, ajouter du sulfate d'ammonium dans le réservoir à raison de 6 L/ha (solution à 49%) OU de 3 kg/ha (99%).

**DEUXIÈME APPLICATION:** Une seconde application de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN peut être effectuée dans les champs ayant reçu un traitement initial atteignant 2,5 L/ha si de nouvelles mauvaises herbes ont germé. Appliquer lorsque les nouvelles mauvaises herbes sont au stade foliaire approprié et jusqu'au stade foliaire maximum de la culture. Au-delà du stade de 8 feuilles du maïs, l'application doit être faite à l'aide de buses à jet dirigé afin d'appliquer le produit directement sous le verticille du plant de maïs.

Application dans le canola doit se faire avant la montée en graines du canola.

Ne pas appliquer au-delà du stade de la floraison du soja.

Ne pas appliquer plus de 4,5 L/ha dans une même saison.

**PROGRAMME D'APPLICATIONS FRACTIONNÉES:** Pour la suppression pendant toute la saison des mauvaises herbes mentionnées plus haut sur l'étiquette, on peut suivre un programme d'applications fractionnées avec FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN. La première application doit être d'un minimum de 2 L/ha et au stade de croissance approprié de la mauvaise herbe. Pour la seconde application, une dose de 1,25 L/ha peut être utilisée pourvu que FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN soit appliqué dès la seconde poussée de mauvaises herbes et avant le stade maximum de la culture.

**POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES HYBRIDES DE CANOLA :** Deux applications sont nécessaires pour éliminer les plants sauvages en disjonction. La première application doit être faite lorsque le canola est au stade de 2-4 feuilles, la seconde, lorsque le canola est au stade de 4-6 feuilles et la troisième, au besoin, peut être effectuée jusqu'à, mais avant, la montée en graines. Toutes les applications de FOISON Glufosinate Ammonium 200SN pour la production de semences hybrides doivent se faire à raison de 2,5 L/ha.

## Section 8 : Mélanges en cuve

Consulter l'étiquette du produit d'association pour obtenir de plus amples détails sur le mode d'emploi, les restrictions et les précautions. Certains produits d'association peuvent comporter des restrictions supplémentaires pour ce qui est des stades foliaires.

Pour la suppression des mauvaises herbes présentes et/ou les levées ultérieures de mauvaises herbes à feuilles larges annuelles et/ou de graminées annuelles (voir les instructions de mélange en cuve), FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN peut être mélangé en association avec les herbicides suivants pour utilisation dans l'est du Canada et Colombie-Britannique:

CULTURE	PRODUIT D'ASSOCIATION	TAUX	MODE D'EMPLOI
CANOLA	Centurion® ou Select® + Amigo à 0.5% v/v	63 mL/ha	Pour la suppression de l'orge spontané et de la folle avoine, appliquer FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200 SN à raison de 2,0 à 2,5 L/ha avec Centurion ou Select à raison de 63 mL/ha ainsi qu'un adjuvant tel que recommandé sur l'étiquette de Centurion ou Select. Appliquer lorsque les mauvaises herbes ont de 1 à 4 feuilles et un maximum de 2 talles.
MAÏS	Herbicide Liquide AAtrex 480*	1,75 à 2,33 L/ha	Mélanger avec la dose appropriée de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN pour les mauvaises herbes ciblées. Ajuster taux d'atrazine selon le niveau d'action résiduelle recherché. Ce mélange ne supprimera pas les levées ultérieures de mauvaises herbes résistantes aux triazines.

MAÏS	Banvel®	625 mL/ha	Mélanger avec taux appropriée de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN pour les mauvaises herbes ciblées. Ce mélange offre une meilleure suppression des mauvaises herbes à feuilles larges annuelles.
MAÏS	Distinct®	285 g/ha	Mélanger avec taux appropriée de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN pour les mauvaises herbes ciblées. Ce mélange offre une meilleure suppression des mauvaises herbes à feuilles larges annuelles.
MAÏS	Marksman®	2,5 à 3,7 L/ha	Mélanger avec taux appropriée de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN pour les mauvaises herbes ciblées. Ajuster la dose de Marksman selon le niveau d'action résiduelle recherché. Ce mélange offre une suppression résiduelle des graminées annuelles et des herbes à feuilles larges annuelles.
SOJA	Pursuit®	312 mL/ha	Mélanger avec taux appropriée de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN pour les mauvaises herbes ciblées. Ce mélange offre une suppression résiduelle des graminées annuelles et des mauvaises herbes à feuilles larges annuelles.
SOJA	Basagran® Forte	1,75 L/ha	Mélanger avec taux appropriée de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN pour les mauvaises herbes ciblées. Ce mélange offre une meilleure suppression des mauvaises herbes à feuilles larges annuelles.

*\*Pour les concentrations différentes d'atrazine, ajuster taux en conséquence.*

**Note:** Ne pas mélanger en cuve FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN avec des engrais ou d'autres adjuvants agrochimiques à moins qu'ils ne soient recommandés sur cette étiquette.

## **Section 9 : Recommandations sur la gestion de la résistance**

Aux fins de la gestion de la résistance, il importe de noter que FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN est un herbicide du groupe 10. Toute population de mauvaises herbes peut renfermer ou former des plantes naturellement résistantes à FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN et à d'autres herbicides du groupe 10. Les biotypes résistants peuvent finir par dominer au sein de la population des mauvaises herbes si ces herbicides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut aussi exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition d'une résistance aux herbicides:

- Dans la mesure du possible, alterner le FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN ou les herbicides du même groupe 10 avec des herbicides qui appartenant à d'autres groupes et qui suppriment les mêmes mauvaises herbes et ce, au cours d'une seule saison de croissance (applications séquentielles) ou entre les saisons de croissance.
- Utiliser si cet emploi est permis, des mélanges en cuve contenant des herbicides provenant d'un groupe différent. Pour ralentir l'acquisition d'une résistance, le composé du mélange le moins susceptible de créer une résistance devrait supprimer la ou les mauvaises herbes ciblées aussi efficacement que le composé du mélange le plus susceptible de créer une résistance.
- Utiliser les herbicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre les mauvaises herbes qui privilégie le dépistage, la consultation de données antérieures sur l'utilisation des pesticides et la rotation des cultures, et qui permet l'intégration des techniques de labour (ou d'autres méthodes mécaniques de lutte), des pratiques culturales (par exemple, augmentation de la densité des semis, application d'engrais au moment propice et au moyen d'une méthode précise pour favoriser la croissance de la culture plutôt que celle des mauvaises herbes) ou biologiques (recours à des cultures ou à des variétés de végétaux qui entrent en compétition avec les mauvaises herbes) et d'autres pratiques de lutte.
- Après l'application d'herbicides, surveiller les populations de mauvaises herbes traitées pour y déceler les signes de l'acquisition d'une résistance (par exemple, une seule des espèces de mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette n'a pas été supprimée). En présence de signes attestant une résistance potentielle, empêcher la production des graines de mauvaises herbes sur le site touché en utilisant, dans la mesure du possible, un autre herbicide appartenant à un groupe différent. Empêcher la propagation des mauvaises herbes résistantes d'un champ à l'autre en nettoyant le matériel de labour et de récolte avant le passage dans un autre champ et en utilisant des semences non contaminées.
- Faire analyser les graines de mauvaises herbes potentiellement résistantes par un laboratoire qualifié afin de confirmer leur résistance et d'opter pour un autre herbicide.
- Communiquer avec les spécialistes ou les conseillers agricoles certifiés de la région pour obtenir des recommandations supplémentaires sur une culture ou un biotype de mauvaise herbe précis pour ce qui est de la gestion de la résistance aux pesticides et de la lutte intégrée contre les mauvaises herbes.
- Pour obtenir davantage d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, communiquer au 1 519 702 2185.

## Section 10 : Instructions d'application et mises en garde

### Instructions d'application :

- Pour obtenir les meilleurs résultats qui soient, appliquer sur les mauvaises herbes levées, jeunes et en pleine croissance. Les mauvaises herbes qui lèvent après l'application ne seront pas supprimées.
- FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN agira sur les mauvaises herbes qui sont plus grosses que le stade foliaire recommandé, mais la rapidité d'action et le degré de suppression risquent d'être diminués.
- Appliquer FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN dans au moins 110 L/ha d'eau à une pression de 175 à 275 kPa et à une vitesse d'avancement de 6 à 10 km/h. L'utilisation de buses à jet plat de 80° ou de 110° est fortement recommandée pour assurer un épandage uniforme et une pénétration optimale du couvert végétal.
- L'application avec un jet incliné de 45° produira un épandage plus uniforme. Suivre les autres instructions sur l'étiquette relativement à la dose et à la période d'application appropriées.
- La rapidité d'action de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN est influencée par des facteurs environnementaux. Lorsque le temps est frais (moins de 10°C) et que le taux d'humidité est faible, la rapidité d'action peut être réduite. Règle générale, les symptômes visuels se manifestent 2 à 4 jours après l'application.
- S'IL PLEUT DANS LES 4 HEURES SUIVANT L'APPLICATION, L'EFFICACITÉ PEUT ÊTRE RÉDUITE.
- Le contrôle des mauvaises herbes peut être réduit lorsqu'il y a beaucoup de rosée, brouillard, ou bruine durant l'application.
- FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN agit principalement comme herbicide de contact. Il est donc essentiel de l'appliquer uniformément sur les mauvaises herbes à supprimer.
- Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, NE PAS utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique.
- NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau d'irrigation ou en eau potable ni les habitats aquatiques en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets.

### Mises en garde pour l'application :

**Pulvérisateur agricole:** NE PAS appliquer durant les périodes de calme plat. Éviter d'appliquer ce produit quand les vents soufflent en rafales. NE PAS appliquer en gouttelettes de pulvérisation de taille inférieure au calibre moyen de la classification de l'American Society of Agricultural Engineers (ASAE). La rampe d'aspersion doit se trouver à 60 cm ou moins au-dessus de la culture ou du sol.

- **APPLIQUER AVEC DE L'ÉQUIPEMENT AU SOL SEULEMENT. NE PAS appliquer ce produit à l'aide d'un équipement de pulvérisation aérienne**

- Ne pas utiliser de buses à miroir, d'équipement d'application par gouttelettes contrôlées ni d'équipement de pulvérisation à air comprimé.
- L'épandage uniforme est important pour obtenir une suppression constante des mauvaises herbes.
- NE PAS appliquer avec des pulvérisateurs à rampe si les vents dépassent 16 km/h. NE PAS appliquer avec des pulvérisateurs à paravent si les vents soufflent à plus de 25 km/h.
- Éviter le contact avec les plantes ou les cultures désirables, par application directe ou par dérive de pulvérisation, à défaut de quoi de graves dommages peuvent survenir.
- **Intervalles précédant un nouveau semis:**
  - 70 jours pour le sarrasin commun, l'orge, le millet, l'avoine, le seigle, le sorgho commun, la triticale et le blé.
  - 120 jours pour toutes les autres cultures à l'exception du maïs cultivé, du canola et du soja. Un intervalle de réensemencement n'est pas requis pour le maïs cultivé, le canola ou le soja.
- L'application de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN sur les cultures non tolérantes produira de graves dommages ou la mort des cultures.
- **MAUVAISES HERBES SENSIBLES:** FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN agit sur toutes les cultures et mauvaises herbes, à l'exception des cultures qui ont été modifiées pour être tolérantes aux applications de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN, y compris lorsqu'elles deviennent des mauvaises herbes spontanées.

### Zones tampons :

Les traitements localisés avec l'équipement manuel NE requièrent PAS une zone tampon..

Il est nécessaire que les zones tampons précisées dans le tableau ci-dessous séparent le point d'application directe du produit et la lisière de l'habitat terrestre vulnérable le plus proche de ce point dans la direction du vent (p. ex., des prairies, des forêts, des brise-vents, des terres à bois, des haies, des rivages ou des zones arbustives), des habitats d'eau douce vulnérables (p. ex., des lacs, des rivières, des marécages, des étangs, des fondrières des Prairies, des criques, des marais, des cours d'eau, des réservoirs et des milieux humides).

Méthode d'application	Culture	Zones tampons (m) requises pour la protection des :		
		Habitats dulcicoles d'une profondeur :		Habitat terrestre
		Inférieure à 1 m	Supérieure à 1 m	
Pulvérisateur de grandes cultures	canola, maïs, soya	1	0	1

Lorsqu'un mélange en cuve est utilisé, consulter les étiquettes des produits d'association et respecter la zone tampon la plus grande (la plus restrictive) parmi tous les produits utilisés dans le mélange en cuve et appliquer en utilisant la catégorie de très grosses gouttelettes (ASAE) indiquée sur les étiquettes des produits d'association.

## Section 11 : Instructions de mélange

FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN doit être appliqué avec de l'équipement propre convenablement calibré.

FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN est spécialement formulé pour se mélanger facilement à l'eau. Avant d'ajouter FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN dans le réservoir de pulvérisation, s'assurer que ce dernier est bien propre (consulter la section 12, Nettoyage du pulvérisateur).

1. Remplir le réservoir aux trois quarts d'eau propre avant d'ajouter FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN.
2. Verser la quantité appropriée de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN.
3. Remplir le reste du réservoir d'eau, commencer l'agitation et appliquer immédiatement.

**Note :** À l'exception de l'utilisation avec Centurion ou Select, lors du mélange en cuve de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN, mettre toujours le produit d'association dans le réservoir en premier, s'assurer qu'il est bien mélangé et ajouter ENSUITE FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN. Lorsqu'il est utilisé, le sulfate d'ammonium doit TOUJOURS être versé dans le réservoir en premier, avant l'addition du produit d'association et FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN. Se référer aux instructions spécifiques suivantes pour mélanger avec CENTURION ou SELECT.

### **FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200 SN et CENTURION ou SELECT : Canola tolérant le glufosinate ammonium seulement**

Lorsqu'on mélange en cuve FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN et CENTURION ou SELECT, toujours verser l'adjuvant AMIGO dans le réservoir en premier, *puis* verser FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN dans le réservoir, suivi de CENTURION ou SELECT.

### **L'ajout d'un agent antimoussant peut réduire la formation de mousse, en particulier lorsqu'on utilise de l'eau douce.**

1. Bien nettoyer le pulvérisateur en purgeant le système avec un mélange d'eau et de détergent (voir la section 12, Nettoyage du pulvérisateur).
2. Remplir le réservoir du pulvérisateur à moitié d'eau propre. Mettre en marche le système d'agitation.
3. Verser la quantité appropriée d'AMIGO. Continuer d'agiter jusqu'à ce que AMIGO soit bien mélangé.
4. ARRÊTER l'agitation. Verser la quantité requise FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN dans le réservoir. Mettre en marche le système d'agitation.
5. Verser la quantité appropriée de CENTURION ou SELECT et le reste d'eau nécessaire pour remplir le réservoir.
6. Continuer d'agiter ou de faire rouler le système de dérivation, et pulvériser immédiatement.



7. Après toute interruption de l'épandage, bien agiter avant de reprendre la pulvérisation. Jeter un coup d'œil dans le réservoir pour s'assurer que l'agitation du pulvérisateur suffit à remélanger les produits de la solution de pulvérisation. Ne pas laisser reposer le mélange jusqu'au lendemain.
8. Si une pellicule d'huile commence à se former dans le réservoir, vider et nettoyer le réservoir avec une solution de détergent puissante.
9. Immédiatement après l'emploi, bien nettoyer le pulvérisateur en purgeant le système avec un mélange d'eau et de détergent (voir la section 12, Nettoyage du pulvérisateur).

**Note :** L'ajout d'un antimoussant peut réduire la formation de mousse, en particulier avec l'eau douce.

**Note :** S'assurer que tous les circuits (tuyaux, rampes, etc.) ont la concentration appropriée de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN et d'eau avant de commencer l'application.

## **Section 12 : Nettoyage du pulvérisateur**

Avant et après l'emploi de FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200SN, toujours procéder à un nettoyage complet du réservoir de pulvérisation, des conduites et du filtre. L'équipement de pulvérisation doit être rincé à fond à l'aide d'une puissante solution détergente.

## **Section 13 : Alimentation du bétail et délai d'attente avant la récolte**

### **CANOLA :**

- Les grains et la farine provenant du canola traité peuvent être utilisés pour nourrir le bétail.
- NE PAS laisser paître les bêtes dans les champs de canola traités ni utiliser les autres parties du canola traité pour nourrir le bétail. Les données appuyant cette utilisation ne sont pas suffisantes.
- Lorsque FOISON GLUFOSINATE AMMONIUM 200 SN est mélangé en cuve avec Centurion ou Select, respecter un délai d'attente de 60 jours à partir de la date du traitement (ou du dernier traitement lorsqu'il y a eu une deuxième application).

### **MAÏS :**

- NE PAS appliquer dans les 86 jours précédant la récolte du grain de maïs.
- NE PAS laisser paître le bétail dans les champs traités dans les 20 jours suivant l'application.

### **SOJA :**

- NE PAS appliquer dans les 70 jours précédant la récolte du grain de soja.
- NE PAS laisser paître le bétail dans les champs traités dans les 20 jours suivant l'application.

## **Section 14 : Avis**

### **AVIS À L'UTILISATEUR :**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non-conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

---

Tous les autres produits indiqués sont des marques déposées de leurs entreprises respectives.