

2018-3411
2020-01-24

Étiquette pour le sachet hydrosoluble

GROUPE	M4	FONGICIDE
--------	----	-----------

Sharda Captan 80 WSP

COMMERCIAL

FONGICIDE GRANULÉ DISPERSABLE DANS L'EAU EN SACHET HYDROSOLUBLE

Fongicide contre certaines maladies fongiques des fruits, légumes, fleurs, gazons et cultures ornementales

PRINCIPE ACTIF : Captane.....80.0%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N^o D'HOMOLOGATION: 33670 LOI SUR LES PRODUITS

ANTIPARASITAIRES DANGER – CORROSIF POUR LES YEUX
ATTENTION - IRRITANT CUTANÉ ET SENSIBILISANT CUTANÉ POSSIBLE

AVERTISSEMENT : Une exposition au captane peut produire, à long terme des effets sur la santé.
Pour minimiser l'exposition, suivre le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette.

CONTENU NET : 500g

Sharda Cropchem Limited
2nd Floor, Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West)
Mumbai - 400056, India

Agent Canadien :
Sharda Cropchem Limited
Kingsview Blvd
Etobicoke, Ontario, CA
M9R1V1
1-844-810-5720
1-416-840-5639

2018-3411
2020-01-24

Étiquette du suremballage

GROUPE	M4	FONGICIDE
--------	----	-----------

Sharda Captan 80 WSP

COMMERCIAL

FONGICIDE GRANULÉ DISPERSABLE DANS L'EAU EN SACHET HYDROSOLUBLE

Fongicide contre certaines maladies fongiques des fruits, légumes, fleurs, gazons et cultures ornementales

PRINCIPE ACTIF : Captane.....80.0%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N° D'HOMOLOGATION: 33670 LOI SUR LES PRODUITS

ANTIPARASITAIRES DANGER – CORROSIF POUR LES YEUX
ATTENTION - IRRITANT CUTANÉ ET SENSIBILISANT CUTANÉ POSSIBLE

AVERTISSEMENT : Une exposition au captane peut produire, à long terme des effets sur la santé.
Pour minimiser l'exposition, suivre le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette.

NE PAS VENDRE LES SACHETS HYDROSOLUBLES SÉPARÉMENT CONSERVER LES SACHETS HYDROSOLUBLES
DANS CE CONTENANT ET LES ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, PROTÉGER DE LA CHALEUR
EXCESSIVE. CONTIENT QUATRE SACHETS HYDROSOLUBLES DE 500g

CONTENU NET : 2 kg or 10kg caisse (5x(1x4x500g))

Sharda Cropchem Limited
2nd Floor, Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West)
Mumbai - 400056, India

Agent Canadien :
Sharda Cropchem Limited
Kingsview Blvd
Etobicoke, Ontario, CA
M9R1V1
1-844-810-5720
1-416-840-5639

2018-3411
2020-01-24

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CORROSIF pour les yeux. ÉVITER LE CONTACT avec les yeux. Peut IRRITER la peau. ÉVITER LE CONTACT avec la peau. Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé, à l'écart de la nourriture animale et humaine. Garder à l'écart de la chaleur, du feu et des étincelles. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver à fond après avoir manipulé le produit et avant de manger, boire ou fumer. Laver les vêtements contaminés avec de l'eau chaude et du savon avant de les réutiliser. Éviter de respirer la poussière ou le brouillard de pulvérisation. Ne pas contaminer la nourriture humaine ou animale. Ne pas contaminer les étendues d'eau.

Lors du mélange, du chargement et de l'application du produit et lors des activités de nettoyage et de réparation, porter un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures, des chaussettes, des lunettes à coques latérales et un appareil de protection respiratoire muni d'une cartouche antivapeurs organiques approuvée par le NIOSH comportant un préfiltre approuvé pour les pesticides OU un boîtier approuvé par le NIOSH pour les pesticides Lorsque le produit est appliqué au moyen d'une rampe d'aspersion, utiliser un tracteur à cabine fermée si la quantité manipulée dépasse 57 kg p.a./j. La cabine fermée doit assurer une protection physique et respiratoire (c'est-à-dire présence d'un dispositif de filtration des poussières et du brouillard et/ou de purification des gaz et des vapeurs). La cabine fermée doit constituer une barrière contre les produits chimiques qui enveloppe complètement l'occupant et qui empêche le contact avec les pesticides à l'extérieur de la cabine. Le port d'un appareil de protection respiratoire, de lunettes à coques latérales et de gants résistant aux produits chimiques n'est pas obligatoire à l'intérieur de la cabine fermée, mais ces articles doivent être à portée de main pour permettre de quitter la cabine. Lorsque le produit est appliqué par aspersion ou au moyen d'un pulvérisateur pneumatique monté sur un tracteur à cabine ouverte, porter également un couvre-chef résistant aux produits chimiques. Les couvre-chefs résistant aux produits chimiques peuvent être un chapeau Sou'Wester, un surôit résistant aux produits chimiques ou un surôit à large bord et un capuchon imperméables couvrant suffisamment le cou. Lorsque le produit est appliqué à l'aide d'un pulvérisateur manuel à compression mécanique, porter également une combinaison par-dessus un vêtement à manches longues et un pantalon long. De plus, lors des applications en serre à l'aide de ce matériel, la quantité maximale qui peut être manipulée est de 0,71 kg p.a. par personne par jour. Ces restrictions visent à réduire au minimum l'exposition des personnes qui appliquent le produit. Il est possible que l'application doive être réalisée sur plusieurs jours ou par plusieurs personnes. Les travailleurs qui préparent les solutions pour le trempage des bulbes de fleurs ou qui effectuent des activités de nettoyage ou de réparation connexes doivent également porter une combinaison résistant aux produits chimiques par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon long, des lunettes à coques latérales, ainsi que des chaussures et des chaussettes résistant aux produits chimiques. Les travailleurs qui manipulent des bulbes traités et qui touchent des surfaces ayant été en contact avec la solution de trempage ou pouvant avoir été contaminées par celle-ci doivent porter un vêtement à manches longues, un pantalon long, des lunettes à coques latérales, des chaussettes, des chaussures et des gants résistant aux produits chimiques. NE PAS pénétrer ou permettre aux travailleurs de pénétrer dans les sites traités avant la fin du DS indiqué sur l'étiquette. Les employeurs doivent faire tout ce qui est possible pour planifier l'application des pesticides et les tâches de travailleurs de façon à éviter que ceux-ci aient à retourner dans les sites traités avant la fin du délai prescrit. Dans des circonstances exceptionnelles, un préposé à l'application des pesticides accrédité peut entrer dans les sites traités pour y effectuer des tâches non manuelles à court terme, s'il s'est écoulé au moins 4 heures depuis l'application et s'il porte un vêtement à manches longues, un pantalon long, des bottes en caoutchouc, des bas, des lunettes à coques latérales, des gants résistant aux produits chimiques et un appareil de protection respiratoire muni d'une cartouche anti-vapeurs organiques approuvée par le NIOSH comportant un préfiltre approuvé pour les pesticides OU un boîtier approuvé par le NIOSH pour les pesticides. Il est interdit de passer plus d'une heure dans les sites traités par période de 24 heures ou avant la fin du délai de sécurité.

Appliquer uniquement lorsque les possibilités de dérive vers des secteurs habités ou des aires d'activité humaine (maisons, chalets, écoles et aires récréatives) sont minimales. Tenir compte de la vitesse du vent, de la direction du vent, des inversions de température, du matériel d'application utilisé et des réglages du pulvérisateur.

NE PAS pénétrer ou laisser un travailleur pénétrer dans les sites traités avant la fin des délais de sécurité indiqués dans le tableau qui suit :

Culture	Activité après traitement	Délai de sécurité ^a
Rhubarbe (dans des tunnels de forçage)	Toutes les activités	12 heures
Plantes ornementales de serre (fleurs non coupées) : applications foliaires sur les œillets, les chrysanthèmes	Toutes les activités	12 heures

Culture	Activité après traitement	Délai de sécurité ^a
Vergers de pommiers et de poiriers qui ont une densité de production élevée et dont la largeur du couvert végétal par arbre ne dépasse pas 2 mètres (1 mètre pour atteindre le centre ou le tronc à partir de l'allée).	Éclaircissage manuel des fruits, récolte manuelle	15 jours
	Taille manuelle, palissage	6 jours
	Toutes les autres activités	2 jours
Vergers de pommiers et de poiriers n'ayant pas une densité élevée : vergers de pommiers et de poiriers qui ne répondent pas aux exigences indiquées pour les vergers de pommiers et de poiriers à haute densité.	Éclaircissage manuel des fruits	24 jours
	Récolte manuelle	19 jours
	Taille manuelle, palissage	4 jours
	Toutes les autres activités	2 jours
Cerisiers, pêchers, pruniers, abricotiers, nectariniers	Éclaircissage manuel des fruits	29 jours
	Récolte manuelle	15 jours
	Toutes les autres activités	1 jour
Raisins	Écimage-rognage, annélation	78 jours
	Récolte manuelle, palissage, liage, effeuillage	55 jours
	Toutes les autres activités	12 heures
Bleuets en corymbe, mûres, mûres de Logan	Activités liées à l'irrigation par douchette ou à la lance donnant lieu à un contact avec le feuillage	6 jours
	Récolte manuelle, palissage/ liage (plein feuillage)	5 jours
	Toutes les autres activités	12 heures
Bleuets nains	Activités liées à l'irrigation par douchette ou à la lance donnant lieu à un contact avec le feuillage	6 jours
	Toutes les autres activités	3 jours
Fraises (de plein champ)	Activités liées à l'irrigation par douchette ou à la lance donnant lieu à un contact avec le feuillage	9 jours
	Récolte manuelle	6 jours
	Toutes les autres activités	12 heures

Culture	Activité après traitement	Délai de sécurité ^a
Framboises	Activités liées à l'irrigation par douchette ou à la lance donnant lieu à un contact avec le feuillage	7 jours
	Récolte manuelle, palissage/ liage (plein feuillage)	6 jours
	Toutes les autres activités	12 heures
Tomates (de plein champ – applications foliaires)	Activités liées à l'irrigation par douchette ou à la lance donnant lieu à un contact avec le feuillage	10 jours
	Récolte manuelle, palissage, liage	7 jours
	Toutes les autres activités	12 heures
Concombre (de plein champ)	Activités liées à l'irrigation par douchette ou à la lance donnant lieu à un contact avec le feuillage	10 jours
	Récolte manuelle, récolte mécanique, palissage, liage	3 jours
	Toutes les autres activités	12 heures
Surfaces gazonnées (terrains de golf et gazonnières seulement)	Toutes les activités	12 heures

^a Les DS supérieurs à 12 heures s'appliquent aux tâches manuelles. Si le DS pour une récolte manuelle est différent du délai d'attente avant la récolte, observer le délai le plus long des deux. Une récolte mécanique peut être effectuée lorsque le délai d'attente avant la récolte est écoulé, à condition qu'aucun travailleur n'entre en contact avec le feuillage traité. Si le DS est de 12 heures et qu'aucun délai d'attente avant la récolte n'est précisé, l'entrée dans le site traité n'est permise qu'après 12 heures.

2018-3411
2020-01-24

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

SYMPTÔMES D'EMPOISONNEMENT

L'ingestion de grosses quantités peut causer le vomissement et la diarrhée. Traiter selon les symptômes.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Il n'existe pas d'antidote spécifique en cas d'ingestion du fongicide SHARDA CAPTAN WSP. Vérifier les dommages possibles aux muqueuses avant de faire un lavage gastrique. En cas d'inhalation, vérifier le début d'œdème pulmonaire.

Traiter le système nerveux central selon les symptômes.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES :

Toxique pour les petits mammifères sauvages.

TOXIQUE pour les organismes aquatiques. Respecter les zones tampons indiquées dans le MODE D'EMPLOI.

MODE D'EMPLOI

Le fongicide SHARDA CAPTAN WSP est un fongicide granulé dispersable dans l'eau en sachet hydrosoluble utilisé pour supprimer certaines maladies fongiques des fruits, légumes et cultures ornementales. On peut endommager les cultures lorsqu'on utilise le Sharda Captan 80 WSP avec, immédiatement avant, ou tout de suite après un traitement à l'huile. NE PAS APPLIQUER CE PRODUIT À L'AIDE D'UN ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION AÉRIENNE

Application au moyen d'un pulvérisateur agricole : NE PAS appliquer par calme plat ni quand le vent souffle en rafales. NE PAS appliquer en gouttelettes d'un diamètre inférieur au calibre moyen de la classification de l'American Society of Agricultural Engineers (ASAE S572.1). La rampe de pulvérisation doit se trouver à 60 cm ou moins au-dessus de la culture ou du sol.

Application à l'aide d'un pulvérisateur pneumatique : NE PAS appliquer par calme plat ni quand le vent souffle en rafales. NE PAS orienter le jet directement au-dessus des plantes à traiter. À l'extrémité des rangs et le long des rangs extérieurs, couper l'alimentation des buses pointant vers l'extérieur. NE PAS appliquer lorsque le vent souffle à plus de 16 km/h au site d'application (d'après la mesure prise à l'extérieur du site de traitement, du côté d'où vient le vent).

Zones tampons : AUCUNE zone tampon N'EST REQUISE lors des applications localisées effectuées à l'aide de matériel manuel. Respecter les zones tampons précisées dans le tableau qui suit entre le point d'application directe du produit et le bord le plus rapproché, dans la direction du vent, des habitats d'eau douce sensibles (lacs, rivières, bourbiers, étangs, fondrières des prairies, criques, marais, ruisseaux, réservoirs, milieux humides, etc.) et des habitats estuariens ou marins sensibles.

Méthode d'application	Culture	Zones tampons (mètres) requises pour la protection des :				
		habitats d'eau douce d'une profondeur de:		habitats estuariens ou marins d'une profondeur de :		
		moins de 1 m	Plus de 1m	moins de 1 m	Plus de 1m	
Pulvérisateur agricole	Fraises	3	1	5	3	
	Plantes ornementales d'extérieur (fleurs non coupées)	2	1	4	2	
	Bleuets en corymbe, bleuets nains, mûres, mûres de Logan	2	1	5	2	
	Framboises	2	1	5	3	
	Concombres, tomates	3	1	10	4	
	Surfaces gazonnées (terrains de golf et gazonnières seulement)	5	1	10	5	
Pulvérisateur pneumatique	Vergers de pommiers et de poiriers, raisins	Début de la croissance	30	4	40	30
		Fin de la croissance	20	3	35	25
	Bleuets en corymbe ou bleuets nains, mûres, mûres de Logan	Début de la croissance	25	3	35	30
		Fin de la croissance	15	2	25	20
	Framboises	Début de la croissance	25	3	40	30
		Fin de la croissance	20	2	30	20
	Pêchers, pruniers, pruniers à pruneaux, abricotiers, nectariniers, cerisiers	Début de la croissance	30	5	40	35
		Fin de la croissance	20	3	35	25

LA GESTION DE LA RÉSISTANCE

Aux fins de la gestion de la résistance, le fongicide SHARDA CAPTAN WSP contient un fongicide appartenant au groupe M4. Toute population de champignons peut renfermer des individus naturellement résistants au fongicide SHARDA CAPTAN WSP et à d'autres fongicides du groupe M4. Il peut se produire une perte progressive ou complète d'efficacité lorsque ces fongicides sont appliqués à répétition sur les mêmes champs. Il peut également exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux fongicides:

- Dans la mesure du possible, alterner le fongicide SHARDA CAPTAN WSP ou d'autres fongicides du même groupe M4 avec des produits qui appartiennent à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes pathogènes.
- Utiliser, si cet emploi est permis, des mélanges en cuve contenant des fongicides qui appartiennent à un groupe différent et qui sont efficaces contre les pathogènes ciblés.
- Utiliser les fongicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre les maladies qui privilégie les inspections sur le terrain, la consultation de données antérieures sur l'utilisation des pesticides et la rotation des cultures, et qui prévoit l'acquisition d'une résistance chez les plantes hôtes, les répercussions des conditions environnementales sur l'apparition des maladies, les seuils déclencheurs de maladie de même que l'intégration de pratiques culturales ou biologiques ou d'autres formes de lutte chimique.
- Le cas échéant, utiliser des modèles de prévision des maladies afin d'appliquer les fongicides ou les bactéricides au moment propice.

2018-3411
2020-01-24

- Surveiller les populations fongiques traitées pour y déceler les signes éventuels de l'acquisition d'une résistance. Informer Sharda Cropchem Limited en présence d'une baisse possible de sensibilité à SHARDA CAPTAN WSP chez l'agent pathogène.
- Lorsque la maladie continue de progresser après traitement avec ce produit, ne pas augmenter la dose d'application. Cesser d'employer le produit et opter, si possible, pour un autre fongicide ayant un site d'action différent.
- Communiquer avec les spécialistes ou les conseillers agricoles certifiés de la région pour obtenir des recommandations supplémentaires sur une culture ou un agent pathogène précis pour ce qui est de la gestion de la résistance aux pesticides et de la lutte intégrée.

Pour obtenir davantage d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, communiquer avec Sharda Cropchem Limited au 1-844-810-5720 OU 1-416-840-5639.

COMPATIBILITÉ

On peut utiliser le fongicide SHARDA CAPTAN WSP à raison des doses recommandées conformément aux calendriers des arrosages ou recommandations du personnel agricole provincial ou d'une station expérimentale. Ne pas combiner avec des huiles ou des matières fortement alcalines comme la chaux hydratée, qui réduit l'activité fongique. Ne pas utiliser ce produit avec, immédiatement avant ou peu après un traitement à l'huile, ou avec des produits de parathion dans une formulation à base de solvant.

MÉLANGE

Remplir le réservoir de solution à pulvériser avec de l'eau propre au quart ou un tiers du volume voulu. Commencer l'agitation (l'agitation adéquate produit des vagues ou une rotation à la surface du liquide). Les sachets ci-inclus sont hydrosolubles, c'est-à-dire qu'ils vont se dissoudre complètement dans l'eau. Après avoir ouvert le sac extérieur, déposer dans le réservoir de pulvérisation, selon le mode d'emploi, le nombre d'emballages intérieurs intacts requis. Ne pas trop manipuler les emballages hydrosolubles ni les exposer à l'humidité pour ne pas les briser. Ajouter de l'eau pour obtenir le volume voulu. Mélanger à fond et appliquer immédiatement. Maintenir suffisamment d'agitation pendant le mélange et la pulvérisation pour assurer un mélange de pulvérisation uniforme.

RECOMMANDATIONS

Sauf indication contraire, les doses sont données à raison du fongicide SHARDA CAPTAN WSP par volume d'eau. Sauf indication contraire, commencer les applications avant ou dès l'apparition de la maladie et répéter au besoin pour maintenir l'efficacité du traitement, mais respecter les limites. Consulter les autorités compétentes pour des renseignements spécifiques puisque le calendrier des arrosages, le nombre de traitements et la dose nécessaire varient selon les conditions locales.

FRUITS

POMME (Vergers de pommiers qui ont une densité de production élevée)

- **Tavelure** (*Venturia inaequalis*):

Commencer à effectuer des applications préventives avant que l'infection ne s'établisse. Appliquer 1 à 2 sachets par 833 litres lorsque la pression de la maladie est faible à modérée seulement. Si la pression de la maladie est élevée ou que les conditions sont propices à une pression élevée de la maladie, mélanger en cuve du Sharda Captan 80 WSP à la dose indiquée avec un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie, ou changer pour un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie. Ne pas appliquer moins de 7 jours avant la récolte. Les traitements au début de la saison peuvent endommager le feuillage des Red Delicious, Winesap et autres variétés sensibles.

Pourriture amère (*Colletotrichum gloeosporioides*), **pourriture noire** (*Botryosphaeria obtuse*), **tache phoméenne** (*Mycosphaerella pomi*), **point d'oxidation** (*Zygothiala jamaicensis*), **tache de suie** (Dothideomycetes spp.) :

Commencer à effectuer des applications préventives avant que l'infection ne s'établisse. Appliquer 1 à 2 sachets par 833 litres lorsque la pression de la maladie est faible à modérée seulement. Si la pression de la maladie est élevée ou que les conditions sont propices à une pression élevée de la maladie, mélanger en cuve du Sharda Captan 80 WSP à la dose indiquée avec un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie, ou changer pour un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie. Consulter le calendrier provincial des arrosages pour le temps propice au traitement. Ne pas appliquer moins de 7 jours avant la récolte. Les traitements au début de la saison peuvent endommager le feuillage des Red Delicious, Winesap, et autres variétés sensibles.

2018-3411
2020-01-24

Chancre pérennant du pommier (*Gloeosporium perennans*) :

Commencer à effectuer des applications préventives avant que l'infection ne s'établisse. Appliquer 2 sachets par 833 litres lorsque la pression de la maladie est faible à modérée seulement. Si la pression de la maladie est élevée ou que les conditions sont propices à une pression élevée de la maladie, mélanger en cuve du Sharda Captan 80 WSP à la dose indiquée avec un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie, ou changer pour un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie. Consulter le calendrier provincial des arrosages pour le temps propice au traitement. Ne pas appliquer moins de 7 jours avant la récolte. Les traitements au début de la saison peuvent endommager le feuillage des Red Delicious, Winesap et autres variétés sensibles.

Pour les vergers de pommiers à haute densité ci-dessus, faire un Maximum de 10 applications à 7 jours d'intervalle.

POMME (Vergers de pommiers qui n'ont PAS une densité de production élevée)

- Tavelure (*Venturia inaequalis*):

Commencer à effectuer des applications préventives avant que l'infection ne s'établisse. Appliquer 1 à 2 sachets par 833 litres lorsque la pression de la maladie est faible à modérée seulement. Si la pression de la maladie est élevée ou que les conditions sont propices à une pression élevée de la maladie, mélanger en cuve du Sharda Captan 80 WSP à la dose indiquée avec un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie, ou changer pour un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie. Ne pas appliquer moins de 7 jours avant la récolte. Les traitements au début de la saison peuvent endommager le feuillage des Red Delicious, Winesap et autres variétés sensibles.

Pourriture amère (*Colletotrichum gloeosporioides*), pourriture noire (*Botryosphaeria obtuse*), tache phoméenne (*Mycosphaerella pomi*), point d'oxidation (*Zygothiala jamaicensis*), tache de suie (*Dothideomycetes* spp.):

Commencer à effectuer des applications préventives avant que l'infection ne s'établisse. Appliquer 1 à 2 sachets par 833 litres lorsque la pression de la maladie est faible à modérée seulement. Si la pression de la maladie est élevée ou que les conditions sont propices à une pression élevée de la maladie, mélanger en cuve du Sharda Captan 80 WSP à la dose indiquée avec un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie, ou changer pour un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie. Consulter le calendrier provincial des arrosages pour la dose recommandée, le taux et le temps propice au traitement. Ne pas appliquer moins de 7 jours avant la récolte. Les traitements au début de la saison peuvent endommager le feuillage des Red Delicious, Winesap, et autres variétés sensibles.

Chancre pérennant du pommier (*Gloeosporium perennans*) :

Commencer à effectuer des applications préventives avant que l'infection ne s'établisse. Appliquer 2 sachets par 833 litres lorsque la pression de la maladie est faible à modérée seulement. Si la pression de la maladie est élevée ou que les conditions sont propices à une pression élevée de la maladie, mélanger en cuve du Sharda Captan 80 WSP à la dose indiquée avec un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie, ou changer pour un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie. Ne pas appliquer moins de 7 jours avant la récolte. Les traitements au début de la saison peuvent endommager le feuillage des Red Delicious, Winesap et autres variétés sensibles.

Pour les ravageurs dans les vergers de pommiers à faible densité ci-dessus, faire un Maximum de 2 applications par année. DAT minimal de 7 jours. Lors de l'éclaircissage manuel d'une culture de fruits, effectuer 1 application avant l'éclaircissage et 1 application après l'éclaircissage.

ABRICOT - Pourriture brune (*Monilinia fructicola*) : Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Une application peut être effectuée du stade des bourgeons roses jusqu'avant la récolte. Appliquer 2 sachets par 833 litres à 3 sachets par 1000 litres lorsque la pression de la maladie est faible à modérée. Si la pression de la maladie est élevée ou que les conditions sont propices à une pression élevée de la maladie mélanger en cuve du Sharda Captan 80 WSP à la dose indiquée avec un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie, ou changer pour un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie. Maximum 1 application par saison.

CERISE (AIGRE, DOUCE) - Pourriture brune (*Monilinia fructicola*), criblure (tache foliaire) (*Wilsonomyces carpophilus*): Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Une application peut être effectuée du stade des bourgeons roses jusqu'avant la récolte. Appliquer 2 sachets par 833 litres à 3 sachets par 1000 litres lorsque la pression de la maladie est faible à modérée. Si la pression de la maladie est élevée ou que les conditions sont propices à une pression élevée de la maladie mélanger en cuve du Sharda Captan 80 WSP à

2018-3411
2020-01-24

la dose indiquée avec un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie, ou changer pour un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie. Maximum 1 application par saison. Pour les cerisiers, 1 application supplémentaire est permise après la récolte. Les traitements post-floraux peuvent endommager le feuillage des cerisiers doux Schmidt et Emperor Francis. Ne pas appliquer moins de 2 jours avant la récolte des cerises douces, ou 5 jours avant la récolte des cerises aigres.

PÊCHE ET NECTARINE - Pourriture brune (*Monilinia fructicola*), tavelure (*Cladosporium carpophilum*) : Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Une application peut être effectuée du stade des bourgeons roses jusqu'avant la récolte. Appliquer 2 sachets par 833 litres à 3 sachets par 1000 litres lorsque la pression de la maladie est faible à modérée. Si la pression de la maladie est élevée ou que les conditions sont propices à une pression élevée de la maladie mélanger en cuve du Sharda Captan 80 WSP à la dose indiquée avec un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie, ou changer pour un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie. Maximum 1 application par saison. Ne pas appliquer moins de 2 jours avant la récolte.

POIRE (Vergers de poiriers qui ont une densité de production élevée)

- **Tavelure (*Venturia inaequalis*), tache de suie (*Dothideomyces* spp) :**

Commencer à effectuer des applications préventives avant que l'infection ne s'établisse. Appliquer 2 sachets par 833 litres lorsque la pression de la maladie est faible à modérée seulement. Si la pression de la maladie est élevée ou que les conditions sont propices à une pression élevée de la maladie, mélanger en cuve du Sharda Captan 80 WSP à la dose indiquée avec un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie, ou changer pour un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie. Ne pas utiliser sur les poires D'Anjou. Ne pas appliquer moins de 7 jours avant la récolte.

Pour les vergers de poiriers à haute densité ci-dessus, faire un Maximum de 10 applications à 7 jours d'intervalle .

POIRE (Vergers de poiriers qui n'ont PAS une densité de production élevée)

- **Tavelure (*Venturia inaequalis*), tache de suie (*Dothideomyces* spp):**

Commencer à effectuer des applications préventives avant que l'infection ne s'établisse. Appliquer 2 sachets par 833 litres lorsque la pression de la maladie est faible à modérée seulement. Si la pression de la maladie est élevée ou que les conditions sont propices à une pression élevée de la maladie, mélanger en cuve du Sharda Captan 80 WSP à la dose indiquée avec un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie, ou changer pour un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie. Ne pas utiliser sur les poires D'Anjou. Ne pas appliquer moins de 7 jours avant la récolte.

Pour les ravageurs dans les vergers de poiriers à faible densité ci-dessus, faire un Maximum de 2 applications par année. DAT minimal de 7 jours. Lors de l'éclaircissage manuel d'une culture de fruits, effectuer 1 application avant l'éclaircissage et 1 application après l'éclaircissage.

PRUNE - Nodule noir (*Apiosporina morbosa*), tavelure (*Cladosporium carpophilum*), pourriture brune (*Monilinia fructicola*): Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Une application peut être effectuée du stade des bourgeons roses jusqu'avant la récolte. Appliquer 2 sachets par 833 litres à 3 sachets par 1000 litres lorsque la pression de la maladie est faible à modérée. Si la pression de la maladie est élevée ou que les conditions sont propices à une pression élevée de la maladie mélanger en cuve du Sharda Captan 80 WSP à la dose indiquée avec un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie, ou changer pour un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie. Maximum 1 application par saison. Ne pas appliquer moins de 2 jours avant la récolte.

RAISIN - Branche moribonde (*Phomopsis viticola*) (infections de la saison en cours) : Appliquer 2 sachets par 833 litres. Pour les raisins, un maximum de 3 applications/année est permis, dont 2 applications/année contre l'excoriose de la vigne (*Phomopsis viticola*) DAT minimal : 7 jours. Contre l'excoriose de la vigne, appliquer lorsque les nouvelles pousses mesurent 1 à 5 cm, et à nouveau lorsqu'elles atteignent 10 à 15 cm. Ne pas appliquer moins de 7 jours avant la récolte.

Mildiou (*Plasmopara viticola*), pourriture noire (*Guignardia Bidwellii*):

Appliquer 2 sachets par 833 litres à 3 sachets dans 1000 litres. Maximum 1 application/année contre la pourriture noire (*Guignardia bidwellii*) ou le mildiou (*Plasmopara viticola*). Contre le mildiou ou la pourriture noire, l'application peut être effectuée juste avant la floraison, juste après la floraison ou au stade de première couverture. Ne pas appliquer moins de 7 jours avant la récolte.

2018-3411
2020-01-24

FRAMBOISE - Pourriture du fruit (*Botrytis* spp.), **brûlure des dards** (*Didymella applanata*) : Appliquer 2 sachets par 833 litres. Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Maximum 6 applications à 7 jours d'intervalle. Ne pas appliquer moins de 2 jours avant la récolte.

MÛRE - Pourriture du fruit (*Botrytis* spp.): Appliquer 4 sachets par 1000 litres. Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Maximum 6 applications à 7 jours d'intervalle. Ne pas appliquer moins de 2 jours avant la période de récolte.

MÛRE DE LOGAN - Tache de la tige (*Elsinoe veneta* et *Colletotrichum* spp.), **pourriture du fruit** (*Botrytis* spp.), **tache foliaire** (*Septoria rubi*), **brûlure des dards** (*Didymella applanata*) : Appliquer 3 sachets par 1071 litres à 4 sachets dans 1000 litres. Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Maximum 6 applications à 7 jours d'intervalle. Ne pas appliquer moins de 2 jours avant la récolte.

BLEUET- Pourriture du fruit (*Botrytis* spp.), **pourriture sclérotique** (*Monilinia vaccinii-corymbosi*): Appliquer 4 sachets dans 1000 litres. Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Maximum 6 applications à 7 jours d'intervalle. Ne pas appliquer moins de 2 jours avant la récolte.

FRAISE - Moisissure grise (*Botrytis cinerea*), **tache foliaire** (*Mycosphaerella fragariae*): Appliquer 5 sachets par 893 litres à 8 sachets dans 952 litres lorsque la pression de la maladie est faible à modérée seulement. Si la pression de la maladie est élevée ou que les conditions sont propices à une pression élevée de la maladie, mélanger en cuve du Sharda Captan 80 WSP à la dose indiquée avec un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie, ou changer pour un autre fongicide homologué pour combattre la même maladie. Ne pas appliquer moins de 2 jours avant la récolte.

LÉGUMES

RHUBARBE (en forçage) - Moisissure grise (*Botrytis cinerea*) : Appliquer 3 sachets par 1071 litres à 4 sachets dans 1000 litres. Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Maximum de 6 applications à 7 jours d'intervalle. Ne pas appliquer moins de 2 jours avant la récolte. Volume maximal de pulvérisation de 150 L / ha pour la rhubarbe dans les hangars de forçage.

CONCOMBRE- Anthracnose (*Colletotrichum orbiculare*), **tavelure** (*Cladosponum cucumerinum*): Appliquer 4 sachets par 1000 litres à 8 sachets dans 952 litres. Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Maximum de 3 applications à 7 jours d'intervalle. Ne pas appliquer moins de 2 jours avant la récolte.

TOMATE – Anthracnose (*Colletotrichum* spp.), **brûlure alternarienne** (*Alternaria solani*), **tache grise** (*Stemphylium* spp.), **mildiou** (*Phytophthora infestans*), **tache septorienne** (*Septoria lycopersici*) : Appliquer 2 sachets par 833 litres à 5 sachets dans 1000 litres. Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Maximum de 3 applications à 7 jours d'intervalle. Ne pas appliquer moins de 2 jours avant la récolte.

NE PAS utiliser sur le concombre, la tomate et la fraise de serre.

AUTRES CULTURES

GAZON (Terrains de golf et gazonnières seulement) - Plaque brune (*Rhizoctonia solani*), **fonte des semis** (*Pythium* spp, *Rhizoctonia* spp., *Fusarium*, et autres champignons), **tache foliaire** (différents genres de champignons), **fonte helminthosporienne** (*Dreschlera poae*), **pourriture des racines** : Appliquer 12 sachets par 1017 litres. Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Maximum 1 application. **Ne pas appliquer sur les pelouses résidentielles, parcs, écoles, terrains de sports et autres endroits de loisirs.**

OEILLET – Brûlure (*Botrytis cinerea*), **tache foliaire** (*Alternaria dianthicola* ou *Alternaria dianthi*): Appliquer 2 sachets par 833 litres à 3 sachets dans 1071 litres. Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Maximum 6 applications à 7 jours d'intervalle. NE PAS utiliser sur des fleurs coupées de serre

CHRYSANTHÈME - Moisissure grise (*Botrytis cinerea*), **tache septorienne** (*Septoria obesa*) : Appliquer 2 sachets par 833 litres à 3 sachets dans 1071 litres. Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Maximum 6 applications à 7 jours d'intervalle. NE PAS utiliser sur des fleurs coupées de serre

2018-3411
2020-01-24

ROSIER - Tache noire (*Diplocarpon rosae*) : Appliquer 2 sachets par 833 litres à 3 sachets dans 1071 litres. Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie. Maximum 6 applications à 7 jours d'intervalle.

NE PAS utiliser sur des fleurs coupées de serre

BÉGONIA (TUBÉREUX), DAHLIA, IRIS (BULBEUX), NARCISSE, TULIPE, GLAÏEUL - Fonte des semis (champignons pathogènes du sol), **pourriture des bulbes** (champignons pathogènes du sol) : Appliquer 7 sachets par 921 litres à 18 sachets par 957 litres. Avant l'entreposage, tremper et laisser sécher.

NE PAS effectuer le trempage des bulbes à la main. Un équipement de trempage mécanique ou automatisé doit être utilisé (par exemple, un transporteur à courroie ou un élévateur à fourches).

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais et sec. Protéger de la chaleur excessive.

ÉLIMINATION

Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale. Rendre le contenant inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.