

2021-05-20  
2020-3925

(Box label)

## Primidacide II pour chats 4 Kg et moins

Adulticide contre les puces

[Pour les chats âgés de 7 mois et plus, pesant 4 kg et moins]

[Une fois par mois] Traitement topique [mensuel] contre les puces

LIQUIDE

[Tue les puces rapidement] [Tue rapidement les puces] [et] [peut réduire la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP)]

[Supprime les puces dans les 24 heures suivant le traitement]

[Protection contre les infestations de puces pour jusqu'à quatre semaines]

[Approvisionnement de [trois] [quatre] [six] [3] [4] [6] mois]

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'USAGE  
POUR UTILISATION SUR LES CHATS SEULEMENT

Ne pas utiliser sur d'autres animaux

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



POISON

AVERTISSEMENT IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF : Imidaclopride 9,1 %

Pyriproxyfène 0,46%

N°. D'HOMOLOGATION: 34147 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

[Trois] [Quatre] [Six] [x] Tubes de 0,4 mL

TWIST N° USE TUBE<sub>mc</sub>

[Simple] [et] [facile à ouvrir]

[Bouchon] [Embout] [inviolable] [à ouverture par axe vissable intérieur]

[Tube souple Pharma] [hygiénique] [pour application de dose unique]

[Fusion Animal Health Inc.

71 Main Street,

Exeter, ON

NOM 1S3

416-627-9425]

Primidacide II pour chats 4 Kg et moins contrôlera les puces présentes sur le chat en moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les nouvelles infestations pour une période allant jusqu'à 4 semaines. D'autres infestations causées par l'apparition de nouvelles puces dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6 semaines ou plus après le début du traitement. Appliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a un risque constant d'infestation. Le traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent. Ne pas faire de shampooing ni immerger l'animal dans l'eau immédiatement après le traitement. L'animal peut recevoir un shampooing, être immergé dans l'eau ou être exposé à la pluie trois jours après le traitement. Primidacide II pour chats 4 Kg et moins conserve ses propriétés ovicides et larvicides jusqu'à quatre semaines après un shampooing, une baignade ou une exposition à la pluie. L'effet adulticide peut être réduit par de multiples shampooings, immersions dans l'eau ou expositions à la pluie. Une application supplémentaire pourrait s'avérer nécessaire à la suite de telles activités.

[Pour une élimination efficace des puces, le traitement de l'animal devrait être accompagné du nettoyage de tous les endroits qu'il fréquente. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac après usage) et laver les endroits où l'animal se couche et vit, ou qu'il fréquente. Si le problème de parasites persiste, un traitement des locaux au moyen d'un insecticide homologué à cette fin pourrait se révéler nécessaire.

L'activité alimentaire répétitive des puces infestant les animaux de compagnie peut provoquer chez ces derniers un trouble d'hypersensibilité de l'épiderme : la dermatite allergique aux piqûres de puces (DAPP). Le traitement avec Primidacide II pour chats 4 Kg et moins tue rapidement les puces et diminue l'incidence de cette dermatite.

#### MODE D'EMPLOI :

Ce produit contient imidaclopride et pyriproxifène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent imidaclopride ou pyriproxifène après avoir utilisé Primidacide II pour chats 4 Kg et moins.

Ne PAS administrer par la gueule. Ne PAS utiliser sur d'autres animaux. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux sous médication ou traités avec d'autres pesticides. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

Le traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent.

Ne pas utiliser sur les chats âgés de moins de 7 mois.

Utiliser uniquement sur les chats pesant 4 kg et moins.

Ce produit est présenté sous forme de tubes à dose unique. Cet emballage contient [Trois] [Quatre] [Six] [3] [4] [6] doses mensuelles de 0,4 mL. Traiter le chat une fois par mois selon la façon décrite ci-dessous. N'appliquer qu'une seule dose de 0,4 mL à la fois.

Retirer un applicateur de l'emballage.

Tenir le tube en position verticale avec l'ouverture vers le haut.

Tourner la pointe bouchon afin de briser le sceau du tube.

Écarter le pelage dans la région du cou, à la base du crâne, jusqu'à ce que la peau soit visible.

Placer la pointe du tube sur la peau et presser le tube de façon à le vider complètement et directement sur la peau exposée. Éviter tout contact de ce produit avec les yeux ou la gueule de l'animal. Le produit a un goût amer; par conséquent, si le chat le lèche immédiatement après le traitement, il est possible qu'il salive durant un court moment. L'application du produit à la base du crâne réduira les risques de léchage. Faire en sorte que les animaux récemment traités ne puissent pas se nettoyer les uns les autres. Tenir l'animal éloigné des meubles et des planchers de bois francs jusqu'à ce que Primidacide II pour chats 4 Kg et moins soit sec.

Jeter le tube vide de la manière décrite à la section ÉLIMINATION.]

#### MISES EN GARDE :

ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré ou si absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps

ayant été en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en entreposant ou en éliminant le produit.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de 7 mois.

Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent s'être trouvés physiquement proches de l'animal traité. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut, dans de rares cas, produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près. Si les signes persistent ou s'aggravent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Effets secondaires: Surveillez votre chat après l'application. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro-intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Fusion Animal Health Inc. au 1-800-265-9754.

**PREMIERS SOINS :**

**ÊTRES HUMAINS :** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INGESTION,** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale ou vétérinaire.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter le patient selon les symptômes.

**ENTREPOSAGE :** Entreposer le contenant à la température de la pièce.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le tube vide et le bouchon dans du papier journal et les jeter avec les ordures ménagères.

[GARDER L'INFORMATION DE L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.]

[Fusion Animal Health Inc.

71 Main Street,

Exeter, ON

NOM 1S3

416-627-9425]

[(Insert label)]

## Primidacide II pour chats 4 Kg et moins

Adulticide contre les puces

Pour les chats âgés de 7 mois et plus, pesant 4 kg et moins.

[Une fois par mois] Traitement topique [mensuel] contre les puces

LIQUIDE

[Tue les puces rapidement] [Tue rapidement les puces] [et] [peut réduire la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP)]

[Supprime les puces dans les 24 heures suivant le traitement]

[Protection contre les infestations de puces pour jusqu'à quatre semaines]

[Approvisionnement de [trois] [quatre] [six] [3] [4] [6] mois]

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'USAGE  
POUR UTILISATION SUR LES CHATS SEULEMENT

Ne pas utiliser sur d'autres animaux

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



POISON

AVERTISSEMENT IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF : Imidaclopride 9,1 %

Pyriproxifène 0,46%

N°. D'HOM. 34147 L.P.A.

[Trois] [Quatre] [Six] tubes de 0,4 mL

[TWIST N' USE TUBE<sub>mc</sub>]

[Simple] [et] [facile à ouvrir]

[Bouchon] [Embout] [inviolable] [à ouverture par axe vissable intérieur]

[Tube souple Pharma] [hygiénique] [pour application de dose unique]

Primidacide II pour chats 4 Kg et moins contrôlera les puces présentes sur le chat en moins d'un jour après le traitement et continuera à protéger l'animal contre les nouvelles infestations pour une période allant jusqu'à 4 semaines. D'autres infestations causées par l'apparition de nouvelles puces dans l'environnement peuvent continuer à se produire durant 6 semaines ou plus après le début du traitement. Appliquer toutes les 4 semaines pour assurer l'efficacité continue du produit lorsqu'il y a un risque constant d'infestation. Le traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent. Ne pas faire de shampooing ni immerger l'animal dans l'eau immédiatement après le traitement. L'animal peut recevoir un shampooing, être immergé dans l'eau ou être exposé à la pluie trois jours après le traitement. Primidacide II pour chats 4 Kg et moins conserve ses propriétés ovicides et larvicides jusqu'à quatre semaines après un shampooing, une baignade ou une exposition à la pluie. L'effet adulticide peut être réduit par de multiples shampooings, immersions dans l'eau ou expositions à la pluie. Une application supplémentaire pourrait s'avérer nécessaire à la suite de telles activités. Pour une élimination efficace des puces, le traitement de l'animal devrait être accompagné du nettoyage de tous les endroits qu'il fréquente. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac après usage) et laver les endroits où l'animal se couche et vit, ou qu'il fréquente. Si le problème de parasites persiste, un traitement des locaux au moyen d'un insecticide homologué à cette fin pourrait se révéler nécessaire. L'activité alimentaire répétitive des puces infestant les animaux de compagnie peut provoquer chez ces derniers un trouble d'hypersensibilité de l'épiderme : la dermatite allergique aux piqûres de puces (DAPP). Le traitement avec Primidacide II pour chats 4 Kg et moins tue rapidement les puces et diminue l'incidence de cette dermatite.

#### MISES EN GARDE :

**ÊTRES HUMAINS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré ou si absorbé par la peau. Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps ayant été en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec. Ne pas contaminer l'eau, ni la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux en entreposant ou en éliminant le produit.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Ne pas utiliser sur des animaux âgés de moins de 7 mois. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent s'être trouvés physiquement proches de l'animal traité. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut, dans de rares cas, produire une sensibilisation. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près. Si les signes persistent ou s'aggravent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Effets secondaires: Surveillez votre chat après l'application. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro-intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Fusion Animal Health Inc. au 1-800-265-9754.

#### PREMIERS SOINS :

**ÊTRES HUMAINS :** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INGESTION,** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre

anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE** : Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale ou vétérinaire.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** : Traiter le patient selon les symptômes.

**ENTREPOSAGE** : Entreposer le contenant à la température de la pièce.

**ÉLIMINATION** : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le tube vide et le bouchon dans du papier journal et les jeter avec les ordures ménagères.

#### MODE D'EMPLOI :

Ce produit contient imidaclopride et pyriproxifène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent imidaclopride ou pyriproxifène après avoir utilisé Primidacide II pour chats 4 Kg et moins.

Ne PAS administrer par la gueule. Ne PAS utiliser sur d'autres animaux. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, âgés, des femelles gravides ou qui allaitent, ou des animaux sous médication ou traités avec d'autres pesticides. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

Le traitement doit être répété uniquement si les problèmes de puces réapparaissent.

Ne pas utiliser sur les chats âgés de moins de 7 mois.

Utiliser uniquement sur les chats pesant 4 kg et moins.

Ce produit est présenté sous forme de tubes à dose unique. Cet emballage contient [Trois] [Quatre] [Six] [3] [4] [6] doses mensuelles de 0,4 mL. Traiter le chat une fois par mois selon la façon décrite ci-dessous. N'appliquer qu'une seule dose de 0,4 mL à la fois.

Retirer un applicateur de l'emballage.

Tenir le tube en position verticale avec l'ouverture vers le haut.

Tourner la pointe bouchon afin de briser le sceau du tube.

Écarter le pelage dans la région du cou, à la base du crâne, jusqu'à ce que la peau soit visible.

Placer la pointe du tube sur la peau et presser le tube de façon à le vider complètement et directement sur la peau exposée. Éviter tout contact de ce produit avec les yeux ou la gueule de l'animal. Le produit a un goût amer; par conséquent, si le chat le lèche immédiatement après le traitement, il est possible qu'il salive durant un court moment. L'application du produit à la base du crâne réduira les risques de léchage. Faire en sorte que les animaux récemment traités ne puissent pas se nettoyer les uns les autres. Tenir l'animal éloigné des meubles et des planchers de bois francs jusqu'à ce que Primidacide II pour chats 4 Kg et moins soit sec.

Jeter le tube vide de la manière décrite à la section ÉLIMINATION.

**GARDER L'INFORMATION DE L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

Fusion Animal Health Inc.

71 Main Street,

Exeter, ON

NOM 1S3

416-627-9425

(Tube label)

Primidacide II pour chats 4 Kg et moins

LIRE L'ÉTIQUETTE [ET][&] LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'USAGE



POISON

AVERTISSEMENT IRRITANT POUR LES YEUX

DOMESTIQUE

USAGE EXTERNE SEULEMENT

PRINCIPE ACTIF : Imidaclopride 9,1 %

Pyriproxyfène 0,46%

N° D'HOM 34147 LPA

Fusion Animal Health Inc.

[71 Main Street

Exeter, ON

NOM 1S3]

416-627-9425

0,4 mL