

2023-5832
2023-11-25

Insert (French)

Parapet Praventa chat de grande taille

Adulticide/larvicide/ovicide contre les puces

Pour chats de 8 semaines et plus pesant plus de 4 kg

Traitement topique mensuel contre les puces

Solution

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

POUR USAGE SUR LES CHATS SEULEMENT

Ne pas traiter d'autres animaux avec ce produit

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



POISON

AVERTISSEMENT IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPES ACTIFS : imidaclopride à 9,1 % et pyriproxifène à 0,46 %

N° D'HOM. 34929 L. P. A.

Contient un à six tubes de 0,8 mL

Tevra Brands LLC
9100 F Street, Suite 200
Omaha, NE, USA
68127

Rolf C. Hagen Inc.
20500 Trans Canada Hwy
Baie d'Urfé, QC H9X 0A2
Telephone: 1-833-408-0768

[Contient de l'imidaclopride et du pyriproxifène, des principes actifs qui se trouvent dans le produit
Avantage II.] [Contient les mêmes principes actifs que Avantage II.]

Parapet Praventa chat de grande taille tue, en deçà d'une journée du traitement, de 98 à 100 % des puces ayant infesté les chats. Une protection contre une réinfestation de puces peut durer jusqu'à quatre semaines sur les chats.

Un traitement mensuel est nécessaire si l'animal est continuellement réinfesté ou si une action préventive contre les puces est désirée. Les puces, les œufs et les larves sont tués après contact avec les débris cutanés d'un animal traité avec Parapet Praventa chat de grande taille. Parapet Praventa chat de grande taille offre une protection contre les puces à de multiples stades de vie en interrompant efficacement tous les stades de vie des puces afin de décimer rapidement et pendant longtemps les populations d'insectes.

Ne pas faire de shampoing ou immerger l'animal dans l'eau immédiatement après le traitement. L'animal peut recevoir un shampoing, être immergé dans l'eau ou être exposé à la pluie trois jours après le traitement. Parapet Praventa chat de grande taille conserve ses propriétés ovicides et larvicides jusqu'à quatre semaines sur les chats après un shampoing, une baignade ou une exposition à la pluie. L'effet adulticide peut être réduit par de multiples shampooings, immersions dans l'eau ou expositions à la pluie. Une application supplémentaire sur les chats pourrait s'avérer nécessaire à la suite de telles activités.

L'activité alimentaire répétitive des puces infestant les animaux de compagnie peut provoquer chez ces derniers un trouble d'hypersensibilité de l'épiderme : la dermatite allergique aux piqûres de puces (DAPP). Le traitement avec Parapet Praventa chat de grande taille tue rapidement les puces et diminue l'incidence de cette dermatite. Pour une élimination efficace des puces, le traitement de l'animal devrait être accompagné du nettoyage de tous les endroits fréquentés par celui-ci. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac après usage) et laver les endroits où l'animal se couche et vit ou qu'il fréquente. Si le problème persiste, il sera peut-être nécessaire d'effectuer un traitement insecticide des lieux. Consulter le vétérinaire si l'infestation persiste.

MISES EN GARDE :

ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré. Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Ne pas utiliser sur des chats âgés de moins de 8 semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent se trouver à proximité de l'animal traité. L'utilisation de tout pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilité. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près. Si les signes persistent ou s'aggravent, consulter immédiatement un médecin vétérinaire.

Effets Secondaires : Surveillez votre animal de compagnie après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure: une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro-intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Rolf C. Hagen Inc. au 1-833-408-0768.

PREMIERS SOINS :

ÊTRES HUMAINS :

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu le conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau **OU LES VÊTEMENTS**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un médecin vétérinaire. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale ou vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter le patient selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Entreposer le contenant à la température de la pièce.

ÉLIMINATION: Envelopper le tube vide et le bouchon dans du papier journal et jeter avec les ordures ménagères.

MODE D'EMPLOI :

Ce produit contient Imidaclopride et Pyriproxyfène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent Imidaclopride et Pyriproxyfène après avoir utilisé Parapet Praventia chat de grande taille.

Ne PAS administrer par voie orale.

Ce produit se présente sous forme d'un tube applicateur à dose unique. Cet emballage contient une à six doses mensuelles de 0,8 mL. N'appliquer qu'une seule dose de 0,8

mL à la fois. Traiter le chat une fois par mois selon la façon décrite ci-dessous. Ne pas utiliser sur d'autres animaux.

Chats

Utiliser seulement sur les chats âgés de 8 semaines et plus, pesant plus de 4 kg. Ne pas utiliser chez les chats âgés de moins de 8 semaines. Ne pas répéter le traitement avant quatre semaines. Répéter toutes les quatre semaines pour un contrôle antiparasitaire continu si l'animal est continuellement réinfesté.

Mode d'emploi :

1. Retirer un applicateur de l'emballage.
2. Tenir le tube en position verticale avec l'ouverture vers le haut. Couper le capuchon du tube.
3. Écarter le pelage dans la région du cou, à la base du crâne, jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer la pointe du tube sur la peau et presser le tube de façon à le vider complètement et directement sur la peau exposée. Éviter tout contact de ce produit avec les yeux ou la gueule de l'animal. Le produit a un goût amer; par conséquent, si l'animal le lèche immédiatement après le traitement, il est possible qu'il salive durant un court moment. L'application du produit à la base du crâne réduira les risques de léchage. Faire en sorte que les animaux récemment traités ne puissent pas se nettoyer les uns les autres.
4. Jeter le tube vide de la manière décrite à la section ÉLIMINATION.

Consulter un vétérinaire avant d'utiliser chez un animal malade, âgé, en gestation, qui allaite des petits ou reçoit un traitement médical ou pesticide. Un vétérinaire devrait être consulté si l'infestation de l'animal par les puces persiste.

Tenir l'animal éloigné des meubles et des planchers de bois francs jusqu'à ce que Parapet Praventat chat de grande taille soit sec.

Garder le feuillet d'emballage pour référence future.

Carton (French)

Parapet Praventia chat de grande taille

Adulticide/larvicide/ovicide contre les puces

Pour chats de 8 semaines et plus pesant plus de 4 kg

Traitement topique mensuel contre les puces

Solution

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI

POUR USAGE SUR LES CHATS SEULEMENT

Ne pas traiter d'autres animaux avec ce produit

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



POISON

AVERTISSEMENT IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPES ACTIFS : imidaclopride à 9,1 % et pyriproxifène à 0,46 %

N° D'HOM. 34929 L. P. A.

Contient un à six tubes de 0,8 mL

Rolf C. Hagen Inc.
20500 Trans Canada Hwy
Baie d'Urfé, QC H9X 0A2
Telephone: 1-833-408-0768

[Contient de l'imidaclopride et du pyriproxifène, des principes actifs qui se trouvent dans le produit
Avantage II.] [Contient les mêmes principes actifs que Avantage II.]

Parapet Praventa chat de grande taille tue, en deçà d'une journée du traitement, de 98 à 100 % des puces ayant infesté les chats. Une protection contre une réinfestation de puces peut durer jusqu'à quatre semaines sur les chats.

Un traitement mensuel est nécessaire si l'animal est continuellement réinfesté ou si une action préventive contre les puces est désirée. Les puces, les œufs et les larves sont tués après contact avec les débris cutanés d'un animal traité avec Parapet Praventa chat de grande taille. Parapet Praventa chat de grande taille offre une protection contre les puces à de multiples stades de vie en interrompant efficacement tous les stades de vie des puces afin de décimer rapidement et pendant longtemps les populations d'insectes.

Ne pas faire de shampooing ou immerger l'animal dans l'eau immédiatement après le traitement. L'animal peut recevoir un shampooing, être immergé dans l'eau ou être exposé à la pluie trois jours après le traitement. Parapet Praventa chat de grande taille conserve ses propriétés ovicides et larvicides jusqu'à quatre semaines sur les chats après un shampooing, une baignade ou une exposition à la pluie. L'effet adulticide peut être réduit par de multiples shampooings, immersions dans l'eau ou expositions à la pluie. Une application supplémentaire sur les chats pourrait s'avérer nécessaire à la suite de telles activités.

MISES EN GARDE :

ÊTRES HUMAINS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré. Cause de l'irritation oculaire. NE PAS mettre dans les yeux. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc au moment de l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui est entrée en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal tant que le produit n'est pas sec.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Ne pas utiliser sur des chats âgés de moins de 8 semaines. Faire attention à ne pas exposer les autres animaux qui peuvent se trouver à proximité de l'animal traité. L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilité. Les animaux plus petits sont plus susceptibles de subir des effets indésirables. Surveiller de près. Si les signes persistent ou s'aggravent, consulter immédiatement un médecin vétérinaire.

Effets Secondaires : Surveillez votre animal de compagnie après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro-intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou Rolf C. Hagen Inc. Au 1-833-408-0768.

PREMIERS SOINS :

ÊTRES HUMAINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant,

retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'en avoir reçu le conseil par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Si des signes de sensibilité apparaissent, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilité persistent, consulter immédiatement un médecin vétérinaire. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale ou vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter le patient selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Entreposer le contenant à la température de la pièce.

ÉLIMINATION: Envelopper le tube vide et le bouchon dans du papier journal et jeter avec les ordures ménagères.

MODE D'EMPLOI :

Ce produit contient Imidaclopride et Pyriproxyfène. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des poudres ou des colliers qui contiennent Imidaclopride et Pyriproxyfène après avoir utilisé Parapet Praventia chat de grande taille.

Tube (French)

Parapet Praventia chat de grande taille

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE FEUILLET D'EMBALLAGE AVANT L'EMPLOI



POISON

AVERTISSEMENT IRRITANT POUR LES YEUX

USAGE DOMESTIQUE

USAGE EXTERNE SEULEMENT

PRINCIPES ACTIFS : imidaclopride à 9,1 % et pyriproxifène à 0,46 %

N° D'HOM. 34929 L. P. A.

Rolf C. Hagen Inc.
20500 Trans Canada Hwy
Baie d'Urfé, QC H9X 0A2
Telephone: 1-833-408-0768

0,8 mL