

JUST ONE BITE APPÂT À RATS ET SOURIS

Avertissement, contient les allergènes arachide et blé.

DOMESTIQUE

GARANTIE: Bromadiolone.....0.005%

No. D'ENR. 22161 LOI P.A.

AVERTISSEMENT POISON

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

CONTENU NET: 43 g

FARNAM COMPANIES, INC.

301 W. Osborn

Phoenix, AZ 85013

Farnam (Canada) Marketing, Inc.

#700,10104-103 Avenue

Edmonton, AB T5J 0H8

1-800-548-2828

MODE D'EMPLOI:

Choix des Points de Traitement: Placer l'appât aux endroits de passage des rats et là où ils ont le plus de chance de se trouver et de consommer l'appât. Il est souhaitable d'en placer le long des murs, dans les coins, près des ouvertures rongées, dans et autour des trous et dans les endroits cachés où se nourrissent les rats et souris. S'assurer d'un apport régulier d'appât frais. Enlever rapidement tout appât contaminé ou souillé. Surmulots (*Rattus norvegicus*) et rats noirs (*Rattus rattus*): Supprimer autant que possible la nourriture présente à l'état naturel et placer 3 à 10 paquets d'appât (habituellement à des intervalles de 5 à 10 m) dans la zone de traitement. S'assurer d'un apport ininterrompu d'appât frais pendant au moins 10 jours ou jusqu'à ce que tout signe de présence de rats cesse. Souris communes (*Mus musculus*): Éliminer autant que possible la nourriture présente à l'état naturel et placer 1 paquet d'appât à des intervalles de 2 à 4 m dans la zone de traitement. S'assurer d'un apport ininterrompu d'appât frais pendant au moins 15 jours ou jusqu'à ce que tout signe de présence des souris cesse.

RESTRICTIONS D'UTILISATION:

L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de la portée des enfants, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage. NE PAS placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut être nocif ou léthal si ingéré ou absorbé par lapeau. Ne pas ouvrir les produits prémesurés offerts en emballages serrés. Porter des gants résistant aux produits chimiques lors de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.**

Ce produit est toxique pour les poissons et la faune. Garder loin des lacs, cours d'eau ou étangs.

PREMIERS SOINS: **En cas de contact avec les yeux,** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou le nom du produit et le numéro d'homologation LPA au moment de se rendre pour obtenir de l'aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: LA vitamine K1 sous forme d'injections, intramusculaires ou sous-cutanées ou par ingestion orale, est un traitement suggère en cas d'empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par les temps de prothrombine prolongés (P.T) détermineront la thérapie appropriée à appliquer. Le contrôle des temps de prothrombie indiquera s'il faut répéter le traitement.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés. Ne pas contaminer l'eau ni les aliments pour consommation humaine ou animale lors de l'entreposage ou de l'élimination.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Éliminer tout appât souillé ou non utilisé, conformément aux exigences locales. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements. Jeter le contenant vide aux ordures ménagères.

ÉLIMINATION DES RONGEURS: Éliminer les rongeurs morts dans la poubelle ou en les enterrant.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))