

13-DEC-2006

29-JAN-2008 Avis de modification - changement de titulaire

THROW BAG

**LATER'S
BOULETTES POUR RATS ET SOURIS**

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 23303 LOI P.A.

GARANTIE : BROMADIOLONE 0,005 %

Avertissement, contient l'allergène blé.

Contient du malathion à raison de 0,0095 % à titre d'agent de conservation.

AVERTISSEMENT – POISON

LIRE LE MODE D'EMPLOI SUR CE SACHET ET SUR LE CONTENANT
AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

50 g

Avis de modification

~~Spectrum Brands IP Inc.~~
P.O. Box 21001
Brantford, ON
N3R 7W9

Sure-Gro IP Inc.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut être nocif ou létal si ingéré ou absorbé par la peau. Porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.**

RESTRICTIONS D'UTILISATION: L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de portée des enfants, des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. NE PAS placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

PREMIERS SOINS : Si avalé, FAIRE VOMIR. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente, ni faire vomir. Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre antipoison tous les cas d'ingestion de ce produit. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté. Apporter le contenant, l'étiquette ou le nom du produit et le numéro d'homologation LPA lorsqu'on cherche à obtenir une attention médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : L'administration intramusculaire, sous-cutanée ou par la bouche de vitamine K₁ sont les traitements suggérés pour les empoisonnements qui réduisent la capacité de coagulation du sang. On détermine la sévérité de l'empoisonnement et la thérapie appropriée en mesurant les temps de prothrombine pendant une période prolongée. La surveillance des temps de coagulation indiquera s'il est nécessaire de répéter le traitement.

ENTREPOSAGE :

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés.

CARTON

**LATER'S
BOULETTES POUR RATS ET SOURIS**

TUE RATS ET SOURIS EN UNE SEULE CONSOMMATION

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 23303 LOI P.A.

GARANTIE : BROMADIOLONE 0,005 %

Avertissement, contient l'allergène blé.

Contient du malathion à raison de 0,0095 % à titre d'agent de conservation.

AVERTISSEMENT – POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

5 x 50 g (10 x 50 g) SACS D'APPÂT

Avis de modification

~~Spectrum Brands IP Inc.~~
P.O. Box 21001
Brantford, ON
N3R 7W9

Sure-Gro IP Inc.

POUR USAGE DANS LES HABITATIONS, ENTREPÔTS ET ENDROITS OÙ L'ON N'EMMAGASINE PAS D'ALIMENTS NI DE MOULÉES, À L'INTÉRIEUR ET LE LONG DES MURS EXTÉRIEURS DES IMMEUBLES.

MODE D'EMPLOI : Placer les sacs d'appât dans des endroits inaccessibles ou dans des stations d'appât protégées le long des murs, dans les coins, près des trous des rats et dans les endroits dissimulés où les rats et les souris se nourrissent, s'abreuvent ou passent. Effectuer une vérification quotidienne pour vous assurer qu'il y a approvisionnement ininterrompu d'appât pendant au moins 15 jours. Continuer l'approvisionnement jusqu'à ce que les rats et les souris n'en mangent plus.

1 cuillerée à table = appr. 15 g 1 m = 1 longue enjambée

COMMENT L'UTILISER :

Pour les Surmulots et les Rats Ordinaires : Espacer les sacs d'appât de 6 à 9 m et mettre 1 sac fermé par endroit.

Pour les Souris : Espacer 10 – 15 g des boulettes de 2 à 3 m.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut être nocif ou létal si ingéré ou absorbé par la peau. Porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.**

RESTRICTIONS D'UTILISATION :

L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de portée des enfants, des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. NE PAS placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT : Ne pas contaminer aucune masse d'eau.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, donner 1 ou 2 verres d'eau à la victime et la FAIRE VOMIR en insérant un doigt dans sa gorge. Répéter jusqu'à ce que le liquide vomi soit clair. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente, ni faire vomir. Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre antipoison tous les cas d'ingestion de ce produit. **En cas de contact avec les yeux,** les rincer à grande eau pendant 15 minutes et obtenir de l'aide médicale. **En cas de contact avec la peau,** bien laver la peau à l'eau et au savon. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : L'administration intramusculaire, sous-cutanée ou par la bouche de vitamine K₁ sont les traitements suggérés pour les empoisonnements qui réduisent la capacité de coagulation du sang. On détermine la sévérité de l'empoisonnement et la thérapie appropriée en mesurant les temps de prothrombine pendant une période prolongée. La surveillance des temps de coagulation indiquera s'il est nécessaire de répéter le traitement.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Éliminer le contenant vide en le jetant avec les ordures ménagères. **ÉLIMINATION DES RONGEURS :** Jeter les rongeurs morts avec les ordures ou les enterrer.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.