

01-FEB-2006

Nufarm

**X-All
Herbicide Liquide**

Avec Amitrole et Simazine

Dés herbant total

Pour les entrées de cour, patios, courts de tennis, murs, clôtures, palissades, et aires similaires

NE PAS UTILISER SUR PELOUSES

DOMESTIQUE

GARANTIE :

Amitrole ... 10 grammes par litre
Simazine ... 29,2 grammes per litre
Related Triazines ... 0,4 grammes per litre

Ce produit contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,02% à titre d'agent de conservation.

No. D'HOMOLOGATION 10099 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

En cas de renversement, d'empoisonnement ou d'incendie, appeler le numéro de secours suivant: 1-800-424-9300 (24 heures par jour)

Nufarm Agriculture Inc.
5507 First Street, S.E.
Calgary, Alberta, T2H 1H9

Contenu Net : 1 Litre

PRÉCAUTIONS :

Dangereux si avalé. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Pulvériser seulement le feuillage qu'on veut supprimer. Ne pas employer ce produit pour supprimer les mauvaises herbes dans les plates-bandes de fleurs ou de légumes, les grandes cultures ou le gazon. Éviter que le produit dérive. Pour pulvériser près d'arbres ou arbustes utiles, éviter de pulvériser les tiges et le feuillage de ces plantes. Ne pas employer le même pulvérisateur à d'autres fins sans l'avoir nettoyé à fond.

PREMIERS SOINS :

S'il y a contact cutané, laver à fond au savon et à l'eau.

S'il y a du produit dans les yeux, les rincer à fond à l'eau propre.

S'il y a ingestion, faire vomir en touchant le fond de la gorge avec le doigt ou avec un objet arrondi, faire appel au médecin ou communiquer avec un centre antipoison.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Le mettre aux ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*.

AVIS À L'ACHETEUR :

La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Pour nettoyer l'herbicide X-All de l'équipement de pulvérisation, rincer à l'eau propre quelques fois après chaque usage. Mauvaises herbes supprimées, entre autres: luzerne, pâturin, chardon des champs, chrysanthème, digitale, pissenlit, sétaire, kochia à balais, chénopode, moutarde, morelle, amarante, herb à poux, chiendent commun, renouée, laiteron, plantain, herbe à la puce, pourpier, houlque laineuse, folle avoine, panic capillaire.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer l'herbicide X-All aux petites mauvaises herbes, au printemps ou au début de l'été, ou avant qu'elles soient à maturité et montées en graine. Il n'est pas nécessaire de pulvériser le sol nu avant que commence la croissance des mauvaises herbes au

printemps. Pour de meilleurs résultats contre les mauvaises herbes hautes, les rabattre ou les tondre jusqu'au niveau du sol et les enlever. Traiter une ou deux semaines plus tard quand l'herbe repousse.

MÉLANGE D'HERBICIDE :

Remplir le réservoir du pulvérisateur d'eau la moitié aux trois quarts. Y verser l'herbicide X-All tout en mélangeant constamment. Finir de remplir d'eau le réservoir et mélanger de nouveau. Si on laisse déposer le mélange reposer plusieurs heures, mélanger de nouveau avant de pulvériser.

En région aride, X-All doit être arrosé pour faire pénétrer l'herbicide dans le sol s'il ne pleut pas dans la semaine après le traitement. X-All agit lentement, mais à fond. Les mauvaises herbes commencent à blanchir ou à brunir en moins d'une semaine et sont mortes d'habitude après environ trois semaines. Les petites mauvaises herbes en croissance active sont tuées plus rapidement que celles qui sont dormantes ou asséchées.

QUANTITÉS À EMPLOYER			
Superficie en mètres carrés		Liquide X-ALL (mL)	Litres d'eau
Pulvérisateur de plastique	10 (2mx5m)	325	5
Arrosoir	10 (2mx5m)	325	5
Pulvérisateur à dos ou à réservoir	10 (2mx5m)	325	2,5
	100 (10mx10m)	3,25 L	25

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))