

Panneau arrière/latéral

MODE D'EMPLOI

Saupoudrer l'animal au complet en commençant par la tête et en progressant vers la queue. Ne pas utiliser plus de 2 grammes de poudre par kilogramme de poids de l'animal. Éviter tout contact du produit avec les yeux et les organes génitaux de l'animal. Veiller à ce que la poudre atteigne la peau. Veiller à traiter les pattes au complet. Saupoudrer le produit sur la litière et les quartiers où vit l'animal. Répéter le traitement toutes les semaines au besoin. N'appliquer que sur la litière de l'animal. Ne pas appliquer sur le plancher, les moquettes ou les meubles, ni à aucun autre endroit fréquenté par des personnes. Utiliser dans un endroit bien aéré SEULEMENT, de préférence à l'extérieur.

Ne PAS utiliser sur un chien âgé de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser le produit sur un chien malade ou âgé, une femelle gravide ou qui allaite ou sur un chien qui reçoit un médicament ou un autre traitement pesticide. Ne pas appliquer ce produit sur un chien en même temps ou dans les 30 jours précédant ou suivant le traitement à des médicaments ou l'exposition à des pesticides ou des produits chimiques qui inhibent la cholinestérase. Cesser l'usage du produit en cas d'effets secondaires.

Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux fréquentés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les moquettes et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver le couchage de l'animal, ses quartiers et les environs. Si les parasites sont toujours présents, un traitement insecticide des lieux pourrait s'avérer nécessaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de puces persiste sur l'animal.

MISES EN GARDE

PERSONNES : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec la bouche, les yeux et les vêtements. Ne pas inhaler la poudre. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps ayant été en contact avec le produit) à l'eau et au savon. Empêcher tout contact du produit avec des aliments, des ustensiles de cuisine ou des endroits servant à la préparation ou au rangement de nourriture.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : La poussière peut irriter les yeux, le museau et la gorge. Le produit est nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Éviter tout contact avec la gueule, la face, les yeux, et les organes génitaux du chien. Ne pas laisser l'animal inhaler la poudre.

Toxique pour les poissons et les autres organismes aquatiques. Couvrir les aquariums à proximité de l'endroit où le traitement est administré. Toxique pour les oiseaux.

PREMIERS SOINS

PERSONNES : INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS** : Enlever tous les

vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin ou un vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient un pesticide inhibiteur de la cholinestérase (composé anticholinestérasique). Les symptômes de l'intoxication humaine peuvent comprendre des maux de tête, des faiblesses, des sueurs, une vision trouble, des nausées et de la diarrhée. Obtenir des soins médicaux ou communiquer avec un centre antipoison immédiatement. L'atropine est un antidote. Les symptômes aigus d'une surdose chez le chien comprennent de la diarrhée, une salivation abondante, des vomissements, des tremblements musculaires et des signes de faiblesse. Consulter un vétérinaire immédiatement.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Entreposer dans le contenant d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments et hors de la portée des enfants. Ne pas réutiliser le contenant. Envelopper le contenant vide et le jeter aux ordures ménagères.

Pour plus d'information, appeler un de nos experts au 1-800-275-1414
Visiter le site www.hartzultraguard.com

Hartz® et les autres marques de commerce sont des marques déposées de The Hartz Mountain Corporation

RMXXXXXX

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.