

VET-KEM®

**COLLIER-BOUCLE INTÉGRÉ
COLLIER CONTRE PUCES et
TIQUES pour CHIENS**

Protection de 4 mois (symbole)

**DOMESTIQUE
GARANTIE**

Propoxur...9,4%

No D'HOMOLOGATION 18505 LPA

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS**

Poids net 35g

Wellmark International
100 Stone Road West, bureau 111
Guelph, Ontario N1G 5L3
1(800) 688-7378

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : Pour la lutte contre les puces des chats et chiens, les tiques américaines du chien et les tiques sanguines sur le chien. Le collier commence à tuer les puces et les tiques dès qu'il est placé autour du cou de l'animal. Les puces et tiques présentes sont tuées immédiatement, ainsi que celles que l'animal pourra attraper pendant les 4 mois suivants. Les tiques non gorgées de sang sont plus rares et plus résistantes et il faut quelques jours pour les tuer.

MODE D'EMPLOI : Ne PAS retirer le collier de son emballage jusqu'à ce qu'il soit prêt pour emploi. Faire passer la portion plate dans la boucle de plastique et serrer de façon à ce qu'au moins deux crans soient couverts par la boucle formée par le collier. Laisser suffisamment de jeu en prévision de la croissance de l'animal, couper toute partie excédentaire et la jeter à la poubelle. Le collier doit être desserré, mais toutefois suffisamment ajusté pour ne pas pouvoir s'enlever facilement. Pour enlever le collier, saisir la boucle entre le pouce et l'index et tirer d'un coup sec. Enlever le collier lors du bain avec savon ou détergent.

Ne PAS utiliser sur les animaux malades ou qui allaitent ou sur les chiens âgés de moins de 12 semaines ou sur les animaux sous médication ou traités avec d'autres produits antiparasitaires. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur les animaux âgés ou gravides. Ne pas changer ce collier plus d'une fois par période de 4 mois. Remplacer le collier tous les 4 mois en vue d'un contrôle continu dans les cas où les risques d'infestation sont constants. **CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.** Ne réutiliser ce produit qu'en présence d'un organisme nuisible.

Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait se révéler nécessaire (les produits Siphotrol® de Vet-Kem). Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

PRÉCAUTIONS :

PERSONNES : NE PAS LAISSER LES ENFANTS MANIPULER CE COLLIER. De la poussière se dépose sur le collier pendant l'entreposage. La poussière peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Nocif en cas d'inhalation ou d'absorption par la peau. Éviter tout contact avec la bouche, les yeux, la peau et les vêtements. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter que le produit entre en contact avec des aliments, des ustensiles de cuisine et des endroits où l'on prépare ou conserve de la nourriture.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Mâcher ou avaler le collier peut être nocif. Ne PAS utiliser ce produit en même temps que le traitement avec d'autres pesticides, médicaments ou produits chimiques inhibiteurs de la cholinestérase, ou dans les 30 jours avant ou après ce traitement. La poussière peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Éviter de laisser l'animal inhaler la poussière du collier. Éviter tout contact avec la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux du chien. Certains animaux peuvent être sensibles à ce collier. Tout collier trop serré peut irriter la peau. Si l'irritation persiste après avoir ajusté le collier, le retirer et consulter un vétérinaire.

PREMIERS SOINS :

PERSONNES : SI AVALÉ OU MÂCHÉ, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. SI INHALÉ, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE:

L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire. Si le produit a été mâché ou avalé, consulter un vétérinaire.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale ou vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Ce produit renferme un pesticide qui est un inhibiteur de la cholinestérase (c.-à-d. un composé anti-cholinestérase). L'atropine et l'homatropine sont antidotiques. Le contact de la poussière avec les yeux peut entraîner une contraction temporaire des pupilles.

ENTREPOSAGE : Conserver dans le contenant d'origine, fermé, à la température de la pièce.

ÉLIMINATION : Éliminer tout morceau de collier en trop, tout emballage de collier et collier indésirable (usé) avec les ordures ménagères.

Satisfaction garantie à 100 %

APPEL SANS FRAIS : 1-800-688-7378

® Marques déposées de Wellmark International

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))