

27-FEB-2007

23-NOV-2007 Avis de modification: Ajout de texte au panneau principal.

29-JAN-2008 Avis de modification - changement de titulaire

CARTON

WILSON®
WARFARINE
POUDRE MORTELLE POUR RATS ET SOURIS

Avis de modification

À saveur de bacon et fromage

RODENTICIDE

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 7222 LOI P.A.

GARANTIE : WARFARINE 0,025 %

Contient le malathion à raison de 0,0095 % à titre d'agent de conservation.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

500 g (1 kg)

2 (4) Sacs d'appât prêts à employer

Avis de modification

~~Spectrum Brands IP Inc.,~~
P.O. Box 21001,
Brantford, ON N3R 7W9
1 800 268-2806

Sure-Gro IP Inc.

La poudre mortelle pour rats et souris Warfarine Wilson[®] contient un anticoagulant chimique qui réduit la capacité de coagulation du sang. Après l'ingestion de ce produit, les rongeurs meurent d'hémorragie.

MODE D'EMPLOI : Placer des stations d'appâts aux endroits fréquentés par les rats et souris, près des trous, pistes et terriers des rats, ou contre les murs et dans les coins où se trouvent les souris. Un récipient peu profond d'eau potable encourage la consommation de l'appât. **Rats :** rats surmulots (*Rattus norvegicus*) et rats noirs (*Rattus rattus*). Placer 250 à 500 grammes d'appât à des intervalles de quatre à cinq mètres. Maintenir un approvisionnement constant d'appât aux stations pendant au moins 10 jours. **Souris :** (*Mus musculus*) Placer 250 grammes d'appât à des intervalles de quatre à cinq mètres. Un approvisionnement ininterrompu d'appât devrait être maintenu pendant au moins 15 jours.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut être nocif ou léthal si ingéré ou absorbé par la peau. Ne pas ouvrir les produits prémesurés offerts en emballages serrés. Porter des gants de caoutchouc lors de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.** Ne pas contaminer les lacs, cours d'eau et étangs.

RESTRICTIONS D'UTILISATION : L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de portée des enfants, des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. **NE PAS** placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

PREMIERS SOINS : Ce produit contient un anticoagulant chimique et, en cas d'ingestion accidentelle par des êtres humains, des animaux domestiques, familiers ou sauvages, cette substance peut réduire la capacité de coagulation du sang et causer des saignements. **En cas de contact avec les yeux,** les rincer à grande eau pendant 15 minutes. **En cas de contact avec la peau,** bien laver la peau à l'eau et au savon. **En cas d'ingestion,** provoquer le vomissement en faisant boire un ou deux verres d'eau et en touchant le fond de la gorge avec un doigt ou un objet arrondi. Répéter jusqu'à ce que la vomissure soit claire. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne sans connaissance. Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre antipoison tous les cas d'ingestion de ce produit. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : La vitamine K₁, par injection intramusculaire ou sous-cutanée ou par ingestion orale, est conseillée comme remède curatif pour l'empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par l'établissement du temps de prothrombine prolongé (T.P.) déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s'imposent.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant et le jeter avec les ordures ménagères. Jeter les rongeurs morts aux ordures ménagères ou les enterrer.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806. www.wilsonproducts.ca

Wilson[®] Marque de commerce déposée de Spectrum Brands Canada, Inc., utilisée sous licence.

27-FEB-2007

THROW BAG

**WILSON®
WARFARINE
POUDRE MORTELLE POUR RATS ET SOURIS**

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 7222 LOI P.A.

GARANTIE : WARFARINE 0,025 %

Contient le malathion à raison de 0,0095 % à titre d'agent de conservation.

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BOÎTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

250 g

Avis de modification

~~Spectrum Brands IP Inc.,~~
P.O. Box 21001,
Brantford, ON N3R 7W9
1 800 268-2806

Sure-Gro IP Inc.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut être nocif ou létal si ingéré ou absorbé par la peau. Ne pas ouvrir les produits prémesurés offerts en emballages serrés. Porter des gants de caoutchouc lors de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.** Ne pas contaminer les lacs, cours d'eau et étangs.

RESTRICTIONS D'UTILISATION : L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de portée des enfants, des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. **NE PAS** placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

PREMIERS SOINS : Ce produit contient un anticoagulant chimique et, en cas d'ingestion accidentelle par des êtres humains, des animaux domestiques, familiers ou sauvages, cette substance peut réduire la capacité de coagulation du sang et causer des saignements. **En cas de contact avec les yeux,** les rincer à grande eau pendant 15 minutes. **En cas de contact avec la peau,** bien laver la peau à l'eau et au savon. **En cas d'ingestion,** provoquer le vomissement en faisant boire un ou deux verres d'eau et en touchant le fond de la gorge avec un doigt ou un objet arrondi. Répéter jusqu'à ce que la vomissure soit claire. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne sans connaissance. Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre anti-poison tous les cas d'ingestion de ce produit. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : La vitamine K₁, par injection intramusculaire ou sous-cutanée ou par ingestion orale, est conseillée comme remède curatif pour l'empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par l'établissement du temps de prothrombine prolongé (T.P.) déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s'imposent.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant et le jeter avec les ordures ménagères. Jeter les rongeurs morts aux ordures ménagères ou les enterrer.

Pour de plus amples renseignements sur ce produit ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806. www.wilsonproducts.ca

Wilson® Marque de commerce déposée de Spectrum Brands Canada, Inc., utilisée sous licence.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.