

23-MAR-2007

**VET-KEM®**

**Poudre contre puces et tiques  
pour chiens et chats**

CONTRE LES PUCES ET LES TIQUES  
(graphic)

DOMESTIQUE

GARANTIE

Carbaryl 5,0%

NO. D'HOMOLOGATION : 14573 LOI P.A.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS ET CHATS**

Wellmark International  
100 Stone Road West, Suite 111  
Guelph ON N1G 5L3

Contenu net: 140 g

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

La Poudre contre puces et tiques de VET-KEM, a été mise au point pour aider à maîtriser les infestations de tiques américaines du chien et de tiques sanguines sur les chiens et chats. Elle est aussi efficace contre les puces des chiens et chats.

## MODE D'EMPLOI :

Ne PAS administrer par la gueule. Utiliser **UNIQUEMENT** dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur. Poudrer l'animal et masser en profondeur pour faire pénétrer le produit dans l'épiderme. Porter une attention particulière au traitement des pattes, des jambes et entre les griffes. Ne PAS traiter la gueule, les yeux, la face ni les organes génitaux. Peigner quelques heures après le traitement pour éliminer les tiques mortes. Ne PAS utiliser cette poudre plus d'une fois par semaine. Ne réutiliser ce produit qu'en présence d'un organisme nuisible. Ne PAS utiliser sur les animaux malades ou allaitants, sur les animaux sous médication ou traités avec d'autres produits antiparasitaires ou sur les chiens et chats âgés de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux vieux ou gravides. Ne pas utiliser ce produit en même temps que le traitement avec d'autres pesticides, médicaments ou produits chimiques inhibiteurs de la cholinestérase, ou dans les 30 jours avant ou après ce traitement.

Pour les chenils, les niches à chiens et les accessoires de couchage : Enlever et nettoyer ou détruire les vieilles litières. Bien laver les lieux avec de l'eau et du détergent et laisser sécher. Poudrer les lieux, intérieurs et extérieurs, où dorment les chiens et les autres endroits où peuvent se cacher les tiques et les puces. Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait se révéler nécessaire (les produits Siphotrol® de Vet-Kem). Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

## PRÉCAUTIONS :

**PERSONNES : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Le produit est nocif s'il est avalé ou inhalé. Éviter de respirer la poussière; éviter tout contact avec la peau. Porter des gants de caoutchouc pendant l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter que le produit entre en contact avec des aliments, des ustensiles de cuisine et des endroits où l'on prépare ou conserve de la nourriture.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Le produit est nocif s'il est avalé ou inhalé. Éviter tout contact avec la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux de l'animal. Toxique pour les poissons et autres formes de vie aquatique. Recouvrir les aquariums situés près des aires de traitement. Toxique pour les oiseaux.

**PREMIERS SOINS :**

**PERSONNES :** SI LE PRODUIT EST AVALÉ, obtenir de l'aide médicale ou appeler immédiatement un centre antipoison. En cas de CONTACT AVEC LA PEAU, laver les parties atteintes avec du savon et de l'eau. En cas de CONTACT AVEC LES YEUX, les rincer à fond avec de l'eau. Si l'irritation de la peau ou des yeux persiste, obtenir de l'aide médicale.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :**

L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Des chats sensibles peuvent développer une salivation temporaire et anodine. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire. Lors de la consultation d'un médecin ou d'un vétérinaire, apporter le contenant ou l'étiquette, ou noter préalablement le nom du produit et le numéro d'homologation LPA.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :**

Ce produit renferme un pesticide qui est un inhibiteur de la cholinestérase (c.-à-d. un composé anti-cholinestérase). L'atropine est un antidote.

**ENTREPOSAGE :** Éviter l'entreposage à proximité de la nourriture pour animaux ou des produits alimentaires.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant. Mettre le contenant vide dans un sac et le jeter avec les ordures ménagères.

**APPEL SANS FRAIS :** 1-800-263-3532

® Marques déposées de Wellmark International

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )