

FRONT PANEL

KING LOGO

**KING BUG KILLER
POUDRE**

DOMESTIQUE

LÉGUMES, FLEURS ET FRUITS

Contenu net: 300g, 2 Kg, 4kg, 10kg

GARANTIE : 1% ROTÉNONE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DOMESTIQUE

NO D'ENR. :3555 LOI SUR LES P.A.

Avis de modification

~~**KING PESTICIDES LTD.**~~
~~36 Head Street,~~
~~Dundas, Ontario~~
~~L9H 3H3~~

Biedermann Packaging Ltd.
36 Head Street
Dundas, ON L9H 3H3

MODE D'EMPLOI :

Poudrer en se servant de ce contenant ou transférer le contenu dans une poudreuse manuelle. Couvrir les deux surfaces du feuillage d'une couche mince et uniforme. Poudrer par temps calme. Ce produit peut s'appliquer jusqu'à une journée de la récolte sans laisser de résidus toxiques.

RÉCOLTES	INSECTES	REMARQUES
Broccoli, Choux, Chou-fleurs	Chenilles	Poudre aussitôt que les insectes commencent à faire du dommage et répéter au besoin.
Concombres, Melons, Courges	Perceur, Punaise de la courge, Chrysomèle rayée du concombre	Contre le perceur de la tige, tenir la base de la plante couverte de poudre. Appliquer à toutes les semaines en commençant lorsque les vraies feuilles apparaissent.
Asperges, Pommes de terre, Fleurs	Criocère de l'asperge, Doryphore de la pomme de terre, Pucerons, Cléoptères, Arpenteuses	Poudrer aussitôt que les insectes se montrent. Contre les pucerons, poudrer lorsque les plantes sont humides de rosée.
Radis	Altises	Appliquer lorsque les insectes se montrent. Répéter au besoin.
Framboises	Bytures des framboises, Tenthrede	Appliquer dès l'apparition des bourgeons à fruit et répéter juste avant l'ouverture des fleurs.
Gadeliers (Ribes sativum)	Némate du groseillier	Appliquer sitôt après la formation des fruits et répéter une semaine plus tard.
Groseilliers (Ribes grossulana)	Noctuelle	Appliquer quand les baies tournent au rouge et que les membranes apparaissent.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut être toxique en cas d'ingestion. Éviter l'inhalation de la poudre. Éviter le contact avec les yeux. Éviter la contamination de la nourriture de consommation humaine ou animale. La roténone est toxique pour les poissons et la faune. Ne pas contaminer l'eau de consommation domestique, des cours d'eau et des étangs.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison et amener le patient à l'hôpital en prenant soin d'apporter l'étiquette du produit. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau froide et consulter un médecin. Apporter le contenant, l'étiquette ou le nom du produit et le numéro d'homologation LPA lors de la visite chez le médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide, le jeter avec les ordures ménagères.

AVIS À L'ACHETEUR :

La garantie du vendeur se limite aux conditions énoncées sur l'étiquette, et sous cette réserve, l'acheteur assume les risques corporels ou matériels découlant de l'utilisation ou de la manipulation du produit, et accepte celui-ci à cette condition.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))