

24-APR-2007

05-NOV-2007 Avis de modification - Changement de nom du produit

25-FEB-2008 Avis de modification

10-MAR-2009 2009-0521 Avis de modification - changement de nom du produit

FARM & RANCH BRAND Ratoxin Dura-Block

~~RATOXIN DURABLOCK~~  
~~RAT-X® DURA-BLOCK~~

Avis de modification

Rodenticide en bloc à l'épreuve des intempéries en un seul repas.

DOMESTIQUE

GARANTIE : Bromadiolone 0,005 %

N° D'HOMOLOGATION 18020 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

AVERTISSEMENT



POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONTENU NET : 450 g

Avis de modification

~~Nu-Gro PR Inc.~~  
10 Craig Street  
Brantford, ON  
Canada N3R 7J1  
1-519-757-0077

Agrium Advanced Technologies RP Inc.

**Ratoxin Durablock**

Le ~~Dura-Block de Rat X~~ est un produit à l'épreuve des intempéries qui peut être utilisé dans des endroits très humides, à l'intérieur comme à l'extérieur. Aucun appâtage préalable n'est requis car les rongeurs ne tentent pas de l'éviter.

**RESTRICTIONS D'UTILISATION:**

L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de portée des enfants, des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. NE PAS placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

**MODE D'EMPLOI :** ~~Ratoxin Durablock~~

**Rats :** Briser le ~~Dura-Block de Rat X~~ en deux morceaux et les placer aux endroits où l'on observe la présence de rat surmulot (*Rattus norvegicus*) et de rat noir (*Rattus rattus*), le long des murs, dans les coins, et à tout autre endroit dissimulé où ils peuvent se nourrir inaperçus. S'assurer qu'il y ait suffisamment d'appât dans ces endroits.

~~Ratoxin Durablock~~

**Souris:** Briser le ~~Dura-Block de Rat X~~ en petits morceaux et placer aux endroits où les souris (*Mus musculus*) ou des signes de souris sont évidents. Il est recommandé de placer les points d'appât à des intervalles de 3 à 4 mètres.

**PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE.** Peut être nocif ou léthal si ingéré ou absorbé par la peau. Porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.** Ce produit est toxique pour les poissons et la faune. Ne pas contaminer les lacs, les cours d'eau et les étangs.

**PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec les yeux, les rincer à l'eau pendant 15 minutes. En cas d'irritation persistante, obtenir de l'aide médicale. **En cas de contact avec la peau,** bien laver la région affectée à l'eau et au savon. **En cas d'ingestion,** faire boire 1 à 2 verres d'eau au patient et PROVOQUER LE VOMISSEMENT en touchant le fond de la gorge avec un doigt ou un objet arrondi; répéter jusqu'à ce que le liquide vomi soit clair. Ne pas provoquer le vomissement ou ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre antipoison tous les cas d'ingestion de ce produit. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** En cas d'ingestion par des humains, des animaux domestiques ou des animaux familiers, cette substance peut réduire la capacité de coagulation du sang et causer des saignements. La vitamine K1 administrée sous forme d'injections intramusculaires ou sous-cutanées, ou par ingestion orale sont les traitements curatifs suggérés

pour l'empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par l'établissement des temps de prothrombine prolongés (T.P.) déterminera la thérapie appropriée. La surveillance des T.P. indiquera si des traitements répétés s'imposent.

**ENTREPOSAGE :**

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Éliminer le contenant avec les ordures ménagères. Éliminer les rongeurs avec les ordures ménagères ou les enterrer.

**AVIS À L'UTILISATEUR :** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )