

14-JUN-2005

29-JAN-2008 Avis de modification - changement de titulaire

**LATER'S
POUDRE POUR BULBES**

PRÊT À UTILISER

Protège les bulbes de bégonias, jon-quilles, narcisses, iris, glaïeuls, dahlias et tulipes contre la pourriture des bulbes, la fonte des semis et contre les insectes comme le thrip.

MET FIN À LA POURRITURE NON-APPARENTE DES BULBES

L'exposition au captan peut provoquer des effets à long terme sur la santé.
Pour minimiser toute exposition, suivez les instructions apparaissant sur cette étiquette.

DOMESTIQUE

N° D'ENR. 12146 LOI P.A.

GARANTIE :

Carbaryl 5,0 %

Captane 5,0 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

250 g (500 g)

Avis de modification

~~Nu-Gro IP Inc.,
10 Craig St.,
Brantford, ON
N3R 7J1~~

Sure-Gro IP Inc.
P.O. Box 21001
Brantford ON
N3R 7W9

MODE D'EMPLOI :

La poudre pour bulbes de Later est la combinaison spéciale d'un fongicide et d'un insecticide, qui protègent ensemble les bulbes contre des maladies tels que la fonte des semis, la pourriture des bulbes et même contre les insectes comme les thrips (exposés).

Protège :	Maladies et insectes maîtrisés :
Tulipes, Jonquilles, Narcisses, Iris, Glaïeuls	Fonte des semis, Pourriture des bulbes, Thrips (exposés)
Dahlias, Bégonias tubéreux	Fonte des semis, Pourriture des bulbes

COMMENT L'UTILISER :

TRAITEMENT AVANT DE PLANTER LES BULBES : Avant de planter, saupoudrez une petite quantité de **Poudre pour bulbes de Later** directement dans le trou. Pour traiter une surface plus grande, disperer la **Poudre pour bulbes** au taux de 250 g par 5 m² et faites pénétrer dans le sol à une profondeur de 8 cm. (5 m² = 5 grands pas de longueur sur un grand pas de largeur).

ENTREPOSAGE : Avant d'entreposer les bulbes pour l'hiver, placer-les, secs et propres, dans un sac de plastique avec une petite quantité de **Poudre pour bulbes de Later** et agiter bien le sac pour les couvrir d'une fine couche de protection. Préviens la pourriture des bulbes pendant la période d'entreposage.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne jamais manipuler ce produit les mains nues. Utiliser des gants de caoutchouc ; ne pas utiliser de gants de cuir, ni de tissus. Laver mains, visage et bras soigneusement après utilisation du produit et avant de boire, manger ou fumer. Ne pas inhaler la poussière. Pendant l'utilisation, porter les lunettes de protection et des vêtements couvrant entièrement les bras et les jambes, pour minimiser toute exposition de la peau. Enlever les vêtements contaminés et les laver soigneusement avant réutilisation. Dans le cas d'un accident, retirer immédiatement les vêtements contaminés et laver abondamment la peau contaminée avec de l'eau et du savon. Laver vêtements et gants avant réutilisation. Au moment de la manipulation ou de l'utilisation, toujours travailler hors de la direction du vent. Garder toutes personnes non protégées hors de l'aire ou de la proximité de l'opération, où le vent pourrait les contaminer.

PREMIER SOINS : Dans le cas d'empoisonnement, appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. **SI EN CONTACT AVEC LA PEAU,** retirer les vêtements contaminés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon. **SI DANS LES YEUX,** rincer abondamment avec de l'eau pendant 5 à 10 minutes et appeler le médecin. **SI AVALÉ,** faire boire un ou deux verres d'eau à la personne incommodée et provoquer le vomissement en administrant une dose de sirop d'Ipecac. Si la personne ne vomit pas dans les 20 minutes suivantes, administrer une deuxième dose. En l'absence de sirop d'Ipecac, faire boire un ou deux verres d'eau et provoquer le vomissement en insérant un doigt dans la gorge. Faire de nouveau boire de l'eau jusqu'à ce que le liquide vomi soit clair. La personne incommodée doit être couchée et le niveau de sa tête maintenu sous celui des pieds. **NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT SI LA PERSONNE EST INCONSCIENTE OU EN ÉTAT DE CONVULSIONS.** Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une attention médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Le Carbaryl est un inhibiteur modéré de cholinestérase. L'atropine est un antidote.

ENTREPOSAGE : Garder le produit dans son contenant original et dans un endroit frais et sec loin des aliments.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. L'envelopper avant de le jeter avec les ordures ménagères.

AVIS À L'ACHETEUR : La garantie accordée par le vendeur se limite aux conditions énoncées sur l'étiquette et, sous cette réserve, l'acheteur assume les risques corporels ou matériels découlant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et accepte celui-ci à cette condition.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))