

2026-1573

2026-07-10

Naphtalène
Boules à mites en sachet
Tuent les mites et les larves de mites

Insecticide

115 g



DOMESTIQUE
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
PRINCIPE ACTIF : 99,9 % de
naphtalène N° D'HOM. 2525 LOI
P.A.

POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT.
NE PAS ouvrir le sachet.

Recochem Inc. 8725 Holgate Crescent, Milton, ON L9T 5G7 tél. 1-800-361-6030
PRECAUTIONS:

GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

L'ingestion peut être mortelle pour les enfants. Ne pas utiliser sur les vêtements d'un nourrisson ou dans la chambre d'un jeune enfant. L'apparence physique des boules-à-mites est attirante et dangereuse pour les enfants.

L'inhalation peut être mortelle. NE PAS respirer les vapeurs du produit. Il cause l'irritation des yeux et de la peau. ÉVITER le contact du produit avec les yeux et la peau. Bien aérer les vêtements à l'extérieur et, si possible, les laver avant de les porter.

MODE D'EMPLOI :

Pour utilisation dans des contenants étanches seulement. NE PAS utiliser comme répulsif pour animaux. Efficace sur les textiles en fibres naturelles seulement (p. ex. la laine, le coton). Brosser à fond les articles à remiser. Placer les vêtements de laine, la fourrure et autres dans des contenants hermétiques. Utiliser 115 g de Boules à mites en sachet de naphtalène par 0,23 mètre cube d'espace. Tous les joints et les trous du contenant doivent être scellés avec du ruban adhésif

afin d'éviter la perte de vapeur et l'entrée des insectes. On peut enlever l'odeur des articles traités en les suspendant dehors (de préférence au soleil).

Ouvrir l'emballage dans un endroit bien aéré et refermer soigneusement.

Entreposer l'emballage au sec dans un endroit inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques.

Le volume à traiter du contenant d'entreposage peut être calculé en multipliant les dimensions de hauteur, de largeur et de profondeur de l'espace. [ex : hauteur 0,92 m x largeur 0,5 m x profondeur 0,5 m = 0,230 m³].

Appliquer le produit aux doses suivantes : 1 sachet pour un espace clos de 0,230 m³ ou 230 L.

PREMIERS SOINS :

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes. L'exposition aux vapeurs du naphthalène peut causer des maux de tête, des nausées, des étourdissements et des vomissements. Une personne peut être atteinte d'anémie hémolytique microangiopathique à la suite de l'ingestion de naphthalène ou d'une exposition suffisante aux vapeurs de celui-ci. Les nourrissons et les personnes ayant une déficience génétique de l'enzyme glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) sont plus vulnérables à l'anémie hémolytique s'ils sont exposés à du naphthalène.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser l'emballage. Envelopper l'emballage vide et le jeter avec les ordures ménagères.

2026-1573
2026-07-10

Naphtalène

Boules à mites en sachet

Tuent les mites et les larves de mites

Insecticide

230 g



DOMESTIQUE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

PRINCIPE ACTIF : 99,9 % de
naphtalène N° D'HOM. 2525 LOI
P.A.

POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT.

NE PAS ouvrir le sachet.

Recochem Inc. 8725 Holgate Crescent, Milton, ON L9T 5G7 tél. 1-800-361-6030

PRECAUTIONS:

GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

L'ingestion peut être mortelle pour les enfants. Ne pas utiliser sur les vêtements d'un nourrisson ou dans la chambre d'un jeune enfant. L'apparence physique des boules-à-mites est attirante et dangereuse pour les enfants.

L'inhalation peut être mortelle. NE PAS respirer les vapeurs du produit. Il cause l'irritation des yeux et de la peau. ÉVITER le contact du produit avec les yeux et la peau. Bien aérer les vêtements à l'extérieur et, si possible, les laver avant de les porter.

MODE D'EMPLOI :

Pour utilisation dans des contenants étanches seulement. NE PAS utiliser comme répulsif pour animaux. Efficace sur les textiles en fibres naturelles seulement (p. ex. la laine, le coton).

Brosser à fond les articles à remiser. Placer les vêtements de laine, la fourrure et autres dans des contenants hermétiques. Utiliser 115 g de Boules à mites en sachet de naphtalène par 0,23 mètre cube d'espace. Tous les joints et les trous du contenant doivent être scellés avec du ruban adhésif

afin d'éviter la perte de vapeur et l'entrée des insectes. On peut enlever l'odeur des articles traités en les suspendant dehors (de préférence au soleil).

Ouvrir l'emballage dans un endroit bien aéré et refermer soigneusement.

Entreposer l'emballage au sec dans un endroit inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques.

Le volume à traiter du contenant d'entreposage peut être calculé en multipliant les dimensions de hauteur, de largeur et de profondeur de l'espace. [ex : hauteur 0,92 m x largeur 0,5 m x profondeur 0,5 m = 0,230 m³].

Appliquer le produit aux doses suivantes : 1 sachet pour un espace clos de 0,230 m³ ou 230

L.PREMIERS SOINS:

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes. L'exposition aux vapeurs du naphthalène peut causer des maux de tête, des nausées, des étourdissements et des vomissements. Une personne peut être atteinte d'anémie hémolytique microangiopathique à la suite de l'ingestion de naphthalène ou d'une exposition suffisante aux vapeurs de celui-ci. Les nourrissons et les personnes ayant une déficience génétique de l'enzyme glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) sont plus vulnérables à l'anémie hémolytique s'ils sont exposés à du naphthalène.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser l'emballage. Envelopper l'emballage vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Naphtalène
Boules à mites en sachet
Tuent les mites et les larves de mites

Insecticide

460 g



DOMESTIQUE
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
PRINCIPE ACTIF : 99,9 % de
naphtalène N° D'HOM. 2525 LOI
P.A.

POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT.
NE PAS ouvrir le sachet.

Recochem Inc. 8725 Holgate Crescent, Milton, ON L9T 5G7 tél. 1-800-361-6030

PRECAUTIONS:

GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

L'ingestion peut être mortelle pour les enfants. Ne pas utiliser sur les vêtements d'un nourrisson ou dans la chambre d'un jeune enfant. L'apparence physique des boules-à-mites est attirante et dangereuse pour les enfants.

L'inhalation peut être mortelle. NE PAS respirer les vapeurs du produit. Il cause l'irritation des yeux et de la peau. ÉVITER le contact du produit avec les yeux et la peau. Bien aérer les vêtements à l'extérieur et, si possible, les laver avant de les porter.

MODE D'EMPLOI :

Pour utilisation dans des contenants étanches seulement. NE PAS utiliser comme répulsif pour animaux. Efficace sur les textiles en fibres naturelles seulement (p. ex. la laine, le coton).

Brosser à fond les articles à remiser. Placer les vêtements de laine, la fourrure et autres dans des contenants hermétiques. Utiliser 115 g de Boules à mites en sachet de naphtalène par 0,23mètre cube d'espace. Tous les joints et les trous du contenant doivent être scellés avec du ruban adhésif afin

d'éviter la perte de vapeur et l'entrée des insectes. On peut enlever l'odeur des articles traités en les suspendant dehors (de préférence au soleil).

Ouvrir l'emballage dans un endroit bien aéré et refermer soigneusement.

Entreposer l'emballage au sec dans un endroit inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques.

Le volume à traiter du contenant d'entreposage peut être calculé en multipliant les dimensions de hauteur, de largeur et de profondeur de l'espace. [ex : hauteur 0,92 m x largeur 0,5 m x profondeur 0,5 m = 0,230 m³].

Appliquer le produit aux doses suivantes : 1 sachet pour un espace clos de 0,230 m³ ou 230 L.

PREMIERS SOINS:

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes. L'exposition aux vapeurs du naphthalène peut causer des maux de tête, des nausées, des étourdissements et des vomissements. Une personne peut être atteinte d'anémie hémolytique microangiopathique à la suite de l'ingestion de naphthalène ou d'une exposition suffisante aux vapeurs de celui-ci. Les nourrissons et les personnes ayant une déficience génétique de l'enzyme glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) sont plus vulnérables à l'anémie hémolytique s'ils sont exposés à du naphthalène.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser l'emballage. Envelopper l'emballage vide et le jeter avec les ordures ménagères.

aphtalène

Boules à mites en sachet

**Tuent les mites et les larves de
mites**

Insecticide

920 g



DOMESTIQUE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

PRINCIPE ACTIF : 99,9 % de
naphtalène N° D'HOM. 2525 LOI
P.A.

POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT.

NE PAS ouvrir le sachet.

Recochem Inc. 8725 Holgate Crescent, Milton, ON L9T 5G7 tél. 1-800-361-6030

PRECAUTIONS:

GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

L'ingestion peut être mortelle pour les enfants. Ne pas utiliser sur les vêtements d'un nourrisson ou dans la chambre d'un jeune enfant. L'apparence physique des boules-à-mites est attirante et dangereuse pour les enfants.

L'inhalation peut être mortelle. NE PAS respirer les vapeurs du produit. Il cause l'irritation des yeux et de la peau. ÉVITER le contact du produit avec les yeux et la peau. Bien aérer les vêtements à l'extérieur et, si possible, les laver avant de les porter.

MODE D'EMPLOI :

Pour utilisation dans des contenants étanches seulement. NE PAS utiliser comme répulsif pour animaux. Efficace sur les textiles en fibres naturelles seulement (p. ex. la laine, le coton).

Brosser à fond les articles à remiser. Placer les vêtements de laine, la fourrure et autres dans des contenants hermétiques. Utiliser 115 g de Boules à mites en sachet de naphtalène par 0,23mètre cube d'espace. Tous les joints et les trous du contenant doivent être scellés avec du ruban adhésif afin

d'éviter la perte de vapeur et l'entrée des insectes. On peut enlever l'odeur des articles traités en les suspendant dehors (de préférence au soleil).

Ouvrir l'emballage dans un endroit bien aéré et refermer soigneusement.

Entreposer l'emballage au sec dans un endroit inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques.

Le volume à traiter du contenant d'entreposage peut être calculé en multipliant les dimensions de hauteur, de largeur et de profondeur de l'espace. [ex : hauteur 0,92 m x largeur 0,5 m x profondeur 0,5 m = 0,230 m³].

Appliquer le produit aux doses suivantes : 1 sachet pour un espace clos de 0,230 m³ ou 230 L.

PREMIERS SOINS:

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes. L'exposition aux vapeurs du naphthalène peut causer des maux de tête, des nausées, des étourdissements et des vomissements. Une personne peut être atteinte d'anémie hémolytique microangiopathique à la suite de l'ingestion de naphthalène ou d'une exposition suffisante aux vapeurs de celui-ci. Les nourrissons et les personnes ayant une déficience génétique de l'enzyme glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) sont plus vulnérables à l'anémie hémolytique s'ils sont exposés à du naphthalène.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser l'emballage. Envelopper l'emballage vide et le jeter avec les ordures ménagères.